

22, 078/G

D. XVIII. n
18



16.F.7

30696


21.71

SULLA
INSENSITIVITÀ
ED
IRRITABILITÀ HALLERIANA
SUPPLEMENTO
AGLI OPUSCOLI
DI VARJ AUTORI
RACCOLTI
ET IN DUE PARTI DIVISO
DA GIACINTO BARTOLOMEO FABRI
Fisico Chirurgo.



IN BOLOGNA MDCCLIX.

Per Girolamo Corciolani, ed Eredi Colli a S. Tommaso d' Aquino.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



All' Illustrissimo, e Rinomatissimo Signore

GIOVAMBATISTA BIANCHI

Dottore Collegiato di Medicina, già Archiatro di S. A. S.
 Sig. Principe Filippo Landgravio d' Haffia - Darmstad,
 Pubblico Lettore Ordinario nella celebre Università
 di Bologna, aggregato alle più cospicue Accademie
 dell' Europa, Emerito Professore primario di
 Notomia nella Regia Università di Torino,
 Presidente, e Capo del Magistrato del
 Protomedicato negli Stati di S. S. R. M.
 il Rè di Sardegna.

GIACINTO BARTOLOMEO FABRI.



*Scce finalmente il terzo Tomo della mia
 Raccolta Halleriana, ed ho voluto, che esca sotto i
 favorevoli auspicj della Signoria Vostra Illustrissima.
 Il pregarvi a ricevere questa intitolazion mia, e il
 credere, che Voi non siate per benignamente accoglier-
 la, sarebbe un dubitare del vostro bel cuore, col qua-
 le più, che non merito, mille argomenti mi avete da-*

ti dell' amor vostro. E se avessi a dubitare, che non fosse per riuscirvi grata, la dubitazione mia sù d' altro non caderebbe, che sulla sua tenuità, il perchè farebbemi piaciuto, ch' ella comparisse più grande, più acconcia, ed a Voi più addattata e conforme. Costume è di chi alcuna dedicazione a qualche Personaggio indirizza, usare di una così onorevole circostanza, per far palese al mondo, e in luminosa comparsa esporre ogni suo raro pregio, e innanzi agli occhi d' ogn' uno schierare quelle particolari doti e virtuose prerogative, che in fra degli Uomini grandi lo distinguono, e per quello ch' egli è, ampiamente lo caratterizzano: in simil maniera non mi conterrò io con V. S. Illustrissima; imperciocchè troppe cose avrei io avuto da ordinare per farlo, e non tacere niuna di quelle, che accrescono la vostra grandezza, e degno di commendazione vi fanno. E se a forza d' arte ingegnato mi fossi di farvi in qualche maniera comparire grande Filosofo, gran Medico ed Anatomico, grandissimo Letterato; non avrei fatto e detto nulla più di quello si è detto e fatto da tanti celebri Uomini, i quali nelle opere loro hanno lodevolmente di Voi parlato, e per tale, quale veracemente siete, hannovi co' loro encomj celebrato. Troppo angusti sono i termini di una semplicissima lettera, perchè in essa avessi potuto tutte le cose restrignere, che avrei avuto in animo di dire: perciò lasciando ad altri di me più sperti le vostre

v

vostre laudi, che moltissime sono, e tutte grandi; e riducendo in poco tutti quegli argomenti, che avrebbero oltre modo renduto esteso il corso delle mie parole, dirò, che vivrete immortale nelle cattedre, nelle vostre nobili produzioni, e ne' tanti Uomini per Voi medesimo addottrinati, ne' quali penso, che non sia mai per venir meno la vostra gloriosa memoria. Nè ad alcun cada in dubbio esser queste studiate espressioni per guadagnarmi vie più l'amor vostro: sono verità, che di per se parlano, e che l'avventurosa posterità, vedrà con vostro decoro avverate. Ma niente più. Gradite volentieri questa dedicazion mia, la quale non ha avuto per fine, se non se, di confessare a Voi, e a chi che sia, l'alta stima in che vi tengo, non che il desiderio ch'io nutrirei, che da tutti, come da me foste amato, e, come meritate, venerato. E quindi pregandovi a diffendere il libro, ch'io vi presento da que' sinistri, ch'ei potesse incontrare, comechè di lingue satiriche e mordaci, niun caso si faccia, e poca cura si prenda, chi non ha, che la mira, e il fin retto di adoperarsi per lo pubblico bene, pieno del mio veracissimo rispetto, prego vi dal Cielo lunga vita e salute.

PREFAZIONE.



Ieno d' animo, e di tranquillità esce alla luce il terzo Tomo della mia Raccolta Halleriana, apparecchiato ad incontrare, senza dare alcun segno di turbamento, ovvero di soverchia compiacenza, l' approvazione, non meno che la censura di molti. Gli altri due Tomi, che lo precorsero, come quelli, che non erano sperimentati del costume degli Uomini, introdotti appena nelle botteghe de' venditori di libri, al comparir che faceva gente avvezza a giudicare delle opere della sola e semplice lettura de' frontispicj, e credere inutile, e di niuna importanza tutto ciò, che a' loro studj non appartiene, flettero non può negarsi timidi per alcun tempo, e quasi direi vergognosi, udendo replicarsi da molti, la materia, che contenevano non essere di alcun vantaggio, che il moltiplicare tante dissertazioni sullo stesso argomento, era lo stesso, che l' oscurarlo, che poco di giovamento potea sperarne la Fisica, e assai minore la Medicina, e Cirugia, ed altre tali chimeriche dicerie avventurate così a caso da chi non avea cognizione alcuna di cotal opera. Si come però videro a poco a poco invogliarsene molti letterati, e provvedersene questi, e spedirne in copia a straniere nazioni per sodisfare le varie, e molte ricerche, che n' eran fatte; quindi fu, che si fecero arditi, e incoraggiaronli a non temere l' aria ancor più severa delle Accademie più colte, e animarono il terzo ad uscir liberamente con franco volto, e non arrestarsi all' incontro men favorevole d' alcuno, che come gli altri il riprendesse, volendosi anzi riflettere, essere questo l' esito universale de' parti ancor più felici; con ciò sia che, si come sono varj gli umori, e vario il pensar delle persone; anche in mezzo alla estimazione co-

mune, non lasciano d' incontrare disapprovatori indiscreti, che fino in cose di pochissimo momento trovano onde riprenderli, e screditarli. Potrei veramente a difesa non solo di questo, ma degli altri precedenti due Tomi, addurre più ragioni per accreditarne la stima, e mettendo in sua luce non meno l' utilità delle cose, che vi si trattan per entro, che il merito degli Autori per ogni parte chiarissimi, che li compongono, produrre molti argomenti, quanto acconci ad impedirne la critica, altrettanto valevoli a risvegliare il desiderio de' Letterati di assaporarne i vantaggi; ma chi sa, che queste ragioni non venissero ad assoggettarsi ancor esse alla medesima sorte? E' così grande oggi giorno il prurito di censurare, che chiunque dallo stesso n' è tocco, prende di mira ancora le prefazioni, e dove gli Autori delle medesime pretendono giustificarsi, aggiungono alle loro accuse nuova materia. Senza che, è così piena l' Europa tutta di queste nuove quistioni, e la dottrina del chiarissimo Hallero va sì fastosa nelle Università più cospicue, che non ha mestieri delle mie insinuazioni per introdursi con più franchezza ad essere vie più gradita, ed accolta dagli ingegni più chiari. Nè giova quindi l' oppormi, che anche in quest' opera, non lascia di avere contraddittori, essendo noto a ciascuno esser questo l' oggetto delle contese de' Letterati, che meglio manifestisi la verità, e dopo varie contraddizioni, più sicura trionfi. Quanto poi agli Autori, che colle loro ingegnose Dissertazioni prelero a scrivere sulle scoperte del dottissimo Hallero, questi si difendono per lor medesimi colla chiarezza del nome loro, nè han bisogno d' altrui opera, che a sostenere li prenda, sieno eglino a favore, o contra lo stesso; anzi m' è d' uopo aggiugnere, che le varie e nobilissime cognizioni che adunarono insieme sullo stesso argomento, potran servire a ciascheduno di allettamento dolcissimo, a rintracciare full' orme, ch' essi segnarono, per quanto varj sentieri si giunga talora felicemente al medesimo fine. Per la qual cosa non solo mi credo disobbligato dalla incombenza, che suole sovrastare agli editori delle altrui opere, di rendere, cioè, con artificiosa maniera affezionato e benevolo l' animo de' Leggitori, ma penserò in oltre di far

cosa grata agli amatori delle cose Fisico-Medico-Cerufiche, se nel chiudere il presente proemio farò loro sapere, che non mi ristardò dalle intraprese sollecitudini per giugnere in potere di tutt' altri simili opuscoli, che da colti lontani paesi aspettava, e che per non so quali circostanze, e attese forse le turbolenze presenti non ho potuto fin qui ottenere, non che d' altri ancora di valenti soggetti italiani, che per un certo tal quale politico ritegno non è stato agevole che me li accordino da por fuori la prima volta; e ciò per soddisfare alle premurose istanze di molti amici, i quali anderebbono solleciti di avere in una seconda parte di Supplemento tutto quello, che su questo argomento è stato scritto, non che a me medesimo come quegli, cui starebbe a cuore di rendere il più che fosse possibile una così importante raccolta compiuta. E tanto più vengo impegnato a non ristarmi, quanto che sento, non solo una tale mia fatica come dissi comendata e gradita; ma eziandio nuovamente in altri paesi riprodotta: riproduzione però, che qualunque sia per essere, non varrà per alcuna maniera a scemare di pregio, e a soverchiare l' edizion bolognese, che che sia stato detto della medesima, e del suo Autore, il quale niun tocca, ma tutti estima e rispetta, tra perchè è la prima, fatta senza risparmiio, e perchè terminata, che sia, comparirà, in genere di raccolta, ricca et ornata di quant' altro mai v' abbia sulla materia in questione, onde corrispondere possa in ogni sua parte alla aspettazione comune.

INDICE DE' CAP I.

ix

PARTE PRIMA.

MEMORIA seconda del Sig. Alberto Haller .	pag. 1.
ESPERIENZE sopra i Tendini .	3.
Sopra i Legamenti, le Capsole delle articolazioni, ed il Perioftio .	7.
Sulla dura Madre, e sua insensibilità .	9.
Sopra il moto del Cervello analogo alla respirazione .	11.
Sopra il moto del Sangue venoso analogo alla respirazione .	14.
Sopra la compressione del Diaframma fatta alla Vena cava .	15.
Sopra il moto del Cervello dipendente dalla espirazione	ivi.
Sopra il Sangue refuo, che torna dall' orecchietta destra .	16.
Sulla sensibilità della pia Madre .	18.
Sopra il Cervello .	19.
Sopra il Cervello propriamente detto .	ivi.
Ferite del Cervelletto .	21.

Sopra

<i>Sopra la Midolla spinale.</i>	23.
<i>Sulla sensitività delle Membrane, e della Pleura.</i>	24.
<i>Sul Peritonèo.</i>	ivi.
<i>Sulla sensitività delle Viscere.</i>	25.
<i>Sulla sensazione de' Nervi.</i>	26.
<i>Sopra la forza movente che li Muscoli acquistano dai Nervi.</i>	29.
<i>Sopra il Nervo frenico in particolare.</i>	32.
<i>Fenomeni sopra la forza di contrazione, che è essenziale alli Muscoli.</i>	34.
<i>Sopra il moto dell' Iride.</i>	38.
<i>Sulla irritabilità de' vasi del corpo Animale.</i>	40.
<i>Sopra le Vene.</i>	43.
<i>Sopra li Vasi lattei, ed il Condotto toracico.</i>	44.
<i>Sopra la forza di contrazione della Borsetta del Fiele.</i>	45.
<i>Sopra la forza di contrazione della Vescica urinaria.</i>	46.
<i>Sull' Uretra.</i>	48.
<i>Sulla forza di contrazione dell' Utero.</i>	49.
<i>Sul movimento peristaltico del Ventricolo, e dell' Esofago, e prima sul Ventricolo.</i>	ivi.
<i>Sul Ventricolo.</i>	50.
<i>Sul moto dell' Esofago.</i>	54.

Sulla

Sulla Irritabilità, ed il moto peristaltico degli Intestini. 55.

Sul moto del Cuore. 65.

Dissertazione del Sig. Giovanni Gottfreid Zinn sull' inviluppo de' Nervi. 81.

Dissertatio altera Clarissimi Zinnj sistens experimenta circa Corpus callosum, Cerebellum, & duram Matrem in vivis animalibus instituta. 94.

Dissertatio Clariss. Oeder de Irritabilitate. 127.

Lettera del Sig. Giambatista Verna al Celebratissimo Signor Haller. 143.

Discorso Teorico-Pratico di Orazio Maria Pagani Medico Filosofo, e di Camillo Bonioli Chirurgo di Lonigo sulle parti insensibili ed irritabili del Corpo umano. 154.

PARTE SECONDA.

DISSERTAZIONE seconda del Sig. le Cat intorno la sensitività della dura e pia Madre, delle Membrane, de' Legamenti, de' Tendini &c. pag. 7.

Articolo I. *Sensitività della dura Madre.* 8.

Articolo II. *Sensitività della pia Madre.* 17.

Articolo III. *Sensitività delle Membrane, Legamenti, Tendini &c.* 22.

Articolo IV. *Insensitività accidentale delle parti antecedenti; naturale, e permanente del Cervello.* 31.

Arti-

Articolo V. <i>Riflessioni sulla irritabilità Halleriana.</i>	37.
<i>Lettera del Dott. Giacinto Fabri al Sig. Ercole Lelli.</i>	42.
<i>Animadversiones in doctrinam de irritabilitate, tono, sensatione, & motu &c. D. Henrici Friderici Delij.</i>	53.
<i>Pentast observationum Medico-Chirurgicarum Josephi Villersavoie Argentensis.</i>	73.
<i>Clariss. Viro Jo. Michaeli Lamberto Chirurgia Professori. Dominicus Vandellius.</i>	76.
<i>Lettera terza del Sig. Bianchi di Torino al Sig. le Cat.</i>	81.
<i>Lettera del Sig. N. N. al Dott. Giacinto Fabri.</i>	92.
<i>Lettera del Sig. Dott. Gaetano Rossi al Sig. Dott. Ferdinando Marebesini.</i>	97.
<i>Lettera del Sig. Giuseppe Bertossi Medico Filosofo in risposta ad un' Amico.</i>	105.
<i>Lettre a Mons. Bianchi par Mons. le Cat.</i>	121.
<i>Jo. Bapt. Bianchi. Claudio Nicola le Cat.</i>	125.
<i>Al Sig. Dott. Tommaso Lagbi, il Sig. Conte Gregorio Casali. pag.</i>	127.
<i>Risposta del Sig. Dott. Lagbi al Sig. Conte Gregorio Casali.</i>	131.
<i>Eccezioni di N. N. contro la Lettera del Sig. Giambattista Verna.</i>	133.

1

COMPENDIO
DELLA SECONDA MEMORIA
SULLE PARTI SENSIBILI, ED IRRITABILI
DEL CORPO UMANO

Inviata alla Real Società delle Scienze di Gottinga
nel Mese di Novembre dell' Anno 1755.

DAL SIG. ALBERTO HALLER

Dottore in Medicina, Barone, Presidente di tale Società,
Membro delle Accademie di Parigi, Berlino,
Londra, Bologna &c.

Cavato dagli eruditi Giornali

DI M. VANDERMONDE

PER CONTINUAZIONE DELLA RACCOLTA
DELLE COSE HALLERIANE,
ED ANTI-HALLERIANE.



'Eruditissimo Autore fa alla mentovata memoria, stampata in Losanna dell' anno suddetto, precedere una pulitissima prefazione indiritta a' Signori della Società medesima, nella quale dopo aver fatta menzione della studiosa, e chiara Gioventù, che trovavasi in Gottinga, quando a Presidente colà permanendo, ed affaticando assiduamente intorno alla materia della sensitività, ed irritabilità delle parti degli animali, adoperò la più parte de' sperimenti, ch'ei rapporta nelle sue dissertazioni, mostra, che colla chiarezza de' ripetuti fatti, ha spregiudicati tanti celebri Uomini, e disingannato se medesimo, che col famoso ed immortal Boerhaave

Suppl. Parr. I.

A

cre-

credevano, che i tendini, la dura madre, i periosij &c. avessero squisitissimo senso, riferendo in oltre, che il suo nuovo sistema è stato confermato con sodi sperimenti, non solo in alcune principali Città d' Italia, come in Roma, Firenze, Bologna &c.; ma in molte altre dell' Europa ancora, e pone sott' occhi principalmente Copenaghen, Berlino, Königsberga, Parigi, Lione, Montpellier &c. Ciò fatto, passa a far vedere, quanto sia difficil cosa lo sperimentar bene, dando utilissimi avvertimenti, ed insegnando la vera maniera per bene e sicuramente riuscirvi. Per vero dire, sono tali e tante le accidentalità, che possono nascere, e le cautele, che s' hanno ad esattamente osservare, che una piccolissima circostanza, una semplicissima inavvertenza, può rendere, se non inutile del tutto lo sperimento, per lo meno sospetto. Fa rilevar pur anco da Maestro grande com' è, quanta diligenza e circospezione ci voglia nello usare caustici, e particolarmente fluidi, di natura attivissimi, toltone lo attual foco, il quale dove tocca fa crosta e niente più; conciossiachè dice, che non v' ha più pericolosa cosa de' veleni per render vario lo sperimento, potendo questi colla loro attività rodente toccare, ed oltre modo stimolate rendere altre parti, se per sorte ad esso lor si stendesse, sulle quali non cada l' ispezione, e così trarre in inganno chi sperimenta. Confessa coll' ingenuo candor suo, che gli è paruta buona e laudevole cosa non dissimulare, e tener nascosti alcuni fatti di succedimento contrario, ed imperfetto; da saggio riflettendo, che sebbene sien tali, puossi nondimeno da essi, posti con altri a confronto, un qualche util lume acquistare. Conchiude poi graziosamente, lasciando stare alcune escusazioni, ch' egli fa intorno al titolo d' esperienze, di cui si è servito, conchiude disse la nobile Prefazione sua col dire, che i soli romanzi sono quelli, che pongon sempre in aria di vittoriosi tutti i loro Eroi: la verace storia però ci ricorda, che un Cesare, un Carlo XII, un Marefciallo di Turenna, un Principe di Condè &c., non tornarono sempre vincitori, ma alcuna fiata vinti, e battuti.

ESPERIENZE SOPRA I TENDINI.

S Coperto il tendine d' achille in più cani, e gatti, l' ho irritato, forato, bruciato, lacerato, tagliuzzato: ho questo sperimento rifatto ancora sopra forci, corvi, cornacchie, capretti &c., ne alcuni di questi animali ha mai data alcuna prova di sensitività.

Ho forato in entrambe le zampe il tendine d' achille ad un cane: in una, io lo avea scoperto del suo involto, e nell' altra lo avea lasciato della pelle coperto. Il cane sentì dolore nella gamba, nella quale il tendine era ricoperto della sua fodera; ma l' operazione fu sì pronta, che il dolore passò tosto. Nell' altra gamba, nella quale era il tendine nudo, l' animale non parve sentir nulla dello adoperato. Lasciato in libertà, fece le sue piccole scorriere senza inciampo; camminò su i piedi posteriori come avea costume di fare prima dello sperimento.

Ho tagliato interamente il tendine d' achille ad un cane, senza che in questa incisione si lamentasse; eppure ogn' un vede quanta forza ricerchisi in questa operazione. Zoppicò; ma questo accidente cessò tra non molto. In simil maniera scopersi il tendine estensor della tibia, lo lacerai, e in più modi a cimento lo misi: lo punsi, lo tagliai, e gli conficai dentro il ferro, senza che il cane sentisse dolore nel tendine, il quale sanò con facilità nel tempo medesimo, che ancor sensibili erano all' animale le ingiurie alla pelle patite.

Scopersi il tendine d' achille ad un' altro cane; lo tagliai a traverso fino alla metà della sua larghezza, lasciando l' altra metà intera: il cane non si accorse della ferita fattagli, e camminò senza impedimento; corse, saltò, e scese i gradini di una scala senza dolore. Rifeci la medesima operazione il susseguente giorno nell' altro tendine d' achille dello stesso cane, tagliando in due la metà della sua larghezza. Questa seconda ferita alla prima unita, non impedì in nulla lo animale, e fece conoscere, che non pativa, correndo senza pena colli due tendini mezzi tagliati. Non si debbono dunque temere le conseguenze d' una ferita, nella quale si trovasse il tendine mezzo tagliato. Le occasioni di fare queste sorte di sperimenti sugli Uomini sono rare: non pertanto ne ho parecchie da produrre, che mi sono state partecipate da miei amici.

Nel 1748. di Maggio uno Studente di Legge restò ferito in una mano, nella cui ferita il tronco dell' arteria radiale era restato tagliato sopra il pugno. Quest' arteria di tempo in tempo tramandava sangue, il quale si coagulava tra gl' interstizj de' muscoli. Si volle fermare il sangue coll' olio di trementina; ma questo astringente alzò la cuticola, e cagionò dolori sì crudeli, che convenne abbandonarlo. Ci era nel fondo della ferita il tendine del supina-

tor lungo interamente scoperto: questo tendine non cagionò alcun dolore all' Infermo, nè quando l' olio lo toccava, nè quando sopra d' esso si usavano le filacciche, nè quando la sonda in esso lui s' incontrava. Sanò il Malato legandogli per mio consiglio l' arteria sopra la ferita. E questa fu la circostanza nella quale cominciai a sospettare della insensibilità del tendine.

Nel 1751. Mons. Erius giovinetto di qualità si aperse un dito accidentalmente, e con esso la vagina delli due tendini flessori: fatta la suppurazione, i due tendini restarono scoperti. Incoraggiato dalle mie sperienze fatte sugli animali, presi con una pincetta il tendine del perforante in presenza del Chirurgo, e lo strinsi più volte, nè il ferito Cavaliere si accorse mai di ciò, che io gli faceva, nè questi tentativi valsero a ritardargli la guarigione.

Una Donna fu da un ladro ferita, ed era in perfetto sentimento, se non che, tale ferita le avea scoperto il tendine dello estensore dell' indice: Mons. Zimmermann non si lasciò fuggire quest' occasione; e pregò la medesima a stare attenta a ciò, che intendeva di farle, ed avvertirlo se avesse sentito dolore in tempo dell' operazione, ch' era per intraprendere. Ciò posto Mons. Zimmermann assalì il tendine, lo irritò, lo fendette, e l' Inferma costantemente rispose, addimandata, ch' ella non sentiva alcun male. Questo sperimento, è tanto più convincente, quanto che la cute di questa femmina era di un senso squisito.

Mons. Farjon Medico della Carità di Montpellieri, ha avuta la bontà di comunicarmi la seguente esperienza. Eccovene le sue medesime parole.

„ Io fui chiamato sul principio del Mese di Ottobre dell' Anno 1755. per vedere nella strada de' Rigattieri N. N. il quale trovai in letto con una ferita sensibilissima della grandezza della palma della mano, situata alla parte esteriore et inferiore della gamba destra. Nel mezzo di questa ferita si vedeva il tendine del mediano, e del piccolo peroneo, e quello dell' estensor grande del dito a lui corrispondente, scoperto alla lunghezza di un pollice. Mons. Boissiere Maestro Chirurgo, cui era stata fidata la cura del Malato, nello instruirmi intorno le cause di questa ferita, fecemi osservare, che li tendini, che si vedeano scoperti, non lo erano, se non se, a cagione della caduta di una crosta, che loro copriva, dopo la quale l' ulcera si era così sensibil renduta, che l' Infermo non potea fu d' essa tollerare un legger piumacciuolo, non che appena un po di pezza impiastricciata di ceroto di Galeno. Su due piedi mi risolsi di chiarirmi, se li tendini scoperti avessero mai contribuito ad una tanta sensibilità dell' ulcera; oppure s' egli no erano spogliati di senso del tutto. A tale effetto feci porre un piumacetto secco fatto con filacciche grèggie sopra il tendine, e sul rimanente dell' ulcera un ritaglio di pezza fina come ordinariamente far si solea. L' Infermo sopportò senza gran dolore

dolore la medicazione, comechè poco ferma tenesse la sua gamba nel letto. La susseguente mattina convinto da questa prova, che il grave dolore non proveniva, che dalli tendini scoperti, spogliai colle forbici, e secondo l'arte, i medesimi della loro esteriore fodera, (e ben riconobbi che erano del tutto spogliati, e dal loro colore, e dalla loro consistenza, e dalla loro pieghevolezza nelle flessioni del piede) e così spogliati, alzatone uno con un uncinetto, lo afferrai colle molette, lo strinsi a grado a grado vivamente, e tutto senza che l'Infermo se n' accorgesse. Incoraggiato da questo tentativo, punsi lo stesso tendine, e nell'atto stesso sollevailo colla punta del detto uncinetto, nè per ciò il Malato sentì dolore alcuno. Lo punsi nuovamente colla punta di un ago, e lo forai quasi da parte a parte, ed il Paziente mi assicurò sempre, che non sentiva nulla. Quando però poggiava su i labbri dell' ulcera i ferri adoperati ne' sperimenti, il dolore si faceva così vivo, che al Ferito conveniva gridare fortemente. Dopo queste sperienze che sono sicuramente convincentissime, feci porre lo apparecchio giusta il mio metodo.

L' Infermo passò la notte assai tranquillamente, e non risentì più il dolore della notte passata. Il giorno dopo, scoperta l' ulcera, lasciai cadere in più volte sopra uno de' suoi tendini, dopo averlo alzato con un uncinetto, due gocce d' olio concentrato di vitriolo, senza che il Malato sentisse alcun dolore. Non si lagnò che una sola volta, ed ancor vivamente, e fu in circostanza di aver l' olio di vitriolo toccate le carni, e ben se ne accorgemmo dalla crosta nera, che sopra di esse si formò: accidente, che mi fece andar più cauto, nello adoperare un tale caustico, e porre, per guarentirmi da esso, attorno ai margini della piaga filacciche raspate. Con tale cautela, usai di nuovo sopra una parte di questo tendine, che non era stata toccata dall' olio di vitriolo, una picciol pietra da cauterio, e ve la tenni sopra per lo spazio di una seconda (1) o due, e il paziente mi assicurò sempre, che non sentiva alcun dolore.

Ho ripetute tre volte queste sperienze e sempre collo stesso successo alla presenza de' M. M. Roche, Nogaret, e Mejen Dottori in Medicina, e di Mons. Boissiere Chirurgo.

E stata sempre mia attenzione di non applicare l' olio di vitriolo, e la pietra da cauterio sopra le parti di questo tendine, che fossero state toccate, temendo, che non mi si opponesse che essendo stati li tendini cauterizzati, non potevano essere sensibili. E quantunque con queste replicate sperienze abbia cauterizzati leggermente i tendini in quasi tutta la loro esterior superficie; ciò non ostante, non ho alcun pregiudizio portato a questa ulce-

„ ra,

(1) La sessantesima parte di un minuto.

„ ra. E siccome era questa di una non poca estensione, ho perciò veduti i tendini sfogliarsi, prima, che le carni fossero competentemente cresciute per coprirle. Fin qui Monsi Farjon.

Io penso di aver riportate quindi tante sperienze, quante forse non eran mestieri per provare, che possonsi tagliare, bruciare, distruggere i tendini degli Uomini, e degli Animali, senza alcun danno, e che per conseguenza li tendini sono del tutto spogliati di senso. Nè perciò s' hanno a temere le loro ferite; imperciocchè l'esperienza d' ogni cosa maestra, chiarissimamente ne insegna, ch' elleno guariscono benissimo fuor di qualunque sinistro. Aggiungasi, che provan anco gli allegati fatti, che li tendini altro moto non hanno; se non quello, che vien loro comunicato da' muscoli, che sono assolutamente senza irritabilità, e che irritati non si muovono, nè muover fanno il muscolo di cui ne son parte.

Per secondare l' intenzione del chiarissimo Sig. Hallero, il quale ha disposta questa seconda memoria stampata in Losanna nel Mese di Novembre dell' anno 1755. in forma di Diario, son d' avviso che non verò biasmato, se in qualche maniera supplirò a quello, che manca in questo compendio notando di volo il numero de' fatti in succinto descritti, ed aggiugnendo que' che dal celebre Signor Vandermonde sono stati ommessi. Il perchè piacemi, che il leggittore sappia, che dall' Anno 1750. sino alli 18. Aprile 1752., 36. sono state le sperienze, le quali trovo numerate, 18. cioè in tanti cani di varia età, e genere adoperate, 3. ne' Gatti, 3. su' Capretti, 2. in Topi o Sorci, 4. sopra Corvi, o Cornacchie, e finalmente 6. in Corpi Umani di vario genere. Tra quest' ultime, di due non ne fa menzione il chiaro compendiatore, e forse, perchè leggonsi altrove, le quali si devono al Sig. Bornemannio giovane esperto in Cirugia, che trovavasi in Gottinga al tempo del Sig. Haller, ma che poi passato in America, ha colà piantata, e stabilita una nuova Colonia col nome di novella Gottinga: non di meno siccome può sopra loro cadere qualche eccezione; quindi è, che ho giudicato opportuno il riferirle pur anco. L' una fu fatta in Gottinga alla presenza del dotto Maestro in un Cavapietre, o vogliam chiamarlo Scalpellino, cui restò sfiacciato un piede sotto un gran masso sdrucciolato giù da una Collina, per la quale gravissima offesa dovendo passare al taglio della parte, patì assicurarsi della insensibilità de' tendini, non solo col segarne parte a traverso colla ferra, ma col toccarne altri in varj modi, senza dolore, e risentimento del Paziente, che fuori della gran piaga ciondolanti trovavansi. Notifi che gli sperimenti comprendentisi in questo primiero fatto, vengono dal Signor Haller riputati imperfetti; tra perchè forse la gagliardissima ammaccatura rilevata in tutta la estensione del piede; lo stupore in esso dal corpo premente indotto; la mortificazione, cui era passata la parte &c. dovevano avere alterati, e malconci i tendini; e perchè cimenti adoperati in parti così malmenate, sembravano ragionevolmente non averli a tenere per decisivi.

L' al-)

L'altra che trovassi pur essa, prima nel Sig. Castell, indi nel Diario del testè nominato dottor Uomo in poche linee notata, fu fatta dal mentovato Bornemann nella sua nuova Gottinga in America sopra una Servente, la quale restando da un grave peso soprafatta, e malmenata in un pollice, fece sì, che l'ammaccatura probabilmente a suppurare passando, e per ciò a scoprir tendini, campo avesse di porli a cemento, e così su lor cimentando, agio di confirmare la insensibilità Halleriana. Il caso trovassi, come ho detto, nella dissertazione del Castell, onde in essa puossi leggere. E va bene. Non vedo però per essere del valore, e pressochè simile all' altro, come s' abbia ad ammettere senza eccezione; per mio, ed altrui avviso, può fare sospettar molto quella di avere col tendine punta, forata, e in varie guise messa alle prove la sua nervosa cellular foderà, che in istato naturale è sensitivissima, senza che l' Inferma desse segno del più menomo incomodo. Dunque, tali erano le urgentissime circostanze, che accompagnavano questo secondo caso, che niente più del primo sembra decidere.

Esperienze sopra i Legamenti, le Capsole delle articolazioni, ed il Periostio.

Questi sperimenti sono stati fatti sopra il pericranio, il periostio della tibia, quello del tarso, e sopra il legamento, e l' articolazione del ginocchio. Ci sono cautele da prendersi riguardo al pericranio; imperciocchè non è tanto agevole da decidere se questa membrana abbia senso, o no. Ci è nell' Uomo, e nell' Animale un gran numero di nervi, che si avanzano da tutte le parti sotto la pelle della testa, e sotto la cuffia aponeurotica. Questi nervi partono dal quinto, dal settimo pari del cervello, e dal secondo e terzo della nuca. Una irritazione fatta a questi nervi, può imporre, e far sì, che attribuir si potesse al pericranio una sensazione, la quale è loro propria. Si potrebbe ancora andare errato, se per sorte una goccia d' olio di vitriolo venisse a toccar la pelle. Quanto agli altri periosti, io non ho in loro trovata difficoltà alcuna. Il luogo il più facile da scoprire, è la parte interna della tibia, oppure al tarso. Niente non è più facile di levare la pelle di queste parti, e di scoprire il periostio per irritarlo, o bruciarlo, e non si è mai trovato nulla di dubbioso in queste tali esperienze.

Ho toccato il pericranio di un cane coll' olio di vitriolo, e ha mostrato di dare segno di senso. Le medesime esperienze, che ho fatte sopra un altro cane, sono riuscite diversamente, perchè l' animale non ha la più menoma cosa sentito. Finalmente un gatto, a cui ho irritato il pericranio nudato, ha dato segni di senso.

Scoperfi un altro giorno in un gatto vivo ed impaziente la parte inferiore dell' estremità del tarso, e il periostio colli legamenti, che coprono le ossa, le quali parti toccate coll' olio di vitriolo, e bruciate, l' animale non miagolò in conto alcuno. Sco-

Scoperfi il perioftio della tibia, e la capsola dell' articolazion del ginocchio; aperfi detta capsola, e feci nella sua cavità tant' olio di vitriolo grondare, quanto mestieri era per coprirla tutta la superficie delle ossa, della cartilagine, del perioftio, e del pericondrio, interno; insomma tutto fu cauterizzato, e l' animale non gridò mai: quando però toccai i nervi, che discendono colli tendini de' flessori del piede, divenne così furioso per lo dolore, che mostrò segni della più disperata rabbia.

Scoperfi una porzion del perioftio del talone, un poco prima di giugnere al tendine d' achille in un forcio. Denudai in un cane l' articolazion del ginocchio, il legamento della rotola, ed i legamenti crociati; irritai queste parti collo scalpello, e l' olio di vitriolo. Tutti questi animali restarono nella loro tranquillità; quantunque l' ultimo abbia sentito vivamente le picciole incisioni, che aveagli fatte alla cute.

Tagliai ad un cane la capsola dell' articolazione del ginocchio senza dolore della parte dell' animale, il quale era sensibilissimo alle offese della cute. Irritai il perioftio d' un cane scoperto che l' ebbi, il quale si lagno pochissimo; ma questo animale non cessava di gridare, anche quando io non lo toccava; e radoppiava le sue grida allora, che gli toccava la cute. Sanò della sua ferita senza rimedj, e senza accidenti, nè restò impedito ne' suoi moti, nè salti. Ebbi lo stesso successo in molt' altre sperienze fatte sopra cani, capretti &c. ne' quali irritai, bruciai, e lacerai i tendini estensori della tibia, la capsola del ginocchio, ed il perioftio. Cauterizzai ancora qualche volta il perioftio, e li tendini con una pietra infernale, ed il sublimato corrosivo. Questi animali non gridarono, nè parvero sentire alcun dolore, se non allora, ch' io le toccava la cute. M' incontrai però in molti di questi bruti, i quali erano più portati a gridare, e a lamentarsi, che altro.

Scoperfi ancora il pericranio ad un altro cane, senza che l' animale mostrasse alcun patimento. Denudai conseguentemente la capsola del ginocchio dalla parte esteriore, ed il legamento a questa corrispondente. Forai la poc' anzi detta capsola con un ago da imballare, la punsi, feci passare l' ago a traverso dell' articolazione fino dall' altra parte, nè lo animale parve sentire il dolore, se non quando la punta dell' ago arrivò a pungere la pelle dalla parte interna. Replicai la medesima esperienza sovra un capretto, la quale riuscì a maraviglia.

Monf. Castell rapporta una infinità d' altri sperimenti, che s' accordano perfettamente con i miei. L' evenimento è sempre stato lo stesso; e questi animali non hanno dato alcun segno di dolore.

Un Soldato avea rilevata nella fronte una ferita d' archibuso carico a pallina. Assisti alla medicazion prima, ed instrussi il Chirurgo per ciò, che far dovea. Pregommi a sodisfarmi in quest' occasione sulla sensitività del perioftio: lo toccai, e lo compresi colla son-

fonda, senza che al Soldato riuscissero sensibili i miei tentativi.

Monf. Schlotien Chirurgo Maggiore del Reggimento de Blok, cognato di Monf. Walstorf, fu costretto di recidere la gamba ad una donna. Quando l'operazione fu al raschiamento del perioftio, avvertì l' inferma, che doveva or ora tagliare una parte, la cui sensitività era mestier di scoprire, e pregolla a stare attenta al momento nel quale l'avrebbe tagliata. Stett' ella in attenzione, e rispose non aver sentito alcun male; ciò che confermò ad operazion terminata.

Eccovi una buona serie d' esperienze, le quali concorrono a provare, che il perioftio raschiato, tagliato, lacerato, bruciato che sia, non ha mai cagionato alcun dolore. Mi sono incontrato in animali, i quali co' loro lamenti parevano aver sentite le operazioni, che intorno loro eranfi fatte. Alcuni altri risultati, e sopra tutto lo sperimento fatto sopra un Uomo sembravano mostrare, ch' egli era stato insensibile. In queste tali ambiguità, stimo meglio di non pronunciare assolutamente ne sopra l' una, ne sopra l' altra parte, quanto alla sensitività del pericranio, e di rimetterne la decisione ad altre ulteriori sperienze.

Non posso però disimpegnarmi dal non far osservare in quest' occasione, che tutti li cani, capretti, e gatti ne quali ho aperta, incisa, e bruciata la capsola dell' articolazion del ginocchio sono guariti con una facilità sorprendente, e che una nuova cellulosità, ha loro saldata la cute contro le ossa. Questa sperienza merita d' essere confermata sotto un altro punto di veduta. Non ho avuto il necessario comodo per venire in cognizione se questi animali si risano senz' anchilosi, e se da questo evenimento si potesse concludere qualche cosa riguardo all' uomo, nel quale generalmente le ferite delle articolazioni passano per pericolose, e per difficili di guarigioni.

La serie delle sperienze riportate dal Sig. Haller nella sua memoria sotto la classe de' legamenti, capsule articolari, e perioftio, sono al numero di 23. Sole 21. vedonsi fatte sopra animali, 13. cioè in Cani di varia età, 3. in Gatti, 1. in un Sorcio, e 4. in Capretti. Le altre due sono state tentate in Corpi Umani, le quali non riferisco, perchè trovansi già descritte. Anch' esse queste sperienze, le quali sono indiritte a positivamente stabilire la insensività delle menzionate parti, che che si pensi da Cerusici quanto alle ferite delle articolazioni, furono cominciate nell' anno 1750., e terminate colli medesimi felici succedimenti nell' 1751. d' Aprile.

Esperienze sulla Dura Madre, e sulla sua insensività.

MOnf. Zinn, e me avendo denudata la dura madre in un cane, la irritammo colla punta di un ferro, e col sublimato corrosivo. In questi tentativi l' animale non gridò per niun conto, non soffertè alcuna convulsione; ne diede alcun segno di dolore,

Suppl. Part. I.

B

nel

nel tempo, che sentiva vivamente il pizzicamento della pelle.

Scoperfi la dura madre con un scalpello, et un piccol martello; perchè questo strumento compie con maggior prestezza all'operazione di quello faccia il trapano, e scopre molto meglio la detta membrana, nè l'offende giammai per poco che sappiasi adoperare. Sopravviene gli è vero, così adoperando, non di rado una emorragia; ma o cessa da se medesima; o si ferma agevolmente con una spugna inzuppata d'acqua vita. In questo stato irritai la dura madre colla punta di una lancetta, e coll'olio di vitriolo, senza che lo animale sembrasse patire nè dolore, nè convulsione. Ho ripetute queste sperienze sopra cani di diverse grandezze, sopra gatti, forci, e capretti: Scoperta la dura madre, l'ho punta, lacerata, tagliata, bruciata, cauterizzata, senza che alcuno di questi animali abbia mai data la più menoma prova di sentire. Monf. Walsford rapporta sette sperienze che ha fatte in mia presenza; Monf. Loeber ne cita un'altra; e Monf. Zimmermann alcune altre ancora. Tutti questi esperimenti sono riusciti colla medesima evidenza, e senza lasciar luogo di formare alcun ragionevol dubbio; ed io li credetti bastanti per mostrare incontestabilmente la insensibilità della dura madre. Ecco un altro sperimento, che Monf. Zinn ha avuto occasione di fare sopra una donna.

Una carie, o sia guastatura dell'osso frontale originata da veleno venereo, avea in una donna messa alla scoperta la dura madre. Monf. Zinn la toccò, la compresse, l'irritò, e l'inferma, nulla sentì, fin che la dura madre era sola toccata, sentì ben poi e vivamente, quando le toccò le carni vive.

Non ho riguardo di raunar quinci li frutti della mia lettura, et io mi contenterò di soli tre Autori, i quali non hanno scritto se non dopo l'esperienze. Monf. de la Motte (a) assicura, che non ha trovato alcun senso nella dura madre di quegli infermi, ai quali ha aperta questa membrana coll'operazione del trapano. Monf. Pelaisse (b) ha veduto una pietra cinque giorni restarsi fitta nel Cranio, e nella dura madre, senza, che per tutto questo tempo il malato fosse soggetto alla più menoma diminuzion de' suoi sensi, o alla più piccola convulsione. Monf. Petit (c) il Medico rapporta, che un cane, cui alcune scheggie appuntite pungevano la dura madre, ed alla quale erano restate appiccate, non ha che la paralisia patita, la quale per mio avviso non d'altronde ripeter si dovea, che dalla compression del cervello. Tutti questi avvenimenti aurebbono dovuti essere diversi e malagevoli, se la dura madre fosse o la sede, o il principio del senso, o del moto.

Dall'

(a) Chirurg. Complem. Tom. II. (b) Osserv. di Chirur. pag. 204., e seg.
(c) Lettere ad un Med. pag. 10.

Dall' Anno 1748. cominciando in Gennajo, fino al 1752. d' Aprile; trovansi riportate per ciò che riguarda la insensitività della dura madre 14. sperienze accuratamente fatte, 10. in Cani di varia età, e genere, una in un Gatto, una in un Topo, una in un Capretto, e finalmente l' ultima in una Donna, fatta da Mons. Zinn, della quale nulla dico, perchè n'è già stata fatta la relazione. Alcune utili riflessioni si potrebbero fare sopra le riportate osservazioni de' M. M. de la Motte, Delaisse, e Petit, ma non è mio proposito. Il leggitor erudito e profondo, col suo fino accorgimento varrà a supplire esso a cotesta mancanza, molte essendo le circostanze di alcune considerazioni degne, non che più fatti contrarj, che si trovan per entro le carte di gravissimi Autori, non che negli atti delle più famose Accademie, ed io ne accennerò un bellissimo accaduto due anni addietro, se qui tornasse in acconcio.

Esperienze sopra il Moto del Cervello analogo alla respirazione.

IL Signor Haller per procedere ingenuamente a parlare del moto del cervello, dipendente dal riflusso del sangue, comincia dalle sperienze fatte sul modello di quelle di Mons. Schlickting, le quali oltre il non essere delle più agevoli da farsi, non sono sempre d' una riuscita sicura. Riportate queste, passa alle differenti cause del riflusso del sangue, che sono le seguenti. Il riflusso del sangue dell' orecchietta destra; l' espirazione, che comprime il torace; l' attrazione del diaframma, che fa discendere, e che comprime la vena cava nella inspirazione; e la facilità che trova il sangue ad uscire dalle vene, e ad entrare nel polmone nel tempo della inspirazione; ciò che sgonfia allora le vene, e la jugulare ancora come le altre.

Da molto tempo avea osservato un moto nella dura madre, il quale era stato da me attribuito alla pulsazione delle sue arterie, e di quelle del cervello; sentimento tenuto ancora dal Boerhaave, e non è senza fondamento. Si vedono in effetto battere queste arterie, quando si è levato il cranio, e sono loro medesime, che imprimono qualche moto nella dura madre, per tutto il tempo ch' ella resta attaccata al cranio. Convien rimuoverle dallo stato nel quale sono state poste dalla natura, per osservar in loro un movimento analogo a quello della respirazione.

Essendo stato trapanato il cranio ad un cane, osservammo con Mons. Zinn il moto della succennata membrana, il quale non restò interrotto quando fu lacerata, e bruciata. Dipendea questo dalle arterie del cervello, le quali alzavano questa parte nella loro diastole, e l' abbassavano notabilmente in tempo della sistole.

Aperfi il cranio ad un cane, e scopersi la dura madre, la quale trovai in istato di quiete: solamente dalla pulsazion delle arterie veniva alzata, ed il cervello con ella. E siccome questo moto non s' accordava con quello descrittoci da Mons. Schlickting, mi av-

vissai di separarla, e deprimendola col dito, fu sensibile all' animale quest' operazione in maniera, che gridò. Tostamente, che fu superata quest' appiccatura, vedemmo non senza stupore per un buon quarto d' ora il cervello seguire le alternative della respirazione. Quando l' animale respirava, (a) il cervello si abbassava nel cranio, quasi, seguendo le leggi dell' attrazione, vi fosse tirato, in quella guisa a un di presso, che succede al polmone, benchè con minor violenza, quando nel tempo della inspirazione si concentra nel petto dopo, che si è aperto. Nella espirazione il cervello si alzava colla dura madre, e riempiendo del tutto la cavità del cranio, alzava per fino il dito, che comprimevalo. Noi distinguiamo facilmente questo moto da quello delle arterie, imperocchè, è tre o quattro volte più frequente. Questo moto non è l' effetto di una forza appartenente alla dura meninge; fuissete quand' anco sia levata, ed il cervello coperto solamente dalla pia, alzasi e discende egualmente nel tempo, che lo animale, espira, od inspira. Aprimmo eziandio occasionalmente il seno della falce mesoria, e vedemmo il sangue spicciarne senza sforzo, senza salti, e senza pulsazione.

Aprisi il cranio ad un cane senza malmenare ed offendere la dura madre, nella quale non apparve alcun moto, fin tanto che restò appiccata al cranio. Ma quando l' ebbi separata, e distaccata col dito, cominciò a far moti analoghi alla respirazione, i quali durarono per buona mezz' ora (tempo che noi impiegammo a bene osservare tutto con attenzione,) ed il cervello si alzava durante l' espirazione con tale forza, che respingeva il dito, che sopra vi andavamo posando. Nella inspirazione il cervello discendeva, e lasciava nel cranio uno spazio vuoto. Allora credetti aver veduto abbastanza per andar persuaso, che il moto del cervello fosse bastantemente provato.

Quantunque distratto per altri affari, vidi meglio questa volta sopra un cane, che io nol bramava. Quando la dura madre fu staccata dal cranio, il cervello entrò in moto, seguendo le alternative della respirazione: gonfiavasi nella espirazione, e riscendeva nella inspirazione. Tagliai una porzion della dura madre, e scopersi la sostanza corticale; ma il moto del cervello continuò a farsi vedere regolarmente come prima.

Feci un'altra esperienza sopra un gatto, che rianimò le mie speranze. A dir vero non ebbe alcun moto nel cervello, fin che lasciai la meninge appiccata al cranio, anche in tempo che lo animale molto gridava; ma quando ebbi messa in libertà la detta madre membrana coll' avere ad essa tolte le appicature; il cervello cominciò a seguire i moti della respirazione, alzandosi nel tempo, che

(a) Sono da tre anni, che Mons. Lorry Medico ha fatta questa esperienza, la quale comunicò all' Accademia delle Scienze, in una eccellente memoria che lesse.

che l' animale espirava l' aria, e riscendendo, quando per empire il polmone l' inspirava. Alzata la dura madre, continuarono non ostante i detti alternativi moti nel cervello coperto solo dalla pia. Quando però l' animale fu sul punto di morire, il cervello non si gonfiò più, ne si sgonfiò, anche in tempo de' suoi ultimi lamentevoli gridi.

Ho replicate queste sperienze sopra cani, e gatti, e non mi sono sempre riuscite. Ho osservato, che questo movimento non avea luogo, se non se, nelle forti inspirazioni. Pensai per questo effetto di strozzare uno di questi animali, nel quale non avea osservato questo movimento, per forzarlo a respirare con maggior sforzo. Lo feci, e riuscì, e l' elevazion del cervello nella espirazione, e lo abbassamento che si fa nella inspirazione furono allora visibilissimi.

Volli vedere se il cervelletto di alcuni gatti, avesse seguito egualmente il moto della respirazione; ma non mi riuscì: non vidi che una specie di restringimento, pel quale il detto cerebello allontanavasi dal cranio.

Risulta da tutte le mie sperienze, e da quelle di Mons. Walstorf fatte sopra lo stesso soggetto: Primo, che per tutto il tempo, che la dura madre resta applicata al cranio, non vi si scorge alcun moto, non più che nel cervello, toltone la pulsazione delle arterie: Secondo, che quando si è staccata la dura madre dal cranio, vi si possono rilevare due moti differenti; il primo viene dalla pulsazione delle arterie del cervello, l' altro seconda li periodi della respirazione: Terzo, che il moto non è sempre sensibile, a cagione di una infinità di circostanze; ch' egli divien più forte, quando la respirazione è più forte: Quarto, che il seno della falce messoria non ha punto di pulsazione.

Per provare il moto del cervello analogo alla respirazione, porta il Sig. Haller venti e più sperienze fatte in diverse bestie ad imitazione di Mons. Schlickting., che hanno il loro principio fino dall' anno 1748. e terminano in Agosto 1752., 13. sono adoperate sopra cani di varia età, e genere, 7. sopra Gatti, 3. ne' Sorci, 1. su d' un Capretto, 1. sopra un Colombo, e due altre cavate da Mons. Walstorf, che avea osservato in una talpa, tutta la massa del cervello e cervelletto alzarsi nella respirazione, e deprimersi nella inspirazione, e poco dopo in un cane. Mons. Lamur ha fatti pur esso molti esperimenti su questo particolare che combinano a maraviglia con quelli del chiarissimo Sig. Hallero, e que' di Mons. Walstorf, dalla cui serie di sperienze unite, ricava il dotto Fisico sei risultati, che Mons. Vandermonde ha ridotti a soli quattro, come s' è veduto.

Esperienze sopra il Moto del Sangue venoso analogo alla respirazione.

SCoperfi la vena cava ad un gatto tra il fegato e li reni; e vidi distintissimamente, che questa vena discende verso li reni, nella inspirazione, ch' ella percorre tre o quattro linee nello scendervi, e ch' ella risale per lo mezzo della espirazione. Nello stesso tempo, che questa vena discende, ella si vuota ed impalidisce: ella si gonfia, si fa tonda, s' alza, e si riempie di sangue quand' ella rimonta. La medesima cosa succede, quando, anzi che di sangue, si riempie d' aria. Da tutto questo cominciai a persuadermi, ch' effettivamente il sangue gonfia la vena per mezzo della inspirazione.

Per sodisfarmi sulla vera causa del gonfiamento del cervello, che arriva nella espirazione, mi piacque di vedere, se la medesima alternativa avesse luogo nella vena cava superiore. Prevedeva bene, se gonfiava ella egualmente colla inferiore nella espirazione, che non farebbe stato mestieri cercare altra cagione intorno alla elevazione del cervello osservata nello stesso momento. Scopersi dunque la vena iugulare del cane, e non mi pareva che avesse alcun moto. Aspettai che lo animale respirasse; ed allora vidi costantemente, e con tutta evidenza, e per un tempo considerabile la vena iugulare gonfiarsi, riempirsi di sangue, diventar tonda in tempo della espirazione, ed appiarsi e scolorarsi quando l' animale respirava. Aperi il petto d' un forcio, e vidi la vena cava toracica, il cui tronco è locato tra il cuore, ed il diaframma, ed è di una lunghezza considerabilissima ne' quadrupedi, divenire alternativamente pieno e vuoto secondo che l' animale espirava l' aria o l' inspirava. Non trovai nella vena iliaca, nè nella crurale di un cane alcuna alternativa di gonfiamento analogo alla respirazione. Ho bensì veduto questo alternativo moto nella vena iugulare, nella omerale, e nel principio della iliaca. Oltre questo principio nell' addomine medesimo, e nella vena basilica, non ci ho veduto moto sincrono con la respirazione.

Trovomi avere diciassette esperienze, e Monf. Walstorf ne ha quattordici, che sono o le medesime, o che per lo meno hanno avuto un successo precisamente simile. Elleno concorrono a stabilire un movimento alternativo in tutti i tronchi delle vene de quadrupedi le più prossime al cuore. Queste vene gonfiano nel tempo della espirazione, e si disempiono in quello della inspirazione. E siccome queste alternative di replezione, e di vuotamento, o coll' Autore medesimo di evacuazione sono assolutamente le stesse nel cervello, il quale si vede alzare nel tempo, che le vene e sopra tutto la iugulare si riempiono di sangue, ed abbassare, allorchè le vene perdendo il loro si vuotano; quindi è, che sembra evidentissima cosa, che il gonfiamento e lo sgonfiamento alternativo del cervello nasco.

nascono da quello delle vene. Resta da cercarsi la ragione, che lega questa alternativa a quella della respirazione. Noi ne abbiamo scoperta una, la quale consiste nel diaframma, il quale tragghe con lui la vena cava, e la comprime, et un'altra, che è la pressione del petto, la quale fa refluire il sangue venoso, facendolo uscire dalle vene del petto.

Tra gli sperimenti, che al numero di 17. porta il Sig. Haller per provare il moto del sangue venoso relativo alla respirazione, molt' altri ne accenna di Monsi. Wulstorf, e qualeb' uno di Monsi. Sproegel. 13. ne ha fatti sopra varj Cani, si d'età, che di genere, 2. in Gatti, 1. in un Topo, un altro in un Colombo. Cominciano essi nel 1751. in Novembre, e terminano in Ottobre dell' Anno 1754.

Sopra la compressione della Vena Cava fattale dal diaframma.

LA vena cava si fa più lunga, e più piatta quando il diaframma scende; ella divien più corta, allora che sale ancor dopo, che si è aperto il petto dell' animale. E' evidentissimo, che il diaframma tragghe seco la vena cava e la fa discendere seco stesso verso li reni. Questo è quello, che ho osservato dopo l' apertura di più differenti animali.

Tre sole sperienze porta in comprova di questo fatto. Una in un Gatto, l' altra in un Capretto, e l' ultima in un Cane. Questi esperimenti potrebbero servire a spiegare lo appianamento e la evacuazione della vena cava, addominale, e toracica. Ma elleno non danno alcun lume sopra le alternative di gonfiamento, e d' inanizione, che altro non sono, che azioni sincrone alla respirazione, che si scopre nelle vene locate sopra il cuore, sulle quali il diaframma non ha potere. Cereberebbsi la ragion di questo fenomeno.

Sopra il moto del Cervello dipendente dalla espirazione.

IO vidi distintissimamente un porchetto di latte espirare per lo mezzo di scosse, le quali procuravano restringimento al petto; queste scosse forzavano il sangue ad uscire dal torace, e a gonfiare la vena ingulare, la fuclavia, e l' omerale. La dilatazion della cavità testè detta, che secondava queste compressioni, permetteva al sangue di risalire nel petto, e di abbandonare le vene poc' anzi nominate. Lo stesso moto alternativo restò nella sua totalità nel tempo, che il cuore e le arterie continuavano a pulsare, quantunque avessi aperto il petto.

*Con due sperimenti fatti, il primo sopra un Porchetto di latte, P
al-*

alto sopra un Gatto, ha fatto vedere il Sig. Haller quanta parte abbiano a questo fenomeno le forze della espirazione scoperta da Mons. Lammur. Con tutto ciò, non è men vero, che l' inspirazione ha pur essa, un' altra maniera di concorrervi. In questo periodo, il sangue entra più facilmente nel polmone, che in quello della espirazione. L' esperienza di comun consenso attribuita a Mons. Hook, e confermata ne' fatti riportati al numero 476., 478., 482., 492. della sua intera memoria, ne fanno piena fede. Quando il sangue non passa più per lo polmone, e che il ventricolo sinistro non vibra più pulsazioni, non bassi, che a gonfiare il polmone, ed a far uso di una grande inspirazione per rianimarlo. Vedrassi allora il sangue, che non passava più pel viscere anzi detto, riprendere il suo moto, gettarsi nel ventricolo sinistro, e farlo muovere. Da tutto questo con ragion s' ha a conchiudere, che l' inspirazione ajuta anch' ella a facilitare il passaggio del sangue per lo polmone, diminuendo per necessaria conseguenza l' opposizione, che trova il ventricolo destro a scaricarvisi, e minorando per la medesima ragione quella, che la vena cava ha per vuotarsi. Tutte queste cagioni unite insieme aprono facilmente alli rametti della vena cava, e conseguentemente alla jugulare una nuova facilità per derivare il loro sangue nell' orecchietta destra, ed ajuta a disempire il cervello. Dice in oltre il chiarissimo Autore, che gli sembra avere bastevolmente il fenomeno, e le sue cause esposte; e che perciò non si ha più, che a porre in chiaro un non so quale gonfiamento della vena jugulare diverso da quello, che seconda l' espirazione, e che cagiona il ristuffo del sangue, il quale ritorna dall' orecchietta destra nelle vene le più vicine del cuore. Ha però numerose sperienze da esporre al loro luogo, a confirmazione di questo ristuffo.

Sopra il sangue refluo, che torna dall' orecchietta destra.

A Persi il petto d' un gatto nell' atto, che si accostava ad espirare. Con ciò osservai una specie di pulsazione nella vena jugulare, la quale trovavasi alternativamente piena per una certa specie di ondeggiamento, che formava il sangue refluento dal cuore. La contrazione della orecchietta destra era quella, che faceva tornar indietro e mutar di corso al suo sangue, e che forzavalo a ripassare nella jugulare. Ritornai il moto al cuore soffiando aria per la vena cava addominale; cosa, che mi fece allora evidentemente vedere l' aria battuta col sangue rimontare, ed empire di una schiuma rossa la vena cava: staccavasi egli dall' orecchietta destra nelle sue contrazioni. Il cuore in un cane non batteva più che debolissimamente, ma l' orecchietta destra non contraevasi meno. La sua parte la più alta cacciava il sangue nella vena cava superiore, e la più bassa respingevalo nella cava addominale. La medesima cosa accadde, quando, anzi che di sangue, l' orecchietta, il cuore, e le vene restarono piene dell' aria, ch' io vi soffiai. Vidi chiarissimamente sopra una ranocchia l' orecchietta respingere il sangue e nelle vene
fu-

superiori, e nella cava fino al fegato. Legai le due grosse branche dell' aorta di una ranocchia, ed allora vidi il sangue ritornare dal cuore all' orecchietta, e da questa nella vena cava inferiore fino al fegato: pochissimo tempo dopo, la cava testè detta si contraeva, e riconduceva il sangue all' orecchietta. Questa alternativa continuò lungo tempo; nè mi maraviglio, perchè l' ho veduta in molti altri animali di simile specie.

Restami da prevenire il lettore contro le perniciose conseguenze, ch' egli potrebbe dedurre dalle mie sperienze. Quanto al moto del cervello, è evidente, che non ha luogo negli animali, la testa de quali è intera; imperocchè il cranio in tale caso resta totalmente riempito dalla detta viscera, e la dura madre è sì fortemente attaccata al cranio, che non è possibile, che si faccia alcun moto. Secondo, il ristuffo del sangue venoso, il qual viene dalla respirazione, non potrebbe essere molto considerabile in un animale sano, la cui respirazione non è sì violenta. In questo stato la compression del petto è debole, quanto è quella della natura; ed il ritorno naturale del sangue, che rinviene dal cervello, essendo più libero di quello sia nelle nostre sperienze, e resistente al ristuffo, deve per conseguenza o formontarlo, o per lo meno non permettere ch' egli sia molto valido, e forte. Sembra incredibil cosa, malgrado la poca resistenza delle valvole, come il buon ordine della circolazione permetta due moti contrarj ed esistenti nello stesso tempo ne' vasi medesimi. Alcuna volta, non mi è stato possibile di vedere ristuffo nello animale tranquillo, e solo l' ho cominciato ad osservare quando ha gridato, o ch' egli si è oltre modo sbattuto. Terzo, l' orecchia destra, non pare che dia luogo ad alcun ristuffo nell' ordine della natura. Rivengono allora da tutte le parti nuovi ondeggiamenti che a quello si oppongono, circostanza che fa, che il passaggio verso il cuore e verso il polmone sia più libero, che non lo è nelle estremità di un animale, il cui polmone sovente non lascia passare più sangue. Da ciò segue una resistenza, che ferma il sangue dell' orecchietta, e che può farlo refluire verso li grossi vasi venosi, alli quali, le estremità non inviano più la medesima quantità di sangue.

Per una specie di corollario ad undici sperimenti, ch' egli porta, 5. in Gatti, 4. in Cani, e 2. in Ranocchie in prova di quello, che s' era proposto di mostrare intorno al ristuffo del sangue venoso, che torna dall' orecchietta destra, non altro fa il Sig. Haller, prima di passare alla insensibilità della pia madre, che prevenire il lettore con alcuni utili avvertimenti, i quali già si sono posti, onde non habbia da precipitare a ricavarne dalle sue sperienze induzioni troppo letterali e servili, non che pregiudizievole a quello, che stabilisce colle sue esatte sperienze.

Esperienze sulla sensibilità della Pia Madre.

E' Cosa facilissima da far vedere, che il senso delle parti non dipende dalla dura madre. Essendo essa priva di senso come potrebbe, dico io, comunicarne alle parti insensibili? E poi come Monf. Zinn ha senz'altra eccezione dimostrato, e con sua gloria provato (a) ella non accompagna in alcuna maniera i nervi. La stessa obiezione non dona molto alla pia madre, la quale senza alcun dubbio involve cadauno de' fascetti midollari, il cui fardello è chiamato nervo: Non resta per altro, ch' ella non abbandoni qualche volta li nervi nel tempo stesso ch' eglino si avvicinano ad avere compiuto alle loro funzioni le più essenziali. Ed eccovi il perchè il nervo ottico si spoglia della sua pia madre la quale si estende a vestire la superficie interna della sclerotica, nel momento che la sua midolla passa per la lamina cribiforme dell' occhio per recarsi a fare la retina, organo immediato della vista. Ma per pormi totalmente in salvo dall' errore, ho giudicato necessarissima cosa di scoprire la pia madre ed irritarla per chiarirmi, se in effetto questa irritazione produceffe qualche dolore. Con ciò mi pareva, che non vi sarebbe stato più che contrariare in suo favore, se ella si fosse mostrata insensibile al cimento, come la dura madre.

Per questo effetto dunque scopersi ad un piccol cane la dura meninge, scoperta, la levai via colle forbici, indi bruciai la pia col butirro d' Antimonio: divenne ella ad un tale contatto tutta negra, ed il mercurio coperse la crosta d' una membrana che pareva d' argento. L' animale si mantenne vigoroso, non diede segno di alcun dolore, nè si mosse alcuna convulsione. Non tardò però questa a manifestarsi, e fu allora, che ebbi toccata ed offesa la parte midollare del cervello. Replicai la medesima esperienza sopra un capretto colli stessi stessissimi succedimenti; se non che, maggiori ed orribili convulsioni sopravvennero all' offesa del cervello. Più volte mi sono fatto a rifare li miei tentativi sopra diversi cani, e ne ho sempre ricavati i medesimi risultati. Mi è paruto, che non bisognasse di vantaggio, per levare ad una membrana, che altro non è, che una tessitura di vasi tenuti ammassati e raccolti da una cellulosità, ogni pretesa facoltà di sensazione.

Con quattro esperienze, altra lasciando stare, perchè di poco momento, la reputa il Sig. Haller, a cagion di quello, che successe al cane, tanto nello adoperar sulla pia madre, quanto nel profondare un ferro fin dentro la sostanza midollare del cervello, fatte 3. sopra Cani, ed una su d' un Capretto, che pulitamente riuscirono, e per decisive sono portate,

(a) Memor. dell' Accad. di Berlino Tom. IV.

te, mostra questo instancabil Uomo, tale membrana essere del tutto senza senso, tra perchè tutto pare, che cospiri a mostrarla tale, e perchè non è, che una membranuccia fatta da una tessitura di vasetti riuniti, e insieme legati da una cellulosità, la quale è spogliata della facoltà del sentire.

Esperienze sopra il Cervello.

Siccome il senso non risiede, nè nella dura, nè nella pia meninge; e siccome li nervi sono l'organo del senso, come lo farò vedere in appresso; e finalmente, siccome nelli nervi non ci è, che la midolla del cervello coperta dalla pia madre, e qualche volta ancora rivestita della dura, mestieri è, che il senso dipenda dalla parte midollare del cervello non concorrendovi per niun conto la corticale a far parte del nervo. Ma per non lasciare alcuna dubbietà sopra questa importante materia, mi accingo a descrivere l'esperienze che fanno vedere gli sintomi, che sopravvengono nello animale vivente in occasione delle offese della parte midollare del cervello, del cervelletto, e della midolla spinale. Non porrò queste, perchè io abbia veduto qualche cosa, che sappia di nuovo, nè in aria di paradossi; non avendo io in maniera variati i miei sperimenti, per potere notare con precisione la differenza, che vi può essere tra le ferite delle differenti parti del cervello; solo ho pensato ch' elleno basterebbono per provare, che la parte midollare è estremamente sensibile, che alla sua irritazione succedono violente convulsioni, e che per conseguenza li nervi hanno da essa la facoltà di sentire, e quella di produrre per lo mezzo della sua irritazione movimenti convulsivi ne' muscoli.

Può esser vero quello, che dice il celebre Sig. Haller; ma io ho veduto profondar ferri e naturali, e roventati nella sostanza midollare, e l'ho sperimentato io medesimo, senza che l'animale dia segno di sentire. Solo sono entrati in ismanie, ed in convulsioni quando si è giunto a toccare i corpi callosi, i talami de' nervi ottici, oppure i corpi striati, e che si è diretto il ferro verso la spinale midolla, entro la quale penetrato, qualunque sia stato lo animale, è restato compreso da forti tremori, è diventato rigido. Tali sperienze legger si possono nell'ultima dissertazione del chiarissimo Sig. Lagbi, ed in altre ancora.

Sopra il Cervello propriamente detto.

IO cacciai, o sebben mi ricorda, fu Mons. Zinn, che cacciò, e profondo un ferro nella midolla del cervello. Il cane (che era un cane sopra il quale si sperimentava) subito non mostrò grande risentimento; ma non andò guari, che cadde in un sopore; perdette il senso ed il moto, li piedi posteriori furono i primi a farsi

paralitici, indi gli anteriori; restò preso da convulsioni in tutto il corpo: con tutto ciò l'animale respirava, e di tempo in tempo andava gettando gridi, benchè la cute gli fosse divenuta insensibile. Morì la mattina dopo. Aperta che gli ebbi la testa, gli trovai di offeso una parte del cervello, la quale è differentemente fatta nell'uomo e nel cane; ella appartiene egualmente al cervello, ed al cervelletto. Ci era molto sangue sparso sopra il cervello, il cervelletto, e li corpi callosi; nè trovai ne' ventricoli anteriori, nel quarto ventricolo, ed alla base del cranio.

Monf. Zinn. fece alcune sperienze sopra altri cani a questo proposito. Uno d'essi si agitò, e si lagnava vivissimamente nel tempo, che irritavafegli la parte midollare del cervello. Monf. Zinn ciò fatto, levò del tutto dalla testa del cane il cervello, al quale sopravvennero convulsioni senza però, che il moto del cuore, e la respirazione cessassero per tal causa. Avendo un'altra volta scoperta la dura madre, e bene dal cervello separata, Monf. Zinn irritò la sua parte corticale, senza che lo animale desse per così dire alcun segno di senso.

Introdusse una sonda d'argento nel cervello, e quindi nacquero tosto tosto grandissimi sintomi, consistenti in una specie di temulenza, in grida violente, in uno stupore, e finalmente in uno aggrarsi d'attorno, che andò a terminarsi con una caduta. Tutto il corpo fu agitato da convulsioni, le estremità divennero paralitiche, ed il corpo restogli inarcato da un *Tetanos*. Pareva, che i muscoli della parte offesa trovandosi convulsi, quelli della parte opposta, avessero perdute nello stesso tempo le loro forze, e che li primi tirassero a se ciò, che di flessibile ci era nel corpo, il collo cioè, i lombi, ed il petto, non potendo venire lateralmente curvato.

Ho veduto costantemente in una moltitudine di sperimenti la dura madre insensibile, ed il cervello eccitare orribili convulsioni.

Più esperienze confermano l'osservazione d'Hippocrate, che dice, che nelle ferite del cervello li muscoli della parte offesa sono agitati da convulsioni nel mentre, che quelli della parte opposta addivengono paralitici. Ed ecco la cagione, perch'io a questo Teorema pratico, io rapporto la curvatura ad arco de' cani, a' quali siasi ferita la parte midollare del cervello. Da ciò se ne ricava, che la sostanza corticale non sembra molto sensibile, e che le sue ferite non sono seguite da convulsioni. Non ci è nulla di solido in questa dignità del corpo calloso, il quale renda, secondo Monf. de la Peyronie le ferite di questa parte più pericolose di quelle d'ogn'altra parte del cervello.

Con quattordici diligentissime sperienze, 11. in Cani di varia età e genere, 2. in Gatti, ed 1. in un Capretto, parte fatte dal Sig. Haller, parte cavate dai scritti de' suoi scolari, e particolarmente dalla dissertazione di Monf. Zinn sopra la sensitività del Cervello, ci si mostra
essere

essere la nobilissima viscera sensitiva tanto nella cortical sua sostanza, quantunque molto meno della midollare, quanto nella midollare medesima, offesa la quale, gli animali sono entrati quando subito in convulsioni, quando qualche tempo dopo. E' osservabile, dice il Signor Haller, che havvi una parte nel cervello de' Cani, la quale è differentemente fatta da quella, che trovasi in quello degli Uomini: appartien questa ugualmente al cervello, che al cervelletto, ed avvicina le natiche verso la parte esteriore. Tale parte non in altro consiste, che in una sola tuberosità indivisa, in vece delle natiche medesime. E' notabile ancora, trovarsi il cervello de' cani senza glandola pineale. Dice in oltre che Mons. Zinn, e sembra sia stato da esso stesso fatto, profondando un trocar nel cervello di un cane, giunse a penetrar colla sua punta la midollare sostanza, alla cui offesa il cane non parve andar subito risentito: a poco a poco però restò da stupor preso, indi perduto e senso, e solo, gli si fecer primo paralitici i piedi posteriori, indi gli anteriori; ed avvenne convulsioni in ogni parte lo comprendessero, e la cute fosse insensitiva addivenuta, non ostante respirava, viveva, e di tempo in tempo gridava ancora. Lo stesso felice avvenimento, s' ebbe in tre altri cani, a' quali, il teste nominato Mons. Zinn ferì li corpi callosi. In somma tutto il descritto numero delle sperienze che registra, le quali cominciano in Gennajo 1748., e terminano di Marzo 1752., sono dirette a mostrare, che la sostanza corticale è sensitiva di modo, che dice, che leggermente, e lentissimamente da una sonda penetrata, fu capace non solo di far gridare l' animale, ma di trarlo in convulsione (esperimento 148. sopra un capretto, 22. Marzo anno ultimo notato). Che la midollare è sensitivissima; di maniera tale, che offesa che sia, l' animale si fa convulso, fino a restare compreso dal Tetanos; che a maraviglia si distingue la insensività della dura madre, solo che si ponga a confronto il risultato dello sperimento, con quello che passa cimentando sopra il cervello; che finalmente, come si è già notato, si vede nascere nell' offesa del cervello, quello che notò fino a' suoi tempi Hippocrate (quantunque sieno moltissimi i casi, che si trovan per entro le opere degli Autori tanto antichi, quanto moderni, da' quali, si ha, che non tutte le ferite del cervello producano il sintomo con altri seco fatto avvertire dal divino di Coe), che finalmente diffi, vedonsi i muscoli di una parte del corpo entrare in convulsione, mentre gli altri della parte opposta si trovano in uno stato di rallentamento. Su questo caddebbe in acconcio di dire molte altre cose; ma quindi non torna, e non è questo il proposito mio.

Ferite del Cervelletto.

UN cane al quale io forai il cervello, ed il cervelletto con Mons. Zinn, visse 24. ore, non avendo di libero, che la respirazione, ed il moto del cuore, avendo già perduto quello de' suoi muscoli, non che l' uso della sua voce.

Si forò il cervelletto ad un altro cane, e tosto tutte le parti del suo corpo restarono agitate da convulsioni. Non morì neppure, sebbene gli si fosse malmenato, e come per così dire tritato il cervelletto con un ferro all' uopo apprestato; avvegnachè il cuore pulsò ancor dopo questa crudele operazione. Distrusse il cervello ed il cervelletto ad un gatto, il quale non ostante visse quantunque fosse stato così mal concio; anzi apertogli subito il petto, vidi benissimo entro lui il moto del cuore, e del polmone dall' altra parte. Feroce per natura sua, tentò il gatto di mordere ancora. Il moto peristaltico, e quello del cuore durarono lunghissimo tempo.

Sembra da queste esperienze, che le ferite del cervelletto producano presso a poco li medesimi accidenti, che si osservano in quelle del cervello, le quali consistono in convulsioni, che non impediscono la respirazione, e la continuazione del moto del cuore. Non avvi dunque alcun fondamento di attribuire al cervello altre funzioni di quelle, che si devono al cervelletto, ovvero a crederle più necessarie alla conservazione della vita. Si può aggiugnere un' altra riflessione, ed è, che le ferite del cervelletto sono seguite da convulsioni considerabili, come lo sono quelle del cervello. Convien dunque dire, che li nervi de' muscoli voluntarij, de' membri, e della testa, tirino ugualmente la lor midolla dal cervelletto, come ne tirano dal cervello medesimo.

Da sei esperienze, che trovo dal Sig. Haller registrate nella sua memoria, e quasi tutte tratte dalla fonte di quelle di Mons. Zinn, le quali ebbero il loro cominciamento nel Gennajo 1748, e la lor fine in Novembre 1750, cinque in Cani di varia età, e l' ultima in un Gatto, non altro puossi conchiudere come già s' è notato, che gli sintomi, che veder si fanno in conseguenza delle ferite del cervelletto, poco pochissimo differiscono in qualità da quelli del cervello; e che qualunque sia, e per grande che possa essere l' offesa del cerebello, resta all' animale e moto al cuore, e respirazione; che non più all' uno, che all' altro si deono le funzioni, cui è destinata questa nobil viscera tutta insieme considerata per la conservazion della vita; e finalmente, che li nervi distribuentisi alli muscoli destinati ai moti voluntarij, riconoscon pur essi la lor midolla, non solo dal cervello, ma dal cerebello ancora; imperocchè, le convulsioni universali, che comprender si vedono tutti i membri del corpo in conseguenza delle sue ferite, chiarissimamente a dimostrarnelo si fanno. Aggiungasi di più, che Mons. Zinn nel secondo de' suoi sperimenti pag. 29. mostra, che la ferita, che fece sperimentando sul cervelletto allo animale, che avea posto a cemento, lo sbalordì bensì, ma non gli levò punto, nè voce, nè senso. Anzi malgrado una seconda esperienza nella quale tornò a ferirgli il cerebello, indi ad aprirgli con altra ferita il quarto ventricolo; la respirazione, ed il polso non cessaron del tutto. Vedasi la dissertazion sua più difesamente.

Esperienze sopra la Midolla Spinale.

IRitai la spinale midolla ad una ranocchia dopo aver tagliati i nervi d' uno de' suoi piedi; tutti li muscoli del corpo entrarono in convulsione, toltone quelli dell' accennata gamba.

Separai in due parti la spinale midolla d' una ranocchia immediatamente sotto la testa; li piedi anteriori perdettero il moto loro volontario. Quando però io ebbi preparati i nervi de' muscoli di questa estremità, e che gli ebbi irritati, i muscoli restarono benissimo agitati da moti convulsivi. Quanto ai piedi posteriori, in esso loro non si abolì nè moto, nè senso; e ben si conobbe dal sopportare, che faceva lo animale le offese del piede con pochissima pazienza: conservò in essi il moto volontario; ritirò le sue zampe; e saltò come se avesse voluto fuggire.

Io non noterò se non se alla sfuggita, che il cuore degli animali non resta del tutto affetto in conseguenza delle offese della spinale midolla, e che ciò non ostante il suo moto continua, dopo ch' ella è stata levata via, e vaglia il vero.

Tagliai la midolla spinale ad un cane, e l' animale sopravvisse a questa operazione più ore: soffersse però una specie di convulsione assai singolare. Gli suoi piedi anteriori e posteriori restarono depressi, e il dorso gli si alzò, come s' alza in un gatto da colera compreso. Parve che i muscoli lombari, e del collo, curvassero queste parti verso i piedi, e che per una conseguenza meccanica, il dorso formasse una gobba.

Concludo da tutte queste sperienze, che una forza movente parte dalla midolla della spina, come dal cervello, e va pei nervi alli muscoli; che si è troppo fatto fondamento sopra le funeste conseguenze delle ferite della midolla spinale, e che la morte non succede loro così presto, come fin qui si è creduto.

Il moto del cuore, degli intestini, e quello della respirazione continuano per ore intere anche dopo, che questa midolla è stata distrutta.

Per provare il dottissimo Maestro, che avvi una forza movente, che parte non solo dalla spinale midolla, ma dal cervello ancora, e si deriva pei nervi alli muscoli; sette sperienze porta, che dalli II. Agosto 1745. vanno fino alli 22. Marzo 1752., quattro celebrate in Cani di varia età, e genere, e tre in Ranocchie, alcune delle quali è di Mons. Zinn, che si è moltissimo esercitato ed esteso colle sue sperienze sul cervello per illustrar ciò, che il suo gravissimo Maestro avea osservato, e tutte convincenti. Intende pur anco colle medesime di mostrare, che non sì presto le sue ferite sono seguite dalla morte, come si è fin qui creduto, e che loro succede una convulsione avente del singolare. La prima di queste sperienze è in tutto similissima ad altra, che nella dissertazione sua nota Mons. Zimmermann.

Sulla

Sulla sensitività delle Membrane, e della Pleura.

S Coperfi li 28. Marzo 1752. la pleura ad un gatto, tagliando successivamente il gran pettorale, o pettoral maggiore, il minore, e li muscoli intercostali. Non è cosa tanto agevole da farsi in un animale che viva, che soffia, e che s' agiti; e per questo una tale operazione non riesce sempre. Riuscì però in questa, ed irritata la pleura, l' animale non parve essere alla irritazione sensibile: con tutto questo non volli fare uno stabile fondamento su questa speranza. E perciò scoperfi li 29. detto la pleura ad un cane, l' irritai col coltello, la bruciai coll' olio di vitriolo, e sempre senza, che lo animale desse alcun segno di sensitività. Li 30. raschiai la membrana stessa ad un capretto, nè l' animale mostrò di risentirsene. Feci li 10. Aprile nuovi tentativi sopra un altro capretto, i quali riuscirono come i primi a maraviglia. Questo animale è molto più pacifico e docile, che non lo sono i gatti, i cani, e tutti gli altri animali, che ordinariamente non vivono, che di carne. Scoperfi una buona porzione di pleura, e l' irritai, senza che lo animale desse alcun sensibil segno di patimento. Quando però accostai alla sua cute una spugna bagnata, gridò, e si agitò fortemente.

Con cinque sperimenti, li primi due in un Gatto, ed in un Cane, gli altri tre in capretti, solidamente ci viene mostrato essere la pleura membrana insensibile. comechè lo sperimentarvi sopra, ed uscirne senza dubbietà sia difficilissima cosa: ciò non ostante ci si può benissimo riuscire, se si procurerà nello sperimentare di star lontano da' luoghi, dove li nervi intercostali in rami patentissimi su per la medesima si propagano; imperocchè uno di essi, o con caustici, o con ferro irritato che venga, può, sensazione alla pleura affettando, condurre in inganno, chi su d' essa adopera, non che quelli, che ad operar stanno osservando. Dio volesse, che tanti fatti riportati per decisivi, andassero immuni da eccezioni, che forse a quest' ora non ci troveremmo ancora all' oscuro della più parte di quello, il quale dalla comune approvazione non è stato peranco come decisivo ricevuto.

Sul Peritonèo.

D Enudai li 7. Aprile il peritonèo in un cane, e lo nettai dalla parte, che resta coperto de' muscoli dritti. Ciò posto l' irritai collo scalpello, ed il butirro d' antimonio, nè la bestia si scompose, nè died' segni di dolore.

Ho replicate queste sperienze sopra cani, capretti, &c., e l' evenimento è stato perfettamente lo stesso.

Tre sono le sperienze, che trovansi notate per provare la insensibilità

vità del peritonio. Due in Cani, l'altra in un Capretto, le quali sono state perfettissimamente fatte, e con tutta schiezzatura, e sincerità portate. E d'avvertire però, che non vi è cosa la più gelosa dello sperimentar sopra membrane, mentre facilissimamente, o per inavvertenza, o per qualche altro equivoco si può attribuire a queste un successo del tutto opposto alla aspettazion favorevole di quelli, i quali con ogni cautela cercando, sembra abbiano spassionatamente, e con costanza trovato il puro vero. Per operar dunque sicuri sul peritonio, mestieri è, non nelle sue parti posteriori, nelle quali si potrebbero incontrare propagazioni de' nervi lombari; ma nelle anteriori, procurando per quanto sia possibile di non slontanarsi dalla linea bianca, perchè così si adopererà sicuri, ed il ritrovato non sarà equivoco.

Sulla sensitività delle Viscere.

HO irritati, tagliuzzati, bruciati i polmoni, il fegato, li reni, e insieme molte glandole, e giammai lo animale su cui sperimentavasi, ha mostrato segno di sentire. Cercai li 24. Dicembre in un cane il plesso de' nervi, che accompagnano l'arteria celiaca, e la vena porta, ed irritai. Irritati l'animale parve sentisse del dolore, ma non si vide alcun moto nè nel fegato, nè nello stomaco. Era natural cosa, che i nervi avessero senso, come parti, che ne sono l'organo; ma non possono produrre moto, che ne' soli muscoli come si vede. Trinciai li 10. Gennajo 1751. il fegato, i reni, la milza di più forci, ed anche di un gatto, e questi animali non furono sensibili a queste molestie offese. Non si dee dunque restar maravigliato, se nelle ulcere del polmone non si sente dolore, siccome in quelle del fegato, e de' reni.

Ho veduto il polmone, ho veduto i reni trapassati da colpi di spada suppurare abbondantemente, senza che li feriti si lagnassero d'alcun dolore, e gli uni e gli altri guarire agevolmente per lo mezzo della sola, e semplice dieta.

Il moltissimo numero delle sperienze, per altro uso dal gravissimo Sig. Haller, fatte sulle parti delle quali si è fin qui trattato; ha comodo prestato, non che strada aperta, per non lasciar niente indietro, che desiderabil fosse, di cercar anco sulle viscere contenute tanto nel petto, quanto nell'addomine, onde venir in chiaro e rilevar potesse sotto quale aspetto s'hanno queste a considerare, se nell'ordine delle sensitive, o in quello delle parti, che non hanno senso. Tra tanti, quattro soli sperimenti trovo registrati, aventi il loro principio li 14. Dicembre 1750., e il termin loro nel Giugno 1751. Due in Cani, e queste indirite a cercare la irritabilità de' nervi; le altre, in due diversi animali, in un Sorcio cioè, ed in un Gatto. Questi ultimi sperimenti fanno chiaro vedere, che si possono pungere, bruciare, tagliare, ed altro simil fare sulle viscere del polmone, fegato, milza, reni &c., senza patimento

dello animale, vo dire senza, che mostrin senso. Di fatto risette benissimo Monsf. Zimmermann quando dice, che se le accennate viscere avessero senso, le ulcerei del polmone, quelle del fegato, della milza, de' reni &c., non solo porterebbono incomodi gravissimi; ma spasimo il più delle volte, e dietro ad esso la morte. E chi non sa, che i Tabidi, portano lungamente ulcerei nel polmone, e che si sono trovati cadaveri, ne quali, i reni si vedeano quasi distrutti! Molti bellissimi fatti si leggono in varj Autori su questo particolare.

Sulla Sensazione de' Nervi.

IL secondo giorno di Settembre 1750., irritai in un gatto il nervo, che scende ed accompagna li muscoli flessori della tibia, e lo animale gridò orribilmente, e divenne per lo dolore furioso. Ho spesso volte rifatta questa speriienza in questi animali, la vita de' quali è durevolissima, e sempre collo stesso succedimento. Li 6. Aprile 1751. legai il nervo brachiale ad un cane, il quale è corrispondente al mediano nell' Uomo, e che è facilissimo da scoprirsi: (mi servo in tutte le legature d' un' ago di latta curvo, molto pesante, ed ottuso, per forare le tonache cellulari senza lesione nè de' vasi, nè de' nervi.) L' animale nel mentre, ch' io stringeva il laccio, mostrò segni del più intenso, e vivo dolore. Sotto la legatura divenne affatto insensibile, il tronco medesimo del nervo irritato, non cagionava più niuna pena al cane nel tempo stesso, che altri nervi i quali non avea legati, e che io irritava producevano violente convulsioni nei loro muscoli. Il nervo dell' ottavo pari è situato, ed ha il suo corso a lato, e per di dietro della carotide, nel coniglio. Li 30. Ottobre 1752. legai questo nervo, e nel mentre, che stringeva la legatura, quest' animale, che non si lamentò mai, e che mai non aveami fatta udir la sua voce nelle mie numerose speriienze sulla respirazione, gridò in tale maniera, che avrebbe mosso a pietà un Uomo, se la circostanza di cercare, per rinvenire alla cognizion del puro vero, non fosse stato il solo motivo che lo avesse incoraggiato ne' suoi speriementi. Sopravvennero a questo povero animale grandi accidenti, continui sforzi, ed incitamenti al vomito, una respirazione difficile, ed un perfetto corrompimento di quello, che trovavasi avere nello stomaco. L' animale morì la notte dopo l' operazione, ed io ritrovai nel suo ventricolo materie verdi, ma del tutto corrotte. La morte sollecita di questo coniglio fu sicuramente un effetto della legatura dello accennato nervo; perchè la ferita non avea che aperti gl' integumenti con pochissima perdita di sangue. Li 14. Novembre compresi nella legatura tutto il fardello de' nervi di un gatto, toltone il mediano di già separato, come nelle esperienze precedenti, e l' animale gettò urli orribili durante l' operazione. Dopo la legatura l' animale perdette il moto della gamba, e morì il quinto giorno. Il filo della

la legatura aveane troncato il nervo, intorno al quale si fece una suppurazione di marcia, il cui odore era di un fetore quasi insopportabile. Legai in un cane li 31. Dicembre il nervo dell' ottavo pari; e l' animale perdette per una parte la metà della sua voce. Lo legai dall' altra, e divenne muto, come accadde nelle esperienze di Galeno fatte per trovarne la verità sul nervo recorrente. Ho replicati moltissime volte questi sperimenti ancor sopra cani, e sempre collo stesso succedimento.

Ho fatta l' esperienza seguente sopra un gran numero di ranocchie nella maniera, che descrivo. Prendesene una, e se le trae dal petto il cuore; li nervi non minorano di senso, e li muscoli entrano in convulsione quando irritasi il nervo.

Questi sperimenti non vestono novità alcuna, nè sono contrarj alli già ricevuti principj. Eglino concorrono a far vedere, che legando un nervo s' impediscono le sensazioni delle parti, alle quali vanno a distribuirsi i ramuscelli nervosi da esso-lui propagati, nè più pel loro mezzo possono essere portate all' anima, nè rappresentarvisi, e che per conseguenza l' anima non sente nella medesima parte. Provano inoltre, che questa stessa legatura interrompe, anzi toglie la causa, che nasce dalla volontà, e che va pei nervi alli muscoli; nè più resta ad essi, che la loro contrazion naturale. Non è forse così a portata di tutti il conoscere le conseguenze funeste delle legature de' nervi. Nel numero di dieci esperienze, non ve n' ha che una sola, nella quale lo animale è andato scuro dai seguiti funesti della legatura del nervo sì comune nelle amputazioni, nelle quali evvi metodo costumato di passare aghi curvi a traverso le carni per legare l' arteria col nervo, che l' accompagna. Quest' operazione fatta sopra una parte tanto sensibile, quanto è il nervo, non mi ha mai e poi mai piaciuta; e n' ho perciò avuto piacere della nuova scoperta dell' agarico sostituito alla legatura de' tronchi arteriosi. A questa avrei potuto aggiungere l' altre esperienze fatte, sopra l' ottavo paio, le quali chiaramente dimostrano, che la respirazione, la digestione, e la voce dipendono in gran parte da questo nervo.

Per dar ordine alle esperienze, che contengono nella nona sezione dell' ultima edizione di Lofanna, comincia il Sig. Hallero da quelle fatte sulla sensazione de' nervi; poi passa all' altre, che mostrano, quale moto venga eccitato ne' muscoli dalla irritazione de' nervi; indi parla de' muscoli medesimi; e finalmente pone fine alla medesima co' sperimenti fatti sul nervo frenico in particolare. Venti sperimenti s' io non erro registra, per provare la proposizion sua prima. 2. in Gatti, 13. in Cani, 3. in Conigli, e 2. in Ranocchie. Parecchie di queste esperienze non trovo notate nel compendio tradotto, forse a titolo di brevità, o perchè il risultato loro niente più prova di quello dell' altre descritte; o perchè i fenomeni d' ogn' una di loro presi insieme, poco pochissimo differis-

con tra loro. Non di meno fiammi permesso alcune cose riferire di esse, le quali per mio avviso sono di considerazioni degne. Dice nello sperimento 176. fatto sopra un Cane, aver egli fatto ingbiottire per forza all' animale non so quale porzion d' oppio, per vedere quale impressione avrebbe fatta questo potentissimo veleno sulla forza irritabile. Di fatto ingbiottito che lo ebbe, trovò da lì a non molto l' irritabilità delle parti essersi di maniera indebolita, che potè irritare il nervo mediano, senza che li muscoli a' quali propagasi, entrassero in convulsione. Il nervo frenico però non avea perduta la sua facoltà di comunicar moto al diaframma; imperciocchè irritato, fecelo palpitare, e tremare. Nello sperimento 177. fa vedere, che legato il nervo mediano ad un Cane, restarono gli arti superiori privi di senso, e di moto volontario. Ma questo, come pur esso confessa, non è cosa nuova. Nel 178., legò pure il detto nervo, e il Cane, che tale era lo animale su cui sperimentava, oltre i dolori terribili che provò in tempo della legatura, i diti interni della zampa aventi relazione nell' Uomo al pollice, e all' altre dita vicine, alle quali si propagano diramazioni nervose derivantisi dal mediano suddetto, perdettero il senso. Di più scrive, che li muscoli, la pelle, e gli altri nervi di questa parte si poterono irritare in ogni maniera sotto la legatura, senza che la bestia se n' accorgesse; nella quale, comechè i muscoli flessori si trovassero per ciò senza moto, conservarono non per tanto la loro irritabilità. Al numero 180. porta un altro sperimento pochissimo diverso dal primo, in cui solo si ba, che non si celermente dopo la legatura, che riuscì pur essa dolorosa allo animale, s' ebbe il perdimento del senso, e del moto; questo fatto è uniformissimo al primo, che trovassi nella dissertazione di Mons. Brunn, quando non s' ba a dire essere lo stesso, la quale ha per titolo Experimenta circa ligaturas nervorum in variis animalibus instituta. Nel cimento sotto il numero 181. avuto sopra un Cane, fa vedere, che l' animale nella legatura del nervo dell' ottava coppia dall' una parte, che non è così agevole da farsi, non parve sentire la perdita fatta del moto, e del senso. Legando però l' altro dall' altra, spirò la povera bestia in mezzo ad una forte convulsione. Confessa il Sig. Haller, che la speranza 184. non ci riuscì per aver cercato in troppa vicinanza delle vertebre lo stesso nervo. In quella però segnata 185. scrive, che il Cane su cui sperimentava avendo perduto in uno anteriore sperimento da una parte il senso, e il moto a cagione della legatura del nervo di cui si parla; legatolo poscia dall' altro, trappassò il dì dopo, con una breve, e difficil respirazione; apertolo trovossi in un totale corrompimento la materia contenuta nel ventricolo. Soggiugne ancora, che apparentemente avea la voce perduta dopo la seconda legatura, attribuendo questo fenomeno al nervo recorrente, al quale non restò più niuna azione a cagione delle strozzature del tronco da cui si deriva. Dietro a questa speranza trovassene altra, la quale confessa doverli a Mons. Brunn diretta a mostrare, che non senza lamenti, e smanie fu parimenti legato in un Coniglio entrambi i tronchi della ottava coppia; perfezionata la cui legatura, non solo più

non mangiò, ma perdute tutte le sue forze morì il terzo dì dopo tale tentativo. Aperto, trovossi in esso pure la materia contenuta nello stomaco passata a corrompimento. Oltre le fin qui riferite sperienze, molt' altre ne porta fatte sopra il nervo sciatico, in ogn' una delle quali si ba, che nel tempo della legatura, smaniavansi le povere bestie, e gridavano, e che non restava più loro nelle estremità posteriori moto, e senso, di maniera tale, che se le strascinavan dietro, e che non molti giorni dopo perivano. Un solo caso però accenna, nel quale il Cane, cui avea legato il detto nervo, non solo non perì; ma se ne prese la fuga. In tutti gli esperimenti però, fatti su i nervi, se costante era la perdita del moto, e del senso, costante eziandio conservavasi nelle muscolari parti l'irritabilità, sebbene alcuna fiata infiaccevasi. Non minor costanza s' ebbe ancora nel trovare quando più, quando meno di suppurazione attorno alle legature de' nervi. Potrebbe si dire questa aggiunta niente più di peso accrescere al solo posto da Mons. Vandermonde, quasi che quello, che ha egli scritto non avesse bastevol forza da esporre al vivo tutto ciò, che intende il Sig. Haller co' suoi numerosi esperimenti. Si dica. Non si potrà negare però, che se il dottissimo Hallero avesse creduto, che pochi fatti in iscritto bastassero, non avrebbe fatta sua cura di farci pervenire tutta la serie distesa; nè si sarebbe data la pena con tanta delicatezza di distenderla. Per mio avviso la molteplicità de' fatti, e tutti classici, e di momento, provano sempre più, che pochi, quantunque di niuna eccezione.

*Sopra la forza movente che li muscoli acquistano
dai nervi.*

HO irritati col ferro diversi nervi nelle ranocchie, ne' topi, forci, corvi, cani, e gatti, ed ho costantemente osservato, che li muscoli, ne' quali vanno a distribuirsi entrano in convulsione. Scopersi li 2. Dicembre 1751. il nervo mediano in un cane; strisciai sotto questo nervo una regola ben divisa, e di una scala fornita, li cui gradi erano piccioli: irritai dopo il nervo, e li muscoli si contrassero. Osservai diligentissimamente e con ogni più possibile attenzione il nervo per distinguere se avesse fatto qualche movimento, e se per conseguenza fosse passato da un grado all' altro della regola, ciò che dovea succedere infallibilmente per poco, che avesse oscillato; ma niente successe, nè mostrò altro moto, che quello, che seguì meccanicamente dal contatto del ferro, col quale s' irritò il nervo.

Dopo questo esperimento toccai il nervo collo spirito di nitro fumante; e non solo non s' ebbe niun moto nel nervo, ma da questo veleno restò il detto nervo distrutto.

Questa sperienza e molt' altre assieme, sembrano bastevoli per provare. Primo, che la cagione de' violenti moti de' muscoli vien loro

loro da' nervi, poichè l' irritazione di un qualche nervo produce nel muscolo al quale va a distribuirsi moti convulsivi. Secondo, questa causa del moto volontario sembra effettivamente dipendere dal senso, e l' oppio sopprime questa facoltà nei nervi per lo cui mezzo eglino eccitano moto ne' muscoli. Mons. Oeder, esperimento 176., ha assai bene osservato, che l' irritazione del nervo non produce giammai movimento, se non se, nel muscolo al quale si diffonde; e questo è quello, il quale m' hanno per lo meno insegnato tutte le mie esperienze, che che possa essere la dimostrazione contraria, che cavasi da' moti simpatici nelle malattie. Terzo, per eccitare moto ne' muscoli dall' irritazione de' nervi, non è necessario, che questo nervo abbia conservato la sua continuità col cervello, nè colla midolla spinale; perchè l' irritazione di un nervo separato del tutto dalla midolla spinale, o dal cervello, produce le medesime contrazioni nel muscolo, che quello cagiona, il quale mantenga la sua continuazione, ed abbia una perfetta relazione colle sue parti primarie. Quarto, il nervo, che produce la forza contrattiva in un muscolo, non si muove per alcun conto esso-stesso, e non ha alcuna oscillazione visibile o proporzionata alli movimenti, ch' egli produce. Questo sperimento è di somma importanza per la Fisiologia. Egli distrugge tutto quello, che fin qui si è detto intorno al tremore de' nervi analogo a quello delle corde elastiche, e su l' elaterio de' nervi. Quinto, ne viene ancora dalla medesima esperienza, che la fibra nervosa, non potrebbe per se medesima produrre moto, senza la concorrenza e l' ajuto delle fibre muscolari. E' dunque mestieri levare dalla Fisiologia quello, che dorte genti, ed io dopo loro, hanno scritto sopra li lacci nervosi, che contornano le arterie, e le vene, e li vasi esaltanti, ed assorbenti. L' azione del nervo, non è di moverli per far muovere il muscolo come una forza meccanica, la quale ne mette un' altra in moto: ella consiste a far pervenire alli muscoli con una maniera tutta secreta ed innaccessibile a nostri sensi, quella forza, che li mette in contrazione, dipenda questa forza da un qualche fluido, o da qualche altra ascosa cosa, la quale, non è per anco immaginata. Potrebbe si dire obbiettando, che questo tremore della sostanza nervosa fosse invisibile. Nel qual caso, non bisogna compararlo a quello delle corde elastiche, delle quali si vedono e contano per così dire le vibrazioni, e pare che non possa aspettarsi, che una oscillazione invisibile abbia la forza di chiudere l' arteria fucclaveare, o l' aorta stessa, con tale forza, che vaglia a cangiar moto al sangue.

Quantunque abbia paruto al saggio Autor francese non necessaria la formal descrizione degli sperimenti, che registra il Sig. Hüller, per mostrare come da esso-lui si nota, che non puossi irritar nervo, senza che il muscolo, nel quale va a diramarsi, ed in esso a perdersi entri in moto; niente di meno per continuazione del mio proposito, ho giudicato bene

bene lo stender quindi il contenuto de' medesimi, affine di giovar meglio a quelli, che non avessero il libro, nel quale si contengono. Sedici sperienze si hanno in questa sezione, nella prima delle quali mostra aver egli il Sig. Haller in una Ranocchia irritato il nervo distribuentisi ad uno degli arti posteriori, e che non solo il muscolo a cui propagavasi patì convulsione, ma che tutta la gamba entrò in iscuotimenti convulsivi. In oltre, che avendo del tutto troncato il plesso nervoso, che si dirama alla medesima, li muscoli perdettero, un dopo l'altro, tutta la forza regnante loro dalla volontà. Che messo in isparvento lo animale sarebbe fuggito, se la parte avesse obbedito al voler suo: che irritata la spinale midolla, s'ebbero per tutto il corpo convulsioni bensì: ma la gamba nella quale più non agiva il nervo troncato, più non si mosse. La 2.^a e 3.^a veder fanno, aver egli irritato il nervo mediano in una estremità anteriore di un Cane, e il nervo crurale in un Topo con contrazioni ne' muscoli, palpitazioni, tremori, e convulsioni delle parti. In molti altri Topi succedette la medesima cosa, un tale sperimento sulle descritte parti facendo. Nella 4.^a dice avere in un Corvo scoperto ed irritato il nervo, che propagasi all'ale, ed a tale irritamento, essersi desse fatte convulse. Nella 5.^a, c' insegna, che all'irritamento di un grosso nervo diramantesi alli muscoli addominali, sempre restavano compresi da una violenta contrazion convulsiva. Nella 6.^a, irritato di nuovo ad un Cane il nervo mediano, fa rilevar, che le parti muscolari della zampa non solo palpitavano, ma contraevansi vivissimamente. Nella 7.^a, a tre Ranocchie una dietro l'altra, tagliò il plesso de' nervi d'una posterior zampa, che avea separati dalla origin loro, e questi ad un per uno irritati, nacquero ne' muscoli le stesse siffime convulsioni, che senz'altro sarebbero nate, se li rami nervosi stimolati, fossero stati illesi. Tagliò pur anco in due parti la spinale midolla, irritò indi il plesso nervoso, che era stato conservato intero, il quale diramavasi all'altra gamba, e all'animale ciò non ostante fu sensibile un tale irritamento fatto al nervo, che non appiccavasi più, se non se, alla parte inferiore della midolla del dorso di maniera, che li muscoli si contrassero, la zampa piegossi, e tentò l'animale di sottrarsi colla stessa da ulteriore offesa. Nella 8.^a, troncò un'altra fiata la spinale midolla ad un'altra Ranocchia, e non di meno le zampe posteriori non parvero insensitive addivenire; li muscoli contraevansi all'irritamento del nervo, e cercava ogni volta la tormentata bestia di fuggire come se nulla fosse stato sulla spinale midolla adoperato. Nella 9.^a, irritò parimente in un simile animale il nervo di un muscolo, ed il muscolo si pose in contrazione. Approssimò la lente al detto nervo isolato, lo guardò attentissimamente darvicino co' suoi occhi miopi il Sig. Haller che confessò attivissimi a scoprire ogni cosa minuta, eppure non potè vedere alcuna oscillazion farsi dal nervo, capace a produrre tali violente contrazioni. Nella 10.^a si ba, che avendo in tre altre Ranocchie irritato un nervo entrarono in convulsioni bensì li muscoli, a' quali le braccia di tali nervi si distribuiscono; ma desso nervo restò perfettamente

inma-

immobile. Nella 11., si trova aver toccato collo spirito di nitro fumante, un nervo in una delle predette Rane, senza che il muscolo si movesse; si muove bensì e con costanza semprecchè lo stimolo venga dalla punta di un qualche ferro, quantunque il tronco del nervo irritato resti invariabilmente immobile. Tutt' altro, che il Sig. Haller ha di fatto sopra questo, trovasi già negli altri sperimenti posti distesamente dal chiaro Sig. Vandermonde, il perchè null' altro s' aggiunge.

Sopra il Nervo Frenico in particolare.

HO irritato in più animali questo nervo, ed il diaframma si è contratto. Ho aspettato una volta, che questo duplicato muscolo cessi da suoi moti, e che lo animale fosse in una totale prostruzione, ed ho in questo stato irritato di nuovo il detto nervo, e tosto, ho veduto moto nel diaframma. Irritai li 30. Novembre 1750. il nervo frenico di un cane, e il diaframma subito si contrasse. Io lo compressi, e lo irritai sopra il luogo compresso; il diaframma tanto e tanto si mosse. Lo irritai sotto la compressione; e il muscolo tornò da capo a muoversi. Non l' irritai più, e il diaframma più non si mosse. Lo strinsi tra il pollice, e l' indice, e feci strisciare i diti in alto; il diaframma si mise in moto; feci loro così strisciando discendere, e il detto muscolo non si scosse di più. Tagliai li 6. Aprile 1751. il nervo diaframmatico ad un cane, lo irritai dopo ch' ebbe perduta la sua continuità colle sue radici, il diaframma non sen risentì men vivamente, e si scosse collo stesso vigore, che avrebbe fatto, se il nervo fosse stato da ogni offesa illeso.

Queste sperienze in primo luogo confermano quello, che ho testè detto; imperocchè o si comprima, o si legghi, o si tagli il nervo d' un muscolo, o gli si tolga tutto il commercio, che avea prima col cervello, indi s' irri questo, che, purch' egli sia ancor fresco, ed umido, queste irritazioni produrranno nel muscolo al quale va a derivarsi questo nervo, gli stessi movimenti, che avrebbe prodotti, se per anco restasse intatta la sua primiera continuità col cervello. Questa teorema essendo stato provato per lo mezzo de' nervi, che obbediscono alla volontà, lo è ancor quinci pei vitali. Secondo, si è preteso aver fatte sperienze sopra i nervi frenici con qualche abuso, per cavar prove in favore de' spiriti animali. E' assolutamente contrario alla esperienza, che un nervo stretto tra le dita produca del moto, quando si fanno risalire dette dita; è ancor falso, che vi produca una maggior disposizione al moto, che vi eccita l' irritazione.

Diciassette sperienze per lo suo assunto comprovare trovo registrate dal Sig. Haller nella sua memoria esposta in forma di diario. Sedici fatte sopra Cani di varia età e specie, ed una in un Topo, delle quali alcune

alcune si notano, altre nò. Sicchè non crederò venir biasimato, se, per continuazione di quanto fin da principio mi proposi, aggiungerò, che il chiarissimo Uomo dice nella 3, che Mons. Zinn compresse il nervo frenico, e così compresso irritollo sovra la compressione, e il diaframma prontamente si contrasse; che all' opposto non oscillò, quando, legato, portò lo stimolo sovra essa legatura. Nella 4, che compresso il nervo diaframmatico nel petto, che avea aperto ad un Cane, il diaframma tanto e tanto continuò a vibrare. Nella 5, che si ebbe moto nel muscolo anzi detto alla irritazion del nervo, ed altri succedimenti, che altri fenomeni della respirazione spettano anzichè nò. Aspetto nella 6, che il diaframma avesse del tutto terminate le sue oscillazioni, e che lo animale fosse di forze lasso addivenuto, ed allora irritò di nuovo il nervo, e non ostante il muscolo riprese il suo moto. Non riuscì la 7 per la celer morte del Cane, cui fu con troppa violenza aperto il petto a titolo di rendere più comodo, ed agevole il modo di adoperare sul nervo. L' 8 ebbe la stessa sorte, se non che, vennegli fatto di far entrare in convulsione il diaframma irritando il suo nervo. Nella 9 compresse il nervo frenico da una parte, e non ostante il diaframma si mosse, e videlo chiarissimamente scendere da entrambi i lati, e dalla parte medesima nella quale avea compresso il nervo, senza che per conseguenza un tale muscolo fosse a paralisia fatto soggetto: in tale stato lo irritò, e il diaframma restò compreso da moti convulsivi. La 10 veder fa quasi lo stesso. Troncò nella 11 il nervo frenico, e lo separò in ogni suo dove dalla origin sua, come aveano fatto ezianco li MM. Oeder, e Zimmermann, e così separato irritollo, ed il muscolo non ostante si contrasse. La 12 sperienza ebbe, al parlar suo, più felice evenimento, imperciocchè compresso il nervo diaframmatico nel petto, ed irritato sotto il luogo compresso, il diaframma restò contratto: strisciò i suoi diti di basso in alto lungo il nervo, ugualmente strignendolo, ma non si vide eccitato alcun moto nel muscolo; strisciòli d' alto in basso strignendo similmente il nervo, e restò pure immobile come prima il diaframma: strinse il nervo tra i suoi diti, e sotto la compressione irritollo, e la parte riprese l' azion sua; circostanza, che gli fe benissimo osservare falsissimo essere, che il diaframma contraggasi quando scendesi co' diti il nervo ugualmente strignendo. Nella 13 volle di nuovo comprimere il nervo, ed irritarlo sotto la compressione, ed il muscolo tornò a contrarsi: irritollo sopra il luogo compresso, e il diaframma non diè alcun segno di moto, cosa veduta pure da Mons. Oeder; ascender fece pur anco i suoi diti pollice, e indice strignendo sempre tra loro ugualmente il nervo, e nel ciò fare irritò il nervo, e il muscolo restò detto si mise in azione; fece lo stesso tentativo, ma d' alto in basso, irritando sotto i suoi diti il nervo, e seguì bensì la stessa cosa nel muscolo, ma più languidamente; tendendo il nervo in tempo che irritavalo, parvegli che il moto, che ne risultò fosse più sciolto, ed agile di quello, che accadere si vede, quando il nervo trovasi essere in uno stato di rallentamento. Osservò in oltre, che il moto delle dita, che stringono il nervo non producono alcun comovi-

mento nel diaframma, qualunque siasi la direzione, che loro si dia, e sempre la medesima cosa succede o facciansi ascendere, o discendere. La 14 sperimenta comprende aver desso irritato il nervo frenico, ed avere prontamente il muscolo oscillato; averlo compresso, e non essersi mosso; averlo irritato sotto la compressione, ed esser tornato in azione, non averlo toccato, ed il diaframma come s'è notato da Mons. Vandermonde non solo non aver dato segno alcuno di moto, ma non essersi commosso, su, e giù tra le dita strignendolo. Nella 15 mostra, che irritato il nervo diaframmatico sotto il luogo compresso, il movimento, che ne risultò dalla irritazione fattagli fu sì grande, che maggior non poteva essere, ne più vivo avrebbero prodotto altra, che si fosse fatta in un nervo in ogni sua parte libero; che rallentato il nervo, e dalla sua cellulosità fiaccato, non altro produsse, che moti convulsivi nel diaframma alla semplice irritazione sua. Finalmente vuolsi aggiugnere, che le apparenti contraddizioni, che rinvengonsi nelle sperienze terza, e terza decima sono facilissime da conciliarsi. E vaglia il vero: la compressione che rilevavasi nello sperimento terzo sembra fosse più mite, e quella del decimo terzo più forte; e questo vie più si conferma se si vuole por mente al succedimento della legatura del nervo nel po' anzi accennato terzo sperimento relativamente al decimo terzo, la quale siccome altro finalmente non è che una compressione estremamente forte, quindi è, che per essa venne in quest' ultimo interdetto l'effetto che sarebbesi potuto aspettare dallo irritamento più alto portato. Ne strana e sorprendente cosa è, che il diaframma non perdesse assolutamente il moto nella speranza nona, conciosiacosacchè non solo restava il nervo frenico dall' altra parte, ma altri pure ne rimanevano derivantisi dalla spina del dorso, ed altri che il gran plesso semilunare dell' addomine fornisce all' arteria frenica.

*Fenomeni sopra la forza di contrazione, che è essenziale
alli Muscoli.*

HO veduto in un cane il cremastere, e il muscolo retto dell' addomine palpitare, e le loro carni approssimarsi alternativamente nel mezzo de' muscoli, ed allontanarsene per distendersi. Questi movimenti continuavano lungo tempo dopo la morte apparente, o la perfetta insensibilità dell' animale, ed i muscoli non s'impallidivano in tempo della contrazione. Ho osservato in un altro cane il modo, col quale le carni di un muscolo abbandonano le loro funzioni. Elleno divengono più corte della metà, ma senza perdere del loro colore rosso; le fibre si avvicinano nel mezzo, e a poco a poco nel rallentamento del muscolo, elleno se n' allontanano. Sembrami, che le sue fibre si increppino, e formino dell' onde trasversali. Il tendine non fa che obbedire al moto delle carni, senza contraersi punto in se stesso. Un solo fascetto di fibre può adoperare a parte nel tempo, che il rimanente del muscolo si riposa. Ho veduto tutto ciò per lungo tempo, e con ogni esattezza.

Ho

Ho osservato un capretto, che sembrava morto; eppure quando irritai le carni de' muscoli gastrocnemj entrarono eglino in azione, e l'estremità delle sue fibre si accostò nel mezzo. Ho rilevato ancora in un gatto, che più muscoli, ed il diaframma hanno conservato lungo tempo dopo la morte la loro forza contrattiva, e le loro palpitazioni. Ho scoperto uno de' grossi muscoli della coscia in due rannocchie, ho irritato il suo nervo, l'ho fatto entrare in moto; e nel tempo, che le sue carni si contraevano, io considerava armato di un'ottima lente il muscolo, mettendo tutta l'attenzione mia nello esame de' vasi, che si diramano tra li fascetti fibrosi. Io li vidi ugualmente riempersi di sangue, e nella contrazione del muscolo, e nello stato del suo rallentamento, nè trovai che perdessero la più menoma porzion del suo rosso colore. Io ripresi la cagna alla quale era per me stato legato il nervo mediano; avea dessa perduto il moto volontario, ed il senso di questa gamba; la cute, i muscoli, ed il tronco del nervo legato, erano insensibili sotto la legatura: quando però irritai questi muscoli privi di senso, e che non aveano più il loro natural moto volontario, eglino non lasciarono di contraersi. Dunque il moto de' muscoli non dipende dal senso. Avea legato il nervo sciatico ad un cane; ed avendo con ciò renduti insensibili la pelle, ed i muscoli di questa gamba, li scopersi, ed irritai. Eglino si contrassero evidentemente, e palparono senza l'assistenza de' nervi. Avea di nuovo legato il nervo sciatico ad un cane; la qual legatura era stata cagione, che li muscoli inferiori ad essa, aveano perduto di senso: in questo stato volli irritarli, e le loro carni palparono, e tremarono.

Queste esperienze provano. *Primo*, che la natura irritabile delle parti del Corpo Umano, è differente molto dalla sensitiva: questa perisce quando si lega, o si taglia totalmente il nervo, o si recide una estremità; ma l'irritabilità resta a queste parti addivenute insensibili. *Secondo*, che ci sono tre forze contrattive nelli muscoli: la prima che è la più debole, dura eziandio dopo la morte, e più giorni dopo, e finchè la fibra ha conservata la sua struttura; il perchè se si taglia un muscolo, le sue fibre si contraggono verso le parti solide alle quali è egli appiccato, e verso il suo centro carnosio, lasciando tra loro un notabil vano. E' questa una forza naturale della fibra animale, che non dipende, nè dal senso, nè dall'irritabilità, e che non ha niente di comune colla vita: la seconda forza de' muscoli è l'irritabilità, la quale è loro naturale, e dura quanto fa la vita, ed anco dopo, e fin tanto che li muscoli sieno addivenuti freddi negli animali a sangue caldo. Questa è quella sola, che anima li muscoli negli animali, che sono mancanti di nervi. Vedesi ella agire da se medesima ne' muscoli scoperti, e perdendosi, agevolmente richiamasi colla irritazione. Ella produce uno stiramento alternativo alle loro fibre, che si accostano verso il centro del muscolo, e che ritornano alla loro naturale distensione. Questa irritabilità.

bilità produce il moto senza l'ajuto de' nervi; ella sussiste nel cuore, negli intestini, nelle glandole separate dal corpo. Ella resta nel muscolo il cui nervo siasi troncato, o reso incapace di agire con forte legatura; ella persiste e dura nelle parti, alle quali siasi tolto il senso: la terza forza de' muscoli, è quella, che parte dai nervi; ella è eccitata qualche volta da un dolore, o da una qualunque causa, che irrita il nervo, e più naturalmente dalla volontà dell'anima. E' quest' ultima molto più forte dell' altre due; produce non di meno pressochè lo stesso effetto, di ritirare le carni verso il muscolo. *Terzo*, questi sperimenti sostenuti da un buon numero d' altri ancora, provano assolutamente, che il muscolo non cangia punto di colore, quando adopera, e non resta vuoto di sangue nel tempo della sua contrazione. *Quarto*, la diminuzione, e la lunghezza del muscolo, che si contrae, è molto più grande di quella si è trovata dalla ipotesi delle vescichette formate dalla dilatazion delle fibre. Io l' ho veduta nel diaframma, e sopra tutto ne' muscoli intercostali, li termini de' quali sono fissi, ridurre questi muscoli al meno di una metà della loro lunghezza. Alcune sperienze analoghe mi hanno fatto vedere la medesima cosa ne' muscoli de' labbri, nello sfintere dell' ano, nello stomaco, negli intestini. *Quinto*, parecchi sperimenti stabiliscono la costanza, e l' irritabilità del diaframma, che pare essere superiore a quella degli altri muscoli. Bramerei per ciò, che questa esperienza si avverasse più spesso.

Per mostrare il Signor Haller quanta parte abbia essenzialmente nel moto muscolare la forza di contrazione 25. fatti distesamente rapporto, in cadauno de' quali rilevasi quanto è mestieri per chiaramente vederlo. Tali fatti vedonsi celebrati 15 in Cani di vario genere, ed età, 4 in Gatti, 1 in un Capretto, 1 in una Pecora, 1 in un Corvo, e 3 in Ranocchie. Lo sperimento primo fatto in un Cane li 30 Marzo 1746. è già descritto, ned altro nel secondo si rileva adoperato sovra un muscolo diritto dell' addomine in un altro Cane, se non se, che allo stimolo applicato alle carni dello stesso, le carni medesime si approssimavano nel suo mezzo, ed alternativamente allontanarvensene. Nel 3 mostra aver egli irritato il diaframma in due Cagne nella sua parte carnosà, non avendo toccato il nervo frenico, che avea prima troncato, e che da questa irritazione se n' era avuto il medesimo effetto, non che il moto famigliare alle carni di un tal muscolo. Sul terminare della descrizione del 4, aggiugne che un solo pacchetto di fibre puote a parte moverse nel tempo, che il restante del muscolo riposa, ed asserisce avere questo fenomeno più fiate, e con ogni esattezza osservato. Fa rilevare nel 5, che in un Gatto il diaframma restò irritabile, nel mentre che gli altri muscoli più non si movevano per loro medesimi, e ch' egli non eran punto più soggetti ad irritazione alcuna. Il 6 è diretto a mostrare, altro non fare il tendine, che secondare, e seguire il moto delle sue fibre carnose; ne avere da lui medesimo alcun moto di contrazione, e non venirgli comunicato

nicato da qualunque siasi irritamento. Nel 7 dice essere stato lungamente, e diligentemente osservando il gran pettorale scoperto, il quale moveasi, e le cui fibre vedeanfi reciprocamente tirate dalla circonferenza al centro, e dal centro alla circonferenza non impalidir punto in tempo della contrazione. Mons. Oeder a proposito dell'ottavo fatto sopra un Gatto, e nella memoria del Sig. Haller segnato col num. 235. pag. 250. scrive in una dissertazion sua potersi richiamare il moto in un muscolo due ore e mezzo dopo la morte apparente dello animale, e che li muscoli della gamba staccati dal corpo vivente restano per anco irritabili. Vide nel 9, sperimentando sopra una Cagna, palpitare per lungo tempo uno de' muscoli retti del basso ventre di maniera, che le sue fibre si alzavano alternativamente, e rilasciavansi verso la sua estremità. Soggiugne nel 10 avere in un Gatto veduto il pettorale maggiore palpitare in tempo, che il cuore avea perduta ogni sua forza e moto. Trovo nel 11 ch' egli irritò in un altro Gatto collo spirito di vino alcoolizzato il diaframma, e molti altri muscoli, i quali si contraessero. Comprende il 12 sperimento fatto sopra un Cane, che gl'intestini aveano perduta la loro irritabilità, nel mentre che il diaframma conservolla eziandio un ora intera: che dopo questo, non altro; che il muscolo triangolare dello sterno restò più lungo tempo irritabile, di modo tale, che l'azione sua valeva a curvare alternativamente le coste, indi ad abbandonarle a loro medesime: che in tempo di quest'azione non aveavi cangiamento di colore in questi muscoli. Passando poi a considerare il moto de' muscoli di una anterior gamba in un Cane, fa nel 13 vedere, che erano tirati vicendevolmente, e che le carni loro si accostavano nel mezzo: nel tratto di tali azioni non solo non impallidivano; ma neppure sembravano gonfiarsi. Osservò nel 14 fatto sopra un altro Cane, agire, e muoversi di maniera li muscoli sternocostali, che allo stimolo contraevansi, e rilasciavansi alternativamente, che nella loro contrazione curvavano le coste, ch'eglino scender fanno; e nel loro rallentamento lasciavano in libertà, onde rimontar si vedevano. Troncò nella 16 li nervi d' ambe le posteriori gambe di due ranocchie, e sì l'una, che l'altra restaron tosto nelle medesime con privazione di senso non solo, ma di moto volontario ancora: la natura irritabile però de' muscoli di queste zampe restò la medesima, e chi vuol vedere la verità, provalo, e troverà che scoperti tremano da loro stessi: se s'irritano però, si vedono eglino agitati da convulsioni, senza sentor dello animale. Il 17 mostra, che nonostante la legatura del nervo, che diramasi alli muscoli; li muscoli tanto e tanto restano irritabili, e tale cosa la provò, senza più, nel nervo della gamba di un Cane. In altra simil bestia, come registra nello sperimento 18, alla quale avea in altra circostanza legato il nervo sciatico, mostra, che trovandosi la cute, e li muscoli di questa gamba insensitivi, volle, scoperti, irritarli: irritati si contraessero evidentemente, e palpitavano senza altro presidio de' nervi. Finalmente legato in altro ulteriore cimento il nervo ischiatico, come è già stato riferito, nella gamba di un Cane, più non ebbe senso sotto la legatura; conservossi non per tanto

tanto illesa la forza irritabile ne' muscoli. Questo ed altro simile sperimento sembrano tolti da Mons. Brunn. Vuolsi per ultimo stabilito mancare assolutamente i tendini d' irritabilità, siccome mancano di sensitività.

Sopra il Moto dell' Iride.

Questo anello membranoso, è dotato di una spezie d' irritabilità tutta particolare. Chiudesi ella per lo mezzo di uno stimolo, che non ha alcun effetto sopra il resto del Corpo Umano, da una luce cioè, avvegnachè, semplice, e si rilascia da un ombra, e dalle sue tenebre. E' la pupilla dell' occhio per parlare più giusto, che fugge la luce, e l' iride trovasi allora in uno stato di dilatazione guadagnando tutta la larghezza, che perde la pupilla. All' ombra per lo contrario, è la pupilla che si dilata, e l' iride si stringe. Queste azioni sono molto visibili nell' Uomo vivente, e ancor più nel gatto, e negli animali. L' iride si dilata fino a non lasciare, che una fessura rimpetto alla pupilla. Ho osservati alcuni fenomeni di questa membrana, ed io mi accingo a descriverli.

Per conoscere, se questo anello sia muscoloso, li 24. Novembre 1750., forai la cornea ad' un gatto con un ago da cucire. Non mi parve, che allo animale fosse sensibile lo sforzo, che bisogna fare per forare la grossezza, e durezza della cornea. Irritai in seguito l' iride, ne io vidi, che la pupilla si strignesse di più, ne mi sembrò, che si facesse in essa alcun moto. Li 24. febbrajo 1751. presi un coniglio bianco per fare coteste sperienze. Gli animali di questo colore, hanno la pupilla rossa in tutto il tempo della loro vita anzi che nò, come si dice averla li negri-bianchi: è probabile, che li negri-bianchi devono eglino nello stesso modo, che li conigli tutti bianchi questo color rosso al difetto della mucosità nera, della quale l' occhio de' conigli bianchi è totalmente priva. Ci si vedono molto comodamente li vasi rossi della coroide, che somministrano alla pupilla questo color rosso pallido. Quando l' animale è morto, la coroide impallidisce, e la rubicondità della pupilla nello stesso tempo si disperde. Nel coniglio bianco la pupilla diviene di una enorme larghezza nel momento stesso, che l' animale si accosta a morire. Parvemi più tosto ella un poco più stretta, quando la bestia fu totalmente morta. Mentre viveva, l' iride era estremamente sensibile al più menomo cambiamento della luce; restringevasi a proporzione che la luce diminuiva, ed allargavasi all' augmentarsi anche insensibilmente della medesima. L' iride ha de' vasi rossi concentrici alla pupilla. La cornea contribuisce evidentemente ad ingrandir gli oggetti: messa sopra caratteri augmentane il volume. Il cristallino faceva la medesima cosa, e con maggior potere ancora. Era assai grosso, molto convesso, e rendeva l' iride pur essa convessa. Vedevansi a traverso la pupilla li tronchi rossi della retina.

Li 3. Giugno, presi un gatto, il quale trovandosi avere l'iride in una stanza ben chiara, larghissima, glie la irritai con un ago passato a traverso della cornea: da questa irritazione non ne risultò alcun moto, e la pupilla non si ristrinse punto. Il primo Settembre misi a cemento una ranocchia: questo animale ha due maniere da difendere gli suoi occhi. Ha una membrana, che le fa chiuder spesso, e batter le palpebre fortissimamente, ed ha con ciò alcuni muscoli, i quali rovesciano l'occhio nel fondo dell'orbita, dove l'iride, ed il cristallino vanno a nascondersi: quest'iride ella è come si fa dorata, ed è insensibile; nè l'irritazione meccanica, nè la luce sarebbero valevoli a farla porre in contrazione. Li 7. Febbrajo 1753, noi annegammo un gatto, con intenzione di tentare mezzi per richiamarlo a vita. Nel tempo che teneasi sotto l'acqua, io vidi, come Mons. Mery ha osservato altre volte pur egli, vidi tre tronchi grossi delle arterie della retina, ed un cerchio verde-bruno (era il sito della lamina cribrosa) e la lucente veste della coroide. Conven far questo sperimento sotto l'acqua, perchè in altra maniera non si vedrebbero più le arterie della retina, e massimamente tratta la bestia dall'acqua.

Io concludo da queste esperienze, che la cagione del moto dell'iride, non risiede nella sua tessitura. Se in essa si trovassero fibre muscolari, il senso squisito delle quali cagionerebbe la costrizione della pupilla, elleno farebbono irritabili per cagioni molto più forti de' raggi della luce. Altre sperienze però da me fatte, mostrano chiaramente, la cagione del moto dell'iride essere nel senso; il perchè l'oppio, che distrugge il senso, distrugge eziandio la mobilità dell'iride. E' mestieri, che il senso risieda nella retina, perchè l'iride diviene immobile, quando una qualunque cagione restringe, comprime o distrugge il nervo ottico, la cui midolla continuata per mezzo de' tronchi della lamina cribrosa, forma la retina.

Finalmente il moto pel quale la pupilla si dilata, continua nello istante della morte, e dopo la morte medesima; e nella maggior parte delle mie sperienze me ne sono persuaso. Quanto alla cagione, che dilata l'iride, e che restringe la pupilla, ella non sussiste, che durante la vita, e fin che la retina trovasi essere in buon stato. Il meccanismo dell'uno, e dell'altro moto, sembrami difficilissimo da scoprire.

Per arrivare a conoscere se le fibre componenti lo anello membranoso di cui si è parlato sieno muscolari o no, e quale sorta d'irritabilità desso si goda. 16. sperimenti su varj animali adoperati io ritrovo, la maggior parte de' quali sono stati accennati: tutta volta riferirò quello di più che manca, e che rilevo nella memoria diaria del Sig. Haller, per così compiere al mio assunto. Di questi 16 sperimenti 6 vedonsi fatti in Gatti, 2 in Conigli, 2 in Capretti, 1 in una Pecora, in un Corvo, e in una Ranocchia, e 3 in Cani. Dice nel primo sotto li 3. Maggio 1750, che

che nel Gatto la pupilla trovasi dilatata dopo la morte, ne ad altro fine lo scrive, se non, perchè Monsi. Whitt ha asserito il contrario. Nel 2 mostra, che l'iride di un tale animale è larghissima, e di color giall'oro, ed ha una vivacità, ed uno splendore simile a quello della corioide, il quale vuolsi derivare egualmente dai fiocchetti, che ornan quella di un lucido rasato. Tale vellofità è quella, che in tempo di notte, oppure all'ombra brillante si vede. La Pecora, che nel 4 pose a cimento, sembrò non avere l'iride sensibile ai cangiamenti della luce, a cagion forse de' fenomeni della tosse dalla quale questo animale è tormentato. Nel 5 rilevar fa, che il Corvo, quantunque sia dotato di una membrana risplendente, non di meno sono sensibili alla sua iride i gradi accresciuti della luce, per cui, mestieri è, che restringa la pupilla. Tale splendente membrana è sensibilissima alle irritazioni. Scrive nel 7 aver osservato in un Capretto il moto dell'iride: in tempo che accrescevasi la luce, l'iride a poco a poco si dilatava, e spandevasi, il suo margine interno avanzavasi verso il centro dell'occhio, e la pupilla addiveniva più stretta. Al Gatto che nell'8 pose a cimento, restò la pupilla estremamente larga dopo la morte, mercè cui agevolmente potè vedere a traverso il cristallino la corioide di color giall'oro, e lucente come un topazio: che l'iride è convessa come pure convesso il legamento cigliare, il quale non trovasi, che leggermente attaccato al cristallino. Nel 10 osservò in un Coniglio di pelo miscbio, che la corioide è bruna anzichè no; e che, sebbene l'iride sia fornita di vasi sanguigni, non di meno la pupilla rossa non appare. Quanto poi all'11, il quale fu celebrato sovra un Cane, cui fecesi per forza prendere, ed inghiottire oppio, dice che approssimata una candela accesa a' suoi occhi, alcun cangiamento non ebbe nella sua iride, e la sua pupilla punto non si restrinse: questo sperimento, e l'altro che segue dopo, il quale in simil bestia fu tentato, ed ebbe in tutto e per tutto lo stesso stessissimo succedimento, vedonsi tolti da Monsi. Sproegel. (osserv. la dissertazion sua sperim. 22. 23.) Nel 13. irritò con un ago l'iride, ed a tale irritamento non solo non si ebbe moto, ma la pupilla stessa nè si allargò, nè si restrinse. Nel 14. comprova restarsi ne' Gatti dopo la loro morte la pupilla dilatata; e non solo ne' Gatti, ma ne' Cani ancora, come lo dimostra nello sperimento delli 29 Luglio 1752. segnato al num. 263. Finalmente l'ultimo fatto nel Gatto affogato, ed osservato sotto l'acqua per vedere le arterie della retina, e tutt'altro che si è notato, è sperimento rapportato ancora da Monsieur Evers tra quelli, che ha fatti sugli animali annegati in sua presenza.

Sulla Irritabilità de' Vasi del Corpo Animale.

HO toccata la superficie exterior dell'aorta di più cani, d'un capretto, di molti gatti, di alcune ranocchie, di due anguille; io non ho mai osservata niuna contrazione nell'arteria. Ho preso un microscopio, perchè nulla mi sfuggisse all'occhio, ma tanto, e tanto niente trovai di nuovo. Mi sono servito dello spirito di nitro fumante;

fumante; questo potente acido ha bensì cangiato il sangue nelle arterie in feccia, ma non ha prodotto in esso-loro alcun moto. Li 14 Settembre 1750. feci una incisione ad una delle arterie di una ranocchia, la quale aperse, presso a poco, la metà: in una fessura così fina, la più menoma contrazione dell'arteria deve farsi sensibile nel dilatarla; il muscolo medesimo in un cadavere allontana i labbri delle sue ferite l'uno dall'altro: eppure niente successe, la fessura restò tal quale, e così capillare com'era, e lo stesso evenimento fu sempre quello in altri esempi. Feci nel corso della state 1754 più di cento sperienze sopra ranocchie, nè mai venni fatto di vedere alcuna contrazione nella membrana delle arterie; giammai le vene che attraversavano la larghezza de' tronchi arteriosi non sono state compresse, e giammai un'arteria quasi vuota, che non conteneva più, che un piccol numero di globetti non è stata contratta.

Queste sperienze non solo m'hanno convinto quanto al numero, ma eziandio quanto al succedimento, che è sempre stato uniformissimo. *Primo*, che le arterie degli animali a sangue freddo sono assolutamente senza forza di contrattura; *Secondo*, quanto agli animali a sangue caldo, elleno devono avere molta forza di contrazione, per ristabilire un'arteria dilatata dalla forza del cuore, nel diametro suo naturale primiero. Questi animali hanno dall'altra parte nelle sue arterie delle fibre muscolari; e per conseguenza vi determino della irritabilità. Io per altro, non vo persuaso, e convinto dalle sperienze; imperciocchè ho trovato, che gli acidi chimici, li più potenti, hanno prodotta qualche contrazione nelle arterie. Questi veleni ne producono bene, come dirò a suo luogo, sulli nervi, i quali dalle sperienze diggia rapportate, sono assolutamente destituiti di ogni e qualunque irritabilità. L'irritazione meccanica, fatta col ferro acuto, produce una verace contrazione sopra tutto il muscolo, e sopra le membrane muscolari degl'intestini, dello stomaco &c., ma per lo contrario, non ne produce sulle arterie. Convien dunque attribuire questo apparente difetto alla grossezza della cellulosità, che compone il grosso della sostanza delle arterie, e che copre le fibre muscolari.

Venti esperimenti e più trovo registrati, oltre moltissimi altri solo accennati, per rilevare se v'ha irritabilità ne' vasi del corpo animale. Due in Cani, 2. in Capretti, 4. in Gatti, 10. in Ranocchie, e 2. in Anguille con ogni diligenza fatti. Dice nel primo avere su due Cani toccata tanto l'esteriore, quanto l'interior superficie dell'aorta con uno scalpello, poi coll'olio di vitrinolo, senza che si accorgesse andar essa contratta. Nel 2. all'opposto parvegli che all'applicazione dell'accennato caustico l'arteria medesima si contraesse alcun poco. Dal 3. si comprende aver fatta la sperienza dello stenone con riuscimento; di modo che, le gambe posteriori del Gatto, su cui adoperava, divennero paralitiche, quando ebbe perfettamente l'aorta legata: In tale stato

toccolla col menzionato veleno, ed ella contrassefesi alcun poco, ma lentamente. Tale contrazione nelle arterie è stata pur anco osservata da Mons. Zimmerman. Nel quarto toccò parimente l' aorta coll' olio di vitriolo, ne si contrasse punto: l' aperse per toccare i labbri della ferita; ma ad un tale contatto, restarono immobili. Vuota che l' ebbe del tutto, toccolla puranco internamente col detto olio, ed ella non si mosse. Il quinto fatto fu di un Capretto, mostra appunto lo stesso. In una Ranocchia, come ha notato Mons. Vandermonde pur esso, messa a cemento li 16 Luglio 1751. osservò col microscopio le arterie, che avea irritate, nè potè in loro vedere alcuna contrazione. La medesima cosa successe in due altri simili animali, come appare nel 7. sperimento; se non che in questi, il sangue continuò a muoversi per le arterie in quella guisa, che si sarebbe mosso in tubi di vetro, il cui diametro è immobile. Rilevasi nell' 8. aver veduto coll' uso del microscopio le pareti dell' arterie restarsi immobili durante la pulsazione del cuore, nè dilatarsi punto in tempo della loro sistole, nè contraersi quando la vital viscera si rilascia: asserisce nel 9. aver scoperti benissimo i globetti sanguigni, non che il loro moto, senza nè più nè meno aver movimento veduto nelle arterie. Soggiugne nel 10. esser stato da lui replicato in una Ranocchia lo stesso cimento, collo stesso stessissimo succedimento; ed ezianodio in tale circostanza essersi trattenuto ad osservare coll' occhio armato l' effetto dei polsi su di una vena, che passava a traverso di un arteria: questa senza dubbio alla più menoma dilatazione delle arterie avrebbe dovuto restare alzata; ma pure dice elli, niente di simile essere accaduto. Anzi nello sperimento segnato sotto li 16 Agosto 1751. mostra, che toccate le arterie di altra Ranocchia collo spirito di nitro fumante, queste non solo non si contrassero, ma il loro diametro paragonato alle parti vicine, e sane dell' arteria, ove detto potente acido non avea toccato, non trovossi nè più grande, nè più piccolo. In oltre, segue a far vedere nello sperimento 278. in altra Ranocchia avere col alcohol, ed il sugo di ritimalo toccate le pareti di un arteria, senza che nelle membrane, e nel lei diametro s' avesse alcuna contrazione. Toccò parimente in un Anguilla collo spirito di nitro fumante il bulbo dell' aorta, ma non si contrasse. Nello sperimento 15 segnato li 28 Agosto 1751, riguardo però al tronco superiore dell' arteria testè detta, dice, che toccatolo collo stesso veleno, pareagli che si contraesse alcun poco, lentamente però, e languidamente, cosa, che non successe assolutamente nell' aorta di un Gatto toccata parimente collo spirito medesimo, come confessa nel cimento delli 3 Settembre 1751. In quello però al num. 283. scrive aver irritata un arteria del mesenterio di una Ranocchia collo spirito testè detto, senza restar contratta, cosa che nelle numerose sperienze della state, che correva allora, più non gli successe. S' altro aggiugnessi non farei che ripetere lo scritto, e cose riferire già dal Signor Vandermonde su questo particolare scritte.

Sopra le Vene.

LI 2 febbrajo 1750. toccai la vena cavà di un canè coll' olio di vitriolo, ed ella evidentemente si chiuse. La medesima cosa accadere io vidi sopra un capretto, un gatto, ed alcune ranocchie. Toccai esternamente la vena cava collo spirito di nitro, ed ella similmente si restrinse. Lo stesso accadde toccandola internamente. La contrazion delle vene toccate co' veleni acidi, è più forte di quella delle arterie, e la ragione di questa differenza pare che sia apparentemente nella sostanza delle vene la più tenue, e la più ricoperta di cellulosità; ma siccome questa contrazione riesce ugualmente bene ne' cadaveri lungo tempo dopo la morte, e siccome l'irritazione meccanica non produce alcuna contrazion nelle vene, non è sì agevole, ch' io voleffi farmi a conchiudere alcuna positiva cosa da questa esperienza. Negli animali a sangue freddo, alcuna contrazion non accade nelle vene. E' probabile, che se ne dia in simili animali dovunque si trovano fibre muscolari; ma elleno sono molto rare nelle vene.

A comprobazione della irritabilità de' vasi venosi, sette sperimenti porta il Signor Haller nella sua ultima opera diaria avente il principio loro li 2 febbrajo 1750., ed il loro fine li 20 Settembre 1751. Quattro in Gatti, uno sopra un cane, uno in un Capretto, l' altro su varie Ranocchie, e tutti diretti a segnare la contrazion delle loro membrane, s' irritino queste o con spiriti chimici alcalini, o con acidi: dico con agenti chimici, volendosi quindi il Lettore avvertito, che i meccanici niuna contrazione producono nelle medesime in qualunque maniera vengano maneggiati, ed usati. Non è meno degno di avvertimento, che i spiriti acidi maggiore impression fanno nella parte, di quello si faccia no gli alcalini, e ciò rilevasi dallo sperimento segnato al n. 289., fatto li 21 Maggio 1751, nel quale trovo, che toccata la vena cava addominale, questa non solo al contatto dello spirito di vitriolo considerabilmente si restrinse; ma nel luogo toccato restovvi un notabil cavo, effetto del potentissimo veleno acido su d'essa adoperato. E vuol pure ragione ch' io non taccia, alle volte non eccitar questo, nè alcun altro irritante sia chimico, sia meccanico, alcuna contrazion nella parte, ed il Signor Haller ne dà un esempio nello sperimento al num. 287. fatto sulle vene di un Gatto, le quali, nè alla irritazion dello scalpello, nè a quella degli spiriti acido, ed alcalino, entrar si videro in contrazione. Gli altri sperimenti poi, siccome non varian tra loro, quanto al successo; quindi è, che non esiggon ricordazione veruna, avendoli indicati abbastanza il chiarissimo Signor Vandermonde.

Sopra li Vasi Lattei, ed il Condotto Toracico.

HO veduto farsi vasi linfatici, quelli, i quali poco tempo prima erano lattei. Questo fenomeno è molto comune, ed è conosciutoissimo: mostra però efficacemente, che li vasi possono scaricarsi dal loro chilo, a cagion della loro contrazione, e che in vece del chilo qualche altra causa, della quale qui non si tratta, fa succedere la linfa.

Ho toccato coll' olio di vitriolo il condotto toracico d'un forcio, si è ristretto, ed ha per lo mezzo di tale stringimento fatto uscire il suo chilo. Ho replicato li 12 Maggio 1751. le medesime sperienze sopra capretti, e sono riuscite egregiamente. Nel fare l'esperienza diretta a cavar da' vasi lattei per lo mezzo del veleno chimico il chilo, si vede chiarissimamente da' fenomeni, che partono dalla sola natura, che questi vasi sono di una forza contrattiva potentissima, per scaricarsi del chilo da esso lor contenuto. Le arterie, e le vene contenenti sangue, non hanno lo stesso potere.

Con sei bellissime sperienze, si rilevarà il Signor Haller quanta forza di contrazione possoggano i vasi lattei, ed il condotto toracico per isgravarsi, ogni volta che l'uopo il richiegga, del chilo, che contengono, cui non di rado, vuoti che sieno, succede per altra incognita cagione, della quale non vuolsi quindi cercar la ragione, una chiarissima linfa, che lucidi li rende di maniera, che, i meno instrutti, ed accorti su questo, potrebbero credere linfatici veri; e questa forza di contrazione, non solo vien loro accresciuta, o mostrata al contatto di un qualche agente caustico ad essi applicato, ma naturalmente, e di per se l'appalesano, imperocchè il solo calore vitale basta per eccitarla, ed eccitata perchè a poco a poco, o più celermente, secondo che la contrazione sarà più o meno forte, possano vuotarsi, azione che dona loro, perfettamente sgombri che sieno, una trasparenza, la quale rendeli all'occhio nudo invisibili; e questo fenomeno è quello, che ha fatto, e fa tutt'ora osservare a' notomisti divenir vaso linfatico quello, che prima era latteo; metamorfosi però, che non ha da sorprendere, asserendo il Signor Haller essere cosa comunissima, e conosciutissima nella natura, e che quotidianamente accadere si vede. Tornando alle sperienze, trovo essere state fatte, la prima in un Coniglio, la 2 in una Capra giovane, la 3 in un Sorcio, la 4 su di un Capretto, la 5 in un Gatto, e l'ultima sopra un Cane. Dice nel secondo, che quantunque il Topo su cui sperimentava fosse animale piccolo, non di meno vide benissimo i vasi lattei riunirsi nel pancreas d'Asellio, dalla cui glandola conglomerata due tronchi escono per recarsi al reservatojo del chilo, che è locato, e s'incontra sotto il diaframma, ed ivi giunti, e scaricati, perdersi, ned altra cosa vederli nascere dal detto reservatojo, che il condotto toracico, il quale

quale s' alza lungo l' arteria aorta, e con essa a mano destra, anzi che no ascendendo, s' apre, e va a metter capo nella succlavia sinistra, nella quale giunto si scarica. Chi non sperimenta, non potrà mai far chiara idea della viva contrazione di questi vasi lattei, e condotto toracico; basta dire, che le vene, e le arterie tanta certamente non ne posseggono: e se naturalmente, e dal solo stimolo del vitale calore ajutati, si contraggono e per mezzo di tal contrazione con tanta prontezza si scaricano, che non adopererà la loro forza contrattiva accresciuta che venga dall' applicazione di qualche agente chimico? Si dice chimico, perchè il meccanico, niuna contrazione eccitare si vede.

Sopra la forza di contrazione della Borsetta del Fiele.

HO fatte molte sperienze sopra cani, gatti, riccj, capretti, anguille, e conigli, a' quali tutti ho toccata la borsetta del fiele coll' acido chimico: in alcuni ha mostrato di contraersi; in altri non ha dato alcun segno d' irritabilità. Ella non si è punto chiusa; si è però contratta, quando ho usato fu d' essa olio di vitriolo. Il butiro d' antimonio, nulla ci ha fatto.

Queste esperienze, quantunque tra loro molto discordanti, possono non per tanto concordemente unire per mostrare, che la forza contrattiva della borsetta del fiele, non è, nè forte, nè viva, e ch' ella adopera più debolmente, e più lentamente, che non fa nella vescica urinaria. Ho veduto, per vero dire, delle borsette piene di due, o tre grosse pietre formar tante concamerazioni, quante erano le pietre, e restringersi considerabilmente nel loro intervallo. Potrebbe attribuire questa contrazione ad una forza muscolare della vescichetta, essendo evidentissima cosa, che il diatramma non ci concorre per niuna maniera. Ma questi restringimenti tra gli spazj ove si dilata, un reservatojo, si fanno pur anco nel regno vegetabile, senza che alcune fibre muscolari ci possano aver parte. Nella radice, o sia ravanello, o per modo di esempio nell' accacia, l' intervallo de' grani non di rado viene stretto così forte, che non ci resta quasi più di cavità, onde li grani gonfiarsi, e si possano cellule formare.

Le 15 sperienze, che trovo sotto i suoi rispettivi giorni, ne quali furono fatte, riportate dal sempre lodervole Signor Haller, 8 delle quali vedonsi celebrate in Cani, 3 in Gatti, 1 in un Riccio, 1 in un' Anguilla, 1 in Capra giovane, e finalmente l' ultima in un Coniglio, tutte sono dirette, quantunque discordanti tra loro a mostrare l' irritabilità delle membrane della borsetta del fiele, non che la loro forza di contrazione. E per alcuna cosa dire di più di quello trovo riferito, dalla quale a comprender si venga come, tanto per riguardo all' una, quanto per rapporto all' altra, non sempre abbiano, forse per alcune occulte circostanze, al cimento obbedito, e non s'ensi vedute le medesime

mem-

membrane nè irritabili, nè contraibili; e alla fin fine qual varia impressione abbiano su loro fatta li varj agenti chimici, o meccanici ad esse applicati, passo a toccare ordinatamente le mentovate sperienze.

Nella prima toccò ad in un Cane la borsetta, che fa il soggetto delle sperienze col butirro d' antimonio, e si restrinse; nella 2 sopra altro Cane tornolla collo stesso agente chimico a toccare, e di nuovo si contrasse, quantunque con lentezza, perchè non in altra maniera questa contrazione succede; la terza mostra, che applicato l' olio di vitriolo, niuna contrazione s' ebbe; nella 4, il detto olio chimico produsse per lo contrario una considerabile contrazione; nella 5, segna avere lo stesso liquor caustico forzata la detta vescichetta a chiudersi; nella 6, veder fa, che avendo la menzionata parte toccata col testè accennato agente chimico, ella gagliardissimamente, e in un tratto si contrasse; nella 7, la contrazion fu più debole, non ostante l' uso dell' irritante fin quì usato; nella 8, fu anco più lenta; nella 9, fatta sopra un Riccio, nè più, nè meno successe dell' antecedente; nella 10, fatta sopra un Cane trovò, che il contatto dell' olio di vetrinolo produsse una violenta contrazione; non così successe nella 11, perchè la vescica toccata collo stesso agente chimico in un Anguilla non si mosse; in un Gatto, che fa il soggetto della 12 sperienza, dall' uso del alcohol, non si ebbe contrazione, e quella, ed' eccitò lo spirito di nitro fumante usato dopo, fu poco considerabile. In altro poi, così appare nella 13, la menzionata borsetta non solo al contatto dell' anzidetto spirito si contrasse vivamente, ma il suo diametro restò considerabilmente diminuito. Per lo contrario la 14 fatta in un Coniglio mostra, che non si trovò in detta parte posta con agenti chimici a cimento niuna irritabilità. Tutt' altro che di più il Sig. Haller aver trovasi su questo nella sua memoria diaria, lo ha riferito diligentissimamente il Sig. Vandermonde, ed il ripeterlo sarebbe inutile.

Sopra la forza di contrazione della Vescica Orinaria.

Essendo la vescica pienissima d' orina, ella si contrae da se medesima per mezzo della forza delle sue fibre muscolari. Li 6 febbrajo 1746. forai quella di un cane con un ago, ed ella non cessò di fare spicciar fuori con forza l' orina, fin ch' ella non si trovò ridotta alla grandezza d' una noce. La sua contrazione si fa lentamente, ma senza interrompimento, e senza alternativa di rilasciamento, fino che giunga ad essere al diametro ridotta, del quale ella è capace. Feci li 27 Aprile la medesima prova sopra un gatto, e l' orina spiccò pel canale naturale fino all' ultima goccia. Li muscoli del basso ventre non avevano alcuna parte in questa evacuazione, poich' eglino erano aperti non solo, ma distrutti ancora. Ho replicate queste sperienze sopra cani, gatti, conigli, ricci, un capretto, sopra topi, ed elleno sono sempre, con ugual successo, riuscite a maraviglia. Li 18 Ottobre toccai la vescica d' un

coniglio coll' olio di vitriolo, ed ella si restrinse. Ho creduto tornar bene, ch' io metta in opposizione la poca contrazione, che ha prodotta l' olio di vitriolo nella vescica, col vivo restrignimento, che accade a cagion della irritazione meccanica ad essa procurato dallo stimolo medesimo dell' orina. Questa contradizione sembrerà levare il credito alle sperienze che fannosi, o fatte si sono con questi accidi violenti: si vede ch' eglino producono della contrazione nelle membrane, le quali per loro natura non ne hanno, e che per lo contrario nulla agiscono, o almen pochissimo in quelle, che ne sono dotate, come nella vescica, nella quale questa forza si manifesta naturalmente con tanta vivacità. Per altro mi è sembrato, che la vescica si contragga più vivamente, e con maggior forza, quand' ella è piena, e che la contrazione sua facciasi incessantemente, senza dar luogo, ed ammettere alcuna alternativa di rallentamento. Ed ecco il perchè un uomo, che non respira può far uscire l' orina con un continuo spiccio, senza servirsi del diaframma.

Se ben mi avvisò, diciotto sperimenti sotto i loro rispettivi giorni, e tempi porta il Signor Haller per mostrare qual forza di contrazione abbiano le membrane della vescica urinaria fino a spremere, di per se contraendosi, l' ultima goccia d' orina in esso - lei contenuta. Gli è vero, come si vedrà, questi ad un per uno riportando, che non sempre all' azione di ogni e qualunque agente si è veduta tale contrazione nascere; niente di meno però, questo non ha a valere, per fare, che le più sperienze non s' abbiano ad ammettere per veraci, e come propriissime a far rilevare la mentovata forza. Otto furono fatti sopra Cani, 5 in su Gatti, 2 in Conigli, 1 sopra un Riccio, 1 sopra un Sorcio, l' altro finalmente su di una Capra. Nel primo fatto sopra la vescica di un Cane, trovo, che punta questa con un ago, la quale trovavasi piena di orina si contrasse in maniera, che non solo s' ebbe uno incessante vibrato spiccio del fluido contenuto; ma tal forza di contrazione ridusse la ad una stretta picciolezza per riguardo alla sua mole in istato di dilatazione. Il butirro d' antimonio nel 2 sperimento fatto sopra quella di un Gatto, produsse la medesima contrazione. La puntura dell' ago, e dello scalpello usati nel 3 tentato in un Coniglio, eccitò una vivissima corrugazione. Fa vedere il 4, che la vescica di per se stessa contrassefi quanto potè mai, fino a cacciar fuori l' ultima goccia d' orina, che conteneva, nascesse questo o dal contatto esteriore dell' aria, o dallo stimolo dell' orina medesima. L' uso dell' olio di vetriuolo non produsse incremento veruno nel 5 sperimento fatto sopra la vescica di un Gatto. Nel 6 per lo contrario, il contatto del detto olio fece nascere violenta contrazione nella vescica di un Gatto, che tale era lo animale posto a cimento. Il 7 ci fa vedere, che sperimentando sopra la vescica vuota di un Cane, sembrò questa non muoversi, e risentirsi molto al contatto dell' olio restè accennato. C' insegna il Signor Haller nell' 8, che in altro Cane, avendo coll' anzidetto agente chimico toccata la vescica quasi vuota,

vuota, questa corrugossi lentissimamente. Nel 9 dice, che la vescica del Cane, sul quale sperimentavasi, poco irritabile comparve; così quella del Riccio posta a cimento nel 10. In quello delli 12 Maggio 1751. l'olio di vetrinolo produsse nella vescica di una Capra giovane una mediorissima contrazione. Nell'altra poi del Cagnoletto, che trovo posto alle prove nel 12, non s'ebbe quasi di contrazione al contatto dell'olio suddetto. Nel Gatto su cui si sperimentò nel 13, la vescica si contrasse da per se stessa perfettissimamente. La vescica del Gatto, che si pose al cimento nel 14 poco si mosse all'azione dell'alcohol; non mancò però la contrazione naturale, ne (come nota anche Monsf. Sproegel esp. 26) suol mai mancare. L'oppio che erasi fatto inghiottire al Cane del 15 non impedì, che la vescica si contraesse, tanto di per se, quanto all'azione d'altro stimolante agente. Lo spirito di nitro fumante eccitò contrazione nella vescica del Sorcio, notato al 16, nel qual luogo fa avvertire il Signor Hallero, aver egli, sebbene si avvisava, sempre trovata la vescica piena zeppa d'urina in quegli animali, a quali, prima del cimento, erasi fatto prender veleno. Lo dice ancora Monsf. Sproegel esp. 11. La vescica del Cane, su cui si sperimentò, come si rilevare nel 17, pochissimo si contrasse coll'uso dell'olio più volte menzionato. Per l'opposito, quella del Coniglio, che servì all'ultimo degli sperimenti, che trovo registrati si chinse benissimo all'azione del lodato olio. Il resto è notato distintamente dal Signor Vandermonde.

Sull' Uretra.

HO veduta, ed osservata l'uretra di un cane contraersi, quando la toccava coll'olio di vitriolo. Mi è sembrato dalle differenti sperienze, che ho fatte sopra diversi animali, che la forza contrattiva di questo canale sia estremamente debole, o più tosto che non ci sia, o sia per lo meno difficile il dimostrarvela. La notomia in essa non iscopre fibre muscolari; e sembra da' fenomeni, che accadono in quelli, che sono attaccati dalla pietra, o da calcoli, che violente convulsioni de' muscoli del basso Ventre sieno di mestieri per fare, che in essa si avanzino tali corpi.

Quanto la forza di contrazione nella vescica urinaria è grande, altrettanto negli ureteri è picciola; cercasi questa di sollecitare con agenti o chimici, o meccanici, è sempre stremamente debole, e lenta. Così mostrano li 4 sperimenti, che per ciò dare a divedere porta il dottissimo Hallero nella sua memoria; il 1 fatto sopra un Cane; il 2 su di una giovin Capra; il 3 sopra un Cagnoletto; il 4 in un Gatto. Nel 1 l'azione dell'olio di vetrinolo col quale toccò uno, od entrambi gli ureteri non produsse contrazione veruna in loro; nel 2, l'olio medesimo nulla eccitò; nel 3 accadette la stessa cosa; nella 4 detto agente chimico tornò bensì a produrre contrazione ne' condotti anzi detti: ma fu stremamente picciola, e fiacca.

Sulla.

Sulla forza di contrazione dell' Utero.

IL moto delle corna della matrice d' una cagna, parvemi li 3. Gennajo 1751. essere estremamente evidente. Non ha egli bisogno d' irritazione per manifestarsi; imperocchè egli è simile, ed uguale al moto peristaltico degli intestini. Ho chiaramente veduto questo fatto sopra altre cagne pregunte, gatte, coniglie &c. Li 25 Settembre il moto della matrice d' una coniglia pregna fu considerabilissimo, quantunque fosse staccata dal corpo, e dalle sue corna. Sembra da ciò venir dimostrato, che la matrice si contrae tanto fortemente, quanto fanno gl' intestini in congiuntura di qualunque siasi irritazione, e che questa forza può fare avanzare la cagione irritante delle sue espansioni fogliacee alla matrice; di modo che, movendosi gl' intestini, vengono a scuotere le corna della medesima, la quale avendo un moto peristaltico vigoroso al par di essi, non possono non amenò di non riuscire egualmente nell' opera loro. Un frutto inghiottito, è portato dallo stomaco al retto, ed un ovo, che passi per la espansion fogliacea deve venir spinto per la tromba fino all' utero.

A dimostrare il moto delle ale, o sien corna della matrice nelle quadrupede somigliantissimo a quello degli intestini, sei sperienze trovò notate nella memoria di Lofanna fatte sopra diverse bestie pregunte. La 1 in una Cagna, nella quale senz' uopo d' irritazione vide chiarissimamente il Signor Hallero il moto delle cornute ale; la 2 in una Gatta, in cui si ebbe lo stesso stessissimo successo; la 3 in altra Cagna, che riuscì non meno diversa dell' antecedente; la 4 sopra una Coniglia, nella quale viderfi muovere, e contraersi le corna della matrice in un modo somigliantissimo al peristaltico; la 5, che s' ebbe sopra una Gatta non fu diversa, quanto al risultato, dalla descritta, sì per riguardo alle trombe, che alle corna dell' utero; colla sesta finalmente, che fu fatta su di una Coniglia, mostra, che non ostante, che la matrice le fosse staccata dal corpo, tanto e tanto conservò la sua natural forza di contrazione, e ne fe rilevare il felice successo nella parti di questa mal concia Quadrupeda, nelle quali dice, che il moto loro fu anco in tale circostanza considerabilissimo.

*Sul movimento peristaltico del Ventricolo, e dell' Esofago,
e prima sul Ventricolo.*

CI è stato in ogni tempo, e ci sono ancora Autori, che hanno del dubbio intorno al moto del ventricolo. Per levare questa dubbietà, ho giudicato bene di dover portare un numero bastevole di sperienze per ridurre li più increduli ad ammettere la contrazione

zione di questo muscolo cavo, il quale ha ricevuto fibre carnee visibilissime dalla natura. Con tutto ciò, è indubitato, e certo, che lo stomaco è quasi sempre più lento ne' suoi moti, che non lo sono gl' intestini, e ch' egli non si strigne colla medesima esattezza; non resta però ch' egli non abbia quel moto, che per sua proprietà possiede, il quale per alcun conto non deve alli muscoli dell' addomine. Mons. Chirac avrebbe potuto rammentarsi quand' egli assegnò questi muscoli per autori del vomito, che li medesimi sono soggetti alla volontà, e che il vomito lo farebbe pur esso, se dipendesse da loro. Gli è vero ancora, che il moto del ventricolo non si è manifestato in più delle mie sperienze; ma quelle che lo confermano, hanno senza alcuna contradizione assai più forza per dimostrarlo, che quelle non hanno per annientarlo, nelle quali, non si è osservato. Un moto nel corpo umano, non può nascere senza che non abbia nella struttura della parte cause sufficienti, e l' effetto nascer non potrebbe, senza la cagione; ma la causa di un moto può benissimo non agire di continuo. Puossi accordare, che lo stomaco sia vuoto, e che per conseguenza manchi di causa irritante; puossi dare ancora, che l' aria fredda abbia distrutta la sua contrattilità, come la distrugge nel cuore medesimo; è probabile per fine, che una estrema prostituzione di forze nell' animale impedisca lo stomaco di strignersi: tutte queste cause, ed altre ancora, possono sospendere le azioni del ventricolo, e degli intestini; ma non possono servir di prova contro il moto evidente, che in altri tempi in queste parti si osserva.

Sul Ventricolo.

I Ritai li 23 Giugno 1751. lo stomaco di un coniglio con un coltello, ed egli si chiuse, spingendo l' aria della quale era pieno verso il piloro. Lo staccai interamente dall' intestino duodenale; chiusesi così bene questa ferita pel mezzo della sua contrazione, che non usciva nulla dal piloro. Vidi li 6 Aprile 1742. sopra un cane lo stomaco strignersi alternativamente nella regione del piloro, e ridursi al più piccolo diametro possibile; indi rilasciarsi, e gonfiarsi a cagion dell' aria, che riprendeva lo spazio, di cui poco anzi la contrazione del ventricolo privato l' avea. Il moto peristaltico dello stomaco mi è sembrato ancora molto più manifesto sopra cani, di quello degli intestini: io lo eccitavo, irritando la parte superiore di questo cavo muscolo; egli scendeva a poco a poco verso il piloro, e spingeva innanzi le materie contenute nel ventricolo. Le contrazioni, e le dilatazioni comparvero alternative, fin che lo stomaco trovossi del tutto vuoto, e che tutto era passato nel duodeno.

Li 16 Gennajo si fece inghiottire ad un cane arsenico, e subito

mato ad un altro. Nel primo cui trovossi nello stomaco un grumetto d'arsenico; il ventricolo si vide ristretto dove avea toccato il veleno in maniera, che si ridusse ad una specie d'Istmo; fenomeno, che ho veduto in più cadaveri, e più di frequente s'io non m'inganno nelle donne. Il cane, al quale si era fatto inghiottir sublimato, diede campo, che si vedesse qualche moto peristaltico nel suo ventricolo, ma senza vivacità. Quand' io l'ebbi separato dal suo esofago, egli si contrasse, ridusse quasi a niente la sezione, e non lasciò passare neppure una goccia di fluido per l'apertura. Ho osservato questo moto incontrastabilmente sopra cani, gatti, capretti, topi, conigli, e ranocchie. E siccome potrebbesi cavare qualche obbiezione dall'accesso, che avea dato all'aria nelle sperienze, ch'io ho rapportate fin qui, e della quale potrebbesi accusare la forza irritante; quindi è, che ho creduto dover lasciare il peritonèo intero. Ho veduto a traverso di questa trasparente membrana lo stomaco gonfiarsi, e sgonfiarsi, ed il diaframma seguire questo movimento alzandosi, e scendendo alternativamente col ventricolo.

Li 2 Settembre feci inghiottire ad un gatto arsenico: vidi lo stomaco agitato per un ora da un moto lento, e dolce dopo la morte apparente del gatto. Fecesi inghiottir parimente oppio ad un cane, e non comparve alcuna forza di contrazione nello stomaco. Monf. Sproegel avea fatto prendere sublimato ad un cane, per cui mi venne procurato il primo piacere di vedere l'azion del ventricolo nella circostanza del vomito. Comparve in quest'organo 1. un moto circolare di contrazione tale, quale non avea che assai di rado veduto, e per cui vengono spinte le materie contenute nello stomaco verso il piloro; ma veder si fecero 2. alcune subite scosse, e violente, nelle quali la parete anteriore dello stomaco accostavasi alla posteriore. Volli altresì chiarirmi sulla sensitività del ventricolo; per ciò lo irritai in differenti maniere, e l'animale non mostrò di patire tanto, quanto faceva, quando gli si irritava la cute. Lo toccai in seguito col sublimato, e vidi formarsi in esso delle rughe, che percorrevano la lunghezza sua; e che facevano chiaramente vedere le fibre longitudinali dello stesso viscere.

Il moto peristaltico dello stomaco di un cane, fu considerabilissimo nel giorno 15 Aprile 1752., nel quale presesi ad esaminarlo; e durò più lungo tempo di quello del cuore medesimo.

Io credo aver dimostrato bastantemente con queste riportate sperienze, che annovi veracemente due moti nello stomaco; uno di contrazione, circolare assai conosciuto; ed un altro di appianamento, che fassi, quando le due faccie si accostano l'una coll'altra: Etcovi come ne comprendo il meccanismo.

Prendo per punto fisso alcune fibre oblique, perchè quest'ordine di fibre è più forte di quello sia il resto, che in Francia si chiama con termine francese *Cravate suisse*. Le fibre, che scendono da questo pacchetto, il quale si allarga, e si spande sopra le due faccie, e

che apparentemente trovano nel grand' arco un altro punto fisso, che s'è considerato come un legamento, formano due ordini di mezza sfera, li termini de' quali sono alli due archi, e le convessità nel mezzo delle faccie. Il loro raccorciamento dal quale vengono appianati questi archi, accosta le due faccie l'una all'altra. Queste medesime sperienze possono servire a disingannare li difensori della trituratione, i quali hanno preso negli animali granivori alcune idee, che hanno voluto applicare agl' uomini. Il cane ha lo stomaco più robusto dell' uomo, ma il moto non lascia di manifestarsi in esso molto più dolce, e mite, che quello degl' intestini. Non bisogna comparare le forze dello stomaco a quelle del diaframma, ne a quelle de' muscoli, che obbediscono alla volontà.

Moltissimi certo debbono essere stati gli sperimenti fatti dallo ingegnossimo Signor Haller, non che da suoi dotti Scolari, e particolarmente da Mons. Sproegel, Zimmerman, Castell &c. per rilevare non solo, oltre il moto peristaltico a questa parte naturale, ma stabilire i due moti del ventricolo, uno di contrazione eseguito dalle fibre circolari; l'altro di appianamento, che succede, quando l'una parete, accostasi all'altra, i quali chiaramente co' sperimenti mostra, e con soda teoria stabilisce. Trentasette non pertanto ordinatamente ne riporta, registrati secondo l'ordine de' tempi, e giorni, ne quali furono fatti; 17. de' quali vedonsi celebrati in Cani; 8 in Gatti; 4 in Conigli; 3 in Capretti; 3 in Ranocchie; 1 in un Riccio; l'altro in un Sorcio. Mi estenderei troppo, se volessi ad un per uno toccarli, e secondo la loro categoria riferirli, né altro farei, che ridire, rispetto ad alcuni, e ripetere quello, che ha fedelissimamente trascritto Mons. Vandermonde: dunque seguendo lo stile, che in altre simili circostanze è stato per me tenuto, anderò solo solo notando quello che da questo celebre giornalista non è stato scritto, e notato, ad effetto, che tutta la dottrina del celebratissimo Hallero su questo ancora resti sposta; come lo è nella sua memoria diarica. Nel ventricolo di un Gatto posto a cimento li 14. Giugno 1731. non comparve moto peristaltico, si prima, che dopo l'uso dell'irritante. Il moto peristaltico dello stomaco di un Cane posto alla tavola delle sperienze li 21 Luglio 1740. evidentissimamente si scorre sopra tutto il piloro, il quale non solo si contrasse, ma quanto mai potea serossi, quando venne collo scalpello irritato. Nel ventricolo del Cane posto al segno 348. li 8 Marzo 1746. il moto fu evidentissimo; come per lo contrario non lo fu quello dello stomaco dell'altro Cane, su cui sperimentossi li 12. Gennaio 1750., il quale sembrò indolente: irritato però si restrinse, e corruo a segno, che si ridusse al diametro d'un intestino. (questa sperienza sembra appunto quella stessa, che Mons. Felice porta al num. 3 pag. 26., ed io certo la spacciarei per sua, se le diverse date de' tempi non mi persuadessero diversamente.) Nello sperimento 352 fatto sopra un Cane li 2 Febbrajo anno poc' anzi detto, cui erasi fatto prender veleno, comparvero sopra il suo stomaco numerose contrazioni, ma

di poca estensione; vedeanfene verso il piloro, lo esofago, li due archi; ed altri luoghi, ed apparentemente da per tutto, ove il veleno avea impression fatta, ed erasi fissato, irritazion cagionando. Nell' altro, che immediatamente segue, gl' intestini ebbero il loro moto peristaltico; non gli riuscì però al Signor Haller di eccitare quello dello stomaco, quantunque soffiassè aria per la bocca del Gatto, che tale era lo animale, su cui sperimentavasi, e pervenir la facesse nella sua cavità. Irridò lo stomaco di un Cane li 12 Settembre 1750. col butirro d' antimonio, al cui contatto si contrasse con tanta forza, che uscir fece dal piloro le materie, che conteneva. In altro Cane si vide a maraviglia il moto peristaltico dello stomaco. Osservando tale parte in un Riccio, che era piena ancora d' alimenti, vide chiarissimamente agire la lei naturale forza di contrazione. In un Gatto li 22. febbrajo 1751. vide lo stesso. Tale forza non si fece vedere nel ventricolo di un Capretto, se non quando l' ebbe irritato. In un Coniglio li 6 Marzo anno ultimo accennato, osservar fece il moto peristaltico del ventricolo. Li 20 Aprile lo fece rilevare più che mai in un Sorcio. In una Ranocchia poi li 19 Maggio vide distintissimamente la contrazione, ed il rallentamento del ventricolo per lo tratto di un ora intera. Nello sperimento 363 sopra un Capretto, nel quale avea lasciato intatto l' addomine, e non avea aperto che il petto; vide pulitissimamente a traverso, non solo del diaframma il moto del ventricolo, ma lo vide ancora per la trasparenza del peritoneo dopo aver levati i muscoli del basso ventre. Lo sperimento, che segue fatto in un altro Capretto, ne quali animali dice, che il diaframma è sottilissimo, e trasparente, è in tutto e per tutto similissimo all' antecedente, quanto al metodo, e risultato. Nella Ranocchia delli 16. Agosto, confessò non aver potuto eccitare il moto del ventricolo, sebbene lo irritasse con agente chimico. Irridò il ventricolo di un Gatto li 3. Settembre anno ultimamente detto col alcohol il più dolce tra gli irritanti, che agiscono sopra il corpo animale, e la contrazione, che si ebbe fu debolissima. In altro Gatto, al quale avea fatto prendere oppio, vide, malgrado questo narcotico, il moto peristaltico, e videlo essere non poco considerabile. Lo stomaco della Ranocchia su cui sperimentò li 28. Settembre, parve non risentirsi tanto della irritazione fattagli alla membrana interna. In un Gatto al quale avea inghiottir fatto del cobold, il moto peristaltico comparve violento. Non così veder fecesi nel ventricolo del Cane al num. 372. cui avea fatto prendere oppio, imperocchè non solo nulla di moto si vide, ma la sua forza irritabile trovossi totalmente distrutta, ne valse mezzo per sollecitarlo a contraersi: furono adoperati agenti chimici, come lo spirito di nitro, e meccanici, come il ferro, ma invano. Questo sperimento, quantunque raro, trovassi eziandio in Mons. Sproegel; il quale avendo al Cane, che fa il soggetto della sperienza 373. fatto inghiottire oppio, trovò il ventricolo anco una fiata spogliato del suo moto peristaltico. Tale valente Medico prese il Coniglio notato allo sperimento 374., e gli fece prender sublimato. Aperto poi, non vide, che un moto peristaltico dolcissimo. Irritato il suo ventricolo

tricolo col veleno acido, contrasse. Il cobold, che servì alla sperimenta-
 375. cagionò bensì una grande infiammazione allo stomaco, ma in esso
 non eccitò alcun moto peristaltico. Non ostante l' azione dell' oppio, che
 erasi fatto inghiottire al Coniglio delli 5 Novembre 1751., il suo stomaco
 sempre si contrasse a cadauna irritazione. Dice finalmente il Signor
 Haller (avendo tutto quello che segue notato il Signor Vandermonde)
 aver veduto nel Cane delli 18 Novembre Sperimento 378. nascere lo stes-
 so stessissimo fenomeno, che avea nell' altro veduto, al quale, come a
 questo, erasi fatto inghiottir veleno sublimato, avea cioè veduto la pare-
 te anterior dello stomaco accostarsi alla posteriore, e così divenir piatto.
 Ho voluto tutto questo aggiugnere per non lasciar nulla, che dal celebre
 sperimentatore si è scritto. E se da esso è stato giudicato bene il scriverlo;
 inutil cosa non dee similmente essere riputata l' aver io ciò, che mancava
 al compendio, aggiunto.

Sul moto dell' Esofago.

UN gatto era stato forzato ad inghiottire del sublimato, dall'
 azione del quale veleno il suo esofago restò così contratto; e
 stretto, che in esso non restò più di cavità. Sembra, che il diafram-
 ma stringa l' esofago nel tempo della inspirazione. Li 10 febbrajo
 1752. scopersi l' esofago di un cane nella cavità del petto, e così
 scoperto, lo irritai col coltello; egli si contrasse perfettamente, e
 spinse innanzi la porzion d' alimento, che la parte contratta avea
 trattenuta. L' esofago di un altro cane irritato, si contrasse con
 molta forza, ed anco più fortemente dello stomaco.

Sembra da queste sperienze, che ci sieno due moti nell' esofa-
 go. Il primo appartenente all' esofago stesso, il quale è peristaltico,
 e della medesima natura, di quella dello stomaco, e degli intestini.
 Tale moto è quello, che spigne innanzi, e fa inoltrare gli alimen-
 ti, e la bevanda dalla faringe fino allo stomaco. L' altro è stranie-
 ro, ed è impresso nello stomaco dal diaframma, il quale come testè
 dicemmo strigne l' esofago nella inspirazione.

Questa sperienza conferma quello, che ho altre volte insegna-
 to, che il vomito non può farsi, se non se, in tempo della espira-
 zione.

Dopo aver mostrato il Signor Hallero, che la potenza narcotica
 dell' oppio distrugge il più delle volte l' irritabilità dello stomaco; passa
 a far vedere il moto dell' esofago. Io non noterò, seguendo il mio costu-
 me, che l' ommesso; e perciò trovo, che l' esofago del Cane, che servì
 allo sperimento 382. restò compresso dall' azione del diaframma nel tem-
 po della inspirazione: l' esperienza, che tien dietro a questa concorre
 pur essa a mostrare lo stesso; nè occorre il ricordarla per minuto. La
 compression, che successe nello esofago del Cane delli 26. Novembre spe-
 rimen-

vimento 384. dice che sarebbe stata più perfetta, se il basso Ventre fosse stato interamente, e perfettamente chiuso dalle viscere, che contiene, come trovassi esserlo in animale illeso, e vivente. Nell' altro Cane, che servì alla sperienza, che trovassi sotto il numero 385. vide, mentre questo inspirava, vide compresso l' esofago, ed alzato dal diaframma. Ciò che resta, sta diligentemente notato.

Sulla Irritabilità, e sopra il moto peristaltico degli Intestini.

IL Signor Haller ha fatta una multitude prodigiosa d'esperienze sopra animali di ogni specie per provare il moto peristaltico degli intestini, i quali ha voluto irritare con tutte le sorte di stimolanti. E siccome troppo lunga, e stucchevol cosa sarebbe il riportar quinci la numerosa serie di tutte queste sperienze; quindi è, che passiamo a mostrare ch' elleno si limitano a più capi.

I. A dimostrare il moto peristaltico degli intestini grossi, malgrado il sentimento di alcuni Autori, che l' hanno voluto negare.

II. Questi sperimenti fanno vedere l' estrema picciolezza del diametro, al quale gl' intestini, meccanicamente irritati possono restringersi, il quale riducesi quasi a niente. Li matematici che hanno fissata la contrazione de' muscoli ad un terzo della loro lunghezza, non hanno consultato nel fare il loro calcolo, che la teoria.

III. Il Signor Haller prova, che il moto peristaltico, non ha mestieri dell' aria esteriore per manifestarsi; poichè, come si è sopra detto, lo ha osservato a traverso del peritonèo.

IV. Ne risulta, che il moto anti-peristaltico si fa vedere ancor esso quasi sempre, come il moto naturale peristaltico, dal quale vengono portate le materie verso il retto.

V. Vedesi la maniera colla quale adoperano i purganti: eglino accrescono la contrazion dell' intestino, e la quantità del fluido, che in esso contiene.

VI. Il Sig. Haller ha osservato come si facevano le introssuffezioni, come sono quelle, che accompagnano il miserere; alle quali non ha giammai veduto che sopravvenissero infiammazioni, perchè poco tempo dopo che si sono formate, sciolgonsi da loro medesime.

VII. L' oppio distrugge il moto peristaltico più spesso di quello, che intatto lo lascj.

VIII. Li veleni augmentano quasi sempre il moto peristaltico. Il sublimato è quel solo però, che uccide prima d' esser giunto agli intestini, e per conseguenza non arriva ad irritarli.

IX. Lo intestino retto può scaricarsi degli sccrementi senza l' aiuto de' muscoli addominali; concorrendo però quello del moto peristaltico, senza il quale, tal funzione non si eseguirebbe. Le forze della respirazione dipendono dalla volontà: Elleno però non farebbero: valevoli a procurare scarichi di ventre, fin che gl' intestini non

ci concorrono. Se viene irritato il retto per lo mezzo di un clisterio, tosto si vede nascer scarica di fecce.

X. Gl' intestini conservano la loro irritabilità, sebbene sieno staccati dal corpo: ella sembra anzi aumentarsi; nè l' abbandonano ancor quando sono eglino stati in molte porzioni divisi. L' irritabilità dunque, conchiude il Signor Haller, non dipende da quella proprietà che si chiama senso. L' anima di un uomo non sente niente di quello, che irrita gl' intestini, i quali non sono più parte del suo corpo.

XI. La forza movente degl' intestini, dura più di quella de' muscoli; è vero però, che il moto peristaltico de' primi non uguaglia la costanza di quella del cuore, o delle orecchiette, che si sono riempite d' aria. Gl' intestini la dureranno ad agitarli un' ora dopo la morte apparente dell' animale; ma il cuore pulsarà delle cinque, sette, ed anco delle dieci ore intere di più.

Quantunque il Signor Vandermonde dica aver giudicata inutil cosa, il riferire la lunga serie de' sperimenti, che si trovano nella memoria diaria del Signor Haller comprovanti tutti il moto peristaltico degl' intestini sì tenui, che grossi; io però seguendo le tracce del Signor Haller medesimo, il quale si protesta averla anzi creduta necessarissima, onde per essa vie più confermate rendere le sue diligentissime osservazioni, mi farò da capo a riferirle tutte, tra perchè non solo sono dirette al fine indicato, ma perchè possono sempre instruire, ed aprir campo ad altri, o a rifare le stesse sperienze, o ad intraprenderne di nuove, per riprovare, o confermate rendere le Halleriane con tanta accuratezza fatte. Li 14 Aprile dunque 1731. osservò in un Cane, che avea fatto bene mangiare, il moto peristaltico, che fu assai visibile, e vigoroso; agiva dal ventricolo al retto, e dal retto al ventricolo, facendo portare gli intestini dalla diritta alla sinistra, e dalla sinistra alla destra, con mutazion di luogo. In altro Cane, ed un Gatto alli sperimenti 390. 391. non si vide l' anzi detto intestinal moto. Nel Gatto dello sperimento susseguente, vide il cuore pulsare; ma il ventricolo, cogli intestini star fermi, nè muoversi irritati anco collo scalpello. Nello sperimento 393. fatto sovra un altro Gatto videsi il moto peristaltico agire con vigore, e costanza di basso in alto, e d' alto in basso; strignevansi gl' intestini, e dilatavansi ora in uno, ora in un altro luogo, di maniera, che quando contraevansi vicino al luogo contratto, si vedean ferme le materie, che contenevano, le quali formavano nodi, dissolventisi a misura, che la contrazione più o men presto si scioglieva. Allo sperimento 394. nel Coniglio su cui sparimentavasi, vide chiaramente il moto peristaltico, e come nell' antecedente gli intestini trasportavansi d' alto in basso, di basso in alto; alto indietro, in forma di spira, e in mille maniere si moveano: quello che accadeva ne' tenui, vedea farsi ne' grossi, ma con minor forza. Nel Cane delli 27 Febbrajo 1738. sperimento 395. il quale ben pascinto fu aperto tre ore dopo il mangiare; vidersi li vasi lat-

tei a meraviglia, non che il moto peristaltico, e sopra tutto lo strignimento delle fibre circolari degli intestini tenui. Colli sperimenti 396., 397. fatti in un Cane, ed un Gatto, vide il Signor Haller con piacere il moto peristaltico, per lo cui mezzo venivano innanzì spinte le materie, che in tempo di contrazione fermavansi, e gruppi facevano. Per lo contrario ne' cimenti 398. 399. avuti in due Cani, il moto peristaltico si vide sì; ma in languida maniera. Quantunque avesse cessato il cuore di vibrare nelle sperienze 400. 401. fatte sopra un Cane, ed un Gatto, non ostante seguì il moto degli intestini, ed in maniera, che levato affatto il cuore, tanto, e tanto non si fermò. Nel fatto delli 26 febbrajo 1746. sopra un Cane, il moto peristaltico comparve da se medesimo vigoroso, e forte, e ricompariva così alla più menoma irritazione tanto ne' sottili, quanto nel grosso intestino unico in questo animale, il quale è molto più lungo del retto nell' uomo, ma che gli si rassomiglia per la grossezza dello sue fibre longitudinali. Nelli sperimenti 403. 404. su due Cani avuti, dice, che il moto peristaltico era di modo apparente in questi due animali, che ora l' intestino tutto con la materia fecale rimontava verso lo stomaco, ed ora inferiormente scendendo, la materia accostavasi al retto. Aperse li 3 Aprile 1746. nel Cagnoletto allo sperimento 405. un intestino sottile, indi tagliollo. L' apertura da se medesima allargossi, ne andò guarì, che la forza delle sue fibre longitudinali rovesciò i labbri della ferita, la quale aprendosi più che mai, diede campo alla interior membrana velutata di farsi vedere tutta all' esterno. Nel Capretto al segno 406. il moto peristaltico ne' grossi intestini fu, come ne' tenui patente. Alla contrazion delle loro fibre muscolari, venivano spinti innanzì gli escrementi, che univansi in quella porzion d' intestino, che trovavasi essere immediatamente inferiore alla parte contratta. Aperto poi l' intestino, non solo si corrugò il taglio, ma la ferita spalancandosi, formò come una specie di bocca, li cui labbri enfiaronsi, e duri divennero, e la membrana velutata divenne esterna. Ciò posto, comprendesi abbastanza come questa membrana tanto umida, e viscosa com'è, possa attaccarsi al peritoneo, ed appiccature acquistarvi. Nel Gatto allo sperimento 407. vide chiarissimamente il moto peristaltico ne' gli intestini sottili, e nel colon, e vide che le fibre circolari strignendo l' intestino, formavano anelli di spacio in spacio. Porzion ne aperse, ed elleno si contrassero sotto il luogo dell' apertura, e come ne casi antecedenti formossi una bocca, i cui labbri andarono pur essi rovesciati, e s' indurirono. Nel Gatto similmente aperto li 27 Aprile 1747. sperimento 408., il moto peristaltico, non solo da se medesimo veder fecesi, ma coll' ajuto della irritazione ancora. Toccarvi per modo di esempio alcuni punti dello intestino col butirro d' antimonio: questi punti contraendosi, spingevano innanzì la materia fecale, la quale come nelle sperienze passate recavasi ad annodarsi verso il luogo irritato. Nello sperimento 409. fatto sopra un Coniglio, il moto peristaltico restringeva gl' intestini di distanza in distanza, per cui si facevano nodi, che venivano separati da non so quali strozzamenti, che riducevano il dia-

tro degli intestini ad una piccolissima proporzione. Poco dopo vedevasi agire la forza delle fibre longitudinali, che raccorciava attorno attorno le porzioni del budello, che trovavansi tra le contrazioni. Nel Cane poscia messo a cimento li 25 Novembre 1747, il moto peristaltico fu palese ne' grossi intestini, il quale quando veniva interdetto, richiamavasi facilmente per lo mezzo della irritazione. In altro Coniglio, allo sperimento 411. non altro fu fatto, che aprire il peritoneo per considerare il moto anzidetto, il quale tirava gl' intestini dalla destra alla sinistra, e viceversa. Eglino si moveano su, e giù, e con loro le materie che contenevano, di modo che, le medesime ora scendevano dallo stomaco al retto, ora dal retto allo stomaco, e questo moto antiperistaltico sembrava agire con più forza. Era più languido nel cieco, e negli altri grossi intestini, nè si strignevano, se non se, irritandoli. Il cieco era più grosso del ventricolo stesso, poco mobile, e pieno di una materia verde. Lo stomaco, e gl' intestini irritati, contraevansi ancora, quando il restante de' muscoli più non obbediva col moto allo irritamento, fenomeno mostrato eziandio da Mons. Felice, sperimento 1. pag. 25. La seguente osservazione cavata dal testè nominato Mons. Felice pag. medesima, mostra, che nel Coniglio su cui sperimentavasi, li moti peristaltico, ed anti-peristaltico si videro a maraviglia, ed era piacevole cosa mirare gl' intestini facenti cave strette ne' luoghi, ne' quali s' irritavano. Tratti dal basso Ventre continuaron a rimuoversi colla vivezza, colla quale si moveano nella loro naturale situazione, e non si fermarono di strisciarsi sulla tavola dove erano stati distesi, fin tanto che durò in loro il calore, e che il grasso non venne dal freddo rappigliato. Nell' altro Coniglio, che segue allo sperimento 413., non osservossi verun moto. Benì nel Cane delli 12 Gennaio 1750. gl' intestini sì tenui, che grossi videri agitati da differenti moti, e di spacio in spacio in maniera ristretti, che non restava più loro di cavità. Il duodeno pure non restò esente da questi moti, ed il retto senza l' ajuto de' muscoli addominali, perchè tolti via, si scaricò delle contenute fecce. Scoperto il peritoneo nel Cane posto al num. 415., e lasciandolo intatto, vide il Signor Haller a traverso di questa trasparente, e sottil membrana il moto peristaltico differentissimo da un altro moto, che il diaframma produce sulle viscere dell' addomine: questo sperimento, ed il seguente sono conformi a quelli di Mons. Felice pag. 30. 31. Nel Cane posto al numero 416. al quale erasi fatto prendere arsenico, il moto peristaltico degli intestini grossi fecesi vedere vigorosissimo di modo, che gli escrementi seguendo la contrazione delle sue fibre muscolari venivano quando spinti innanzi, quando tirati indietro. Una certa situazione dello intestino trovossi oltremisera stretta, a cagion di porzion d' arsenico ivi fermata, la quale veniva a servire come di causa prossima, e continente a tale strignimento. Nel Cane della osservazione 417. gl' intestini tenui, quantunoue coperti dall' omento, e contenenti fecce, furono trovati muoversi benissimo. Gl' intestini del Gatto, che servi allo sperimento 418. aveano un non so che di duro, e di secco per cui non così agevolmente si moveano: irritati però collo scalpello, diedero segno

di contrazione sì, ma meno viva, che ne' Cani. Un ora intera dopo la visibil morte del Gatto, che fa il soggetto dell' osservazione 119., dopo la total perdita d' ogni sensazione, e finalmente dopo ch' ebbe cessato il cuor di vibrare, continuò non ostante il moto peristaltico con tutta vivezza, e solo che, quando s' illanguidiva, s' irritassero gl' intestini con agente chimico o meccanico, tornavasi ad eccitare senza alcuna difficoltà: il ceco di questo animale, che rispetto a quello d' altri è più corto, e più curvo, corrugavasi pur anco, quando s' irritava: Tagliò il Signor Haller in tale occasione porzion del tubo intestinale, e vide nascere lo stesso rovesciamento, che fu più sopra notato; circostanza che fece, che la parte dell' intestino la più vicina alla ferita, restasse non solo compresa nella parte interna dell' intestino la più prossima, ma venisse determinata verso la ferita una materia gialla, scbiuosa, e biliosa; nè è cosa nuova, perciocchè fu tale fenomeno osservato eziandio da Mons. Zimmerman pag. 49. Nell' altro Gatto allo sperimento 420., il moto peristaltico durar videsi più lungo tempo di quello del cuore: aperta per mezzo porzion d' intestino, i labbri si rovesciarono, e come spremuta fuori della ferita, saltò scbiuosa materia, e biliosa. Nel Gatto parimente della 421. osservazione che segue, il moto peristaltico durò pur esso più di quello del cuore. Fu però piacevole l' osservare, che fece il degno sperimentatore, il moto delle fibre longitudinali, le quali, quando raccorciavano l' intestino, divenivano, come le precedenti più visibili. Niente di nuovo non avvi nella speranza del Cane al num. 422., imperocchè, quanto al moto, durò nella stessa maniera, che durò ne' due animali antecedenti; e quanto all' apertura, che fece in porzion del tubo intestinale, mandò pur essa nel rovesciamento de' labbri della ferita, materia scbiuosa, e biliosa. Nel Topo allo sperimento 423., il cieco, che in questo animale è grandissimo, e più grosso dello stomaco medesimo, fu trovato avere visibilissimo il suo moto peristaltico. Nell' altro alla speranza 424., irritata porzion d' intestino col butirro d' antimonio, si strinse in maniera, che sembrava essere stata da un filo legato: le fecce che da questa contrazione erano state mosse, dilatarono la parte inferiore dell' intestino più al luogo contratto vicina, le quali messe indi in moto, parte si videro determinate verso il ventricolo, e parte verso il retto. Quelle che con moto contrario si determinarono all' alto, incontraron nel loro cammino la resistenza cagionata nel tubo dall' azione dello agente chimico, di modo che non poterono passare: ciò non pertanto in questo animale il moto peristaltico durò anch' esso più lungo tempo di quello del cuore. Nella Cagna delli 14. Dicembre 1750. alla speranza 425., aperta dal Signor Haller porzion d' intestino, introdusse nella sua cavità un proporzionato cilindro inzuppato per tutto d' olio di vetriolo, e con ciò toccando la membrana velutata, vide subito l' intestino contraersi violentemente nel luogo toccato, e mandar fuori per la ferita materia scbiuosa: un cotal moto durò non poco. Da lì a non molto poi, i labbri della ferita si raggrinzarono, e rovesciaronsi di modo, che la parte superiore montando sopra l' intestino, vennero come a racchiu-

dere, e l' inferiore discendendo, tornò a sprigionar l' intestino. Restò nella ferita una specie di bocca contornata di labbri grossi, e gonfi, e la parte superior del budello scendendo ne' labbri inferiori della ferita, vi si cacciò dentro. Nel Riccio della osservazione 426. gl' intestini irritati si contrassero trasversalmente con molto di forza. E nella Cornacchia della 427. il moto degli intestini fu più durevole di quello del cuore, e de' muscoli: non cessava ancora, che le carni de' muscoli irritate, più non si contraevano. Nel Gatto al num. 428. l' intestin retto per ragion di naturale contrazione, dopo la sua morte evidente, scaricossi degli escrementi, che conteneva; e parimente un ora dopo quella, il moto delle sue fibre longitudinali continuò a farsi vedere con molta vivacità, e durò più di quello del cuore. Cinque minuti più del cuore medesimo fu pure costante il moto peristaltico nel Coniglio al num. 429. Non solo ne' tenui, ma ne' grossi ancora fu vivace il moto peristaltico nel Capretto allo sperimento 430. Al 431. poi dice il Signor Haller, che in una Capra trovò assai forte il moto degl' intestini tutti, nè di tale energia l' avea mai più in altro animale trovato. Per una cosa che di rado succede, videsi nel Sorcio delli 20. Aprile al num. 432. durar meno il moto degl' intestini di quello dello stomaco. Nel Capretto dell' osservazione seguente il moto peristaltico, non che il rovesciamento del budello tagliato, furono evidentissimi. Nelle tre Ranocchie poi messe a cimento dopo, e che furono il soggetto dello sperimento 434., il moto peristaltico, che in questo animale è poco manifesto, pure col mezzo dello irritamento restò svegliato per un ora intera. Curioso fenomeno successe nel Gatto delli 29. Maggio, sperimento 435. ed è, che divennero tutti gl' intestini suoi stretti e duri, simili a' vermi di terra, e costantemente la durarono così anche dopo, che il cuore ebbe cessato di pulsare, di modo che il retto scaricossi de' suoi escrementi senza l' aiuto de' muscoli del basso ventre, i quali erano stati levati. L' intestino della Ranocchia su cui fecesi lo sperimento 436. comparve celluloso al principio, nè tale cellulosità poteva essere, che una conseguenza de' nodi separati da varj strozzamenti; cessati, i quali, l' intestino divenne a un tratto un cilindro uniforme. Nel Gatto della sperienza 437., non ostante che il cuore avesse cessato interamente di muoversi, il moto peristaltico, ed il rivoltamento de' labbri della ferita fatta all' intestino, continuarono a farsi vedere. Nell' altro animale simile, del quale se ne fece uso per lo sperimento 438., il moto peristaltico fu violento in tutto il tubo intestinale. Dopo la morte del Capretto preteso ermafrodito, che servì al cimento 439., nel quale sebbene avea cessato il cuore di vibrare, non ostante a traverso del peritoneo vedeaasi ancora il moto peristaltico; il retto nello scaricarsi dell' aria, della quale era pieno, spinse fuori fecce tonde, e nere; nel qual tempo si videro pur anco altri escrementi cacciati innanzi nella cavità del retto. Nel Capretto delli 16 Giugno posto alla osservazione 440. videsi pur anco a traverso del peritoneo il moto degl' intestini, dopo che il cuore non pulsava più. Allo sperimento 441. nella Ranocchia sulla quale sperimentavasi, fu trovato il moto peristaltico

ristaltico vigorosissimo, quantunque nella spezie delle costoro bestiuole ap-
 pajia ordinariamente languido: come si rinvenne molto vivo negl' inte-
 stini dell' Anguilla, che fu il soggetto della sperienza susseguente, co-
 mechè sia un animale flemmatico, e poco irritabile. Nel Gatto delli 3
 Settembre esperimento 443. a cui erasi fatto inghiottire sublimato, il
 moto peristaltico estremamente animato, fece scuotere gl' intestini d' alto
 in basso, e di basso in alto, a cagion della contrazione ora delle fibre
 longitudinali, ora delle trasversali: l' alcohol produsse pur esso una con-
 trazion nello intestino, il cui moto durò assai più di quello del cuore.
 Questo stesso fenomeno fu pure osservato da Mons. Sproegel nello speri-
 mento 26. Mostra lo Sperimento 444. fatto sovra un Cane cui erasi fat-
 to inghiottire non so quale porzion d' oppio, che non solo la pelle del
 corpo restò priva di sensitività, ma fino gl' intestini medesimi della loro
 irritabilità, sia che s' irritassero esteriormente, o si applicasse stimolo al-
 la loro superficie interna. All' opposto, nel Gatto, che servì alla spe-
 rienza seguente, quantunque mostrasse stupidità per ragione dell' oppio
 preso, non di meno irritati gl' intestini, non lasciarono di contraersi, e
 il movimento loro durò più lunga pezza di quello del cuore. Un simi-
 le sperimento lo ha Mons. Sproegel al num. 15. Nella Ranocchia, della
 quale servivsi per l' osservazione 446., ed a cui erasi fatti prendere 10
 granelli d' oppio, non fu sensibile il moto peristaltico, e fino i nervi me-
 desimi irritati, non produssero alcun moto: anche questo sperimento sembra
 del po' anzi accennato autore. In altra Ranocchia mò, se l' effetto
 dell' oppio annientò l' irritabilità de' nervi, non suppressse del tutto il
 moto peristaltico. Al Cane delli 4 Ottobre esperimento 448. cui fecesi
 prendere due scrupoli di sublimato, che gli tolser la vita quasi repente,
 non fu ritrovato alcun moto peristaltico. Pel contrario al Gatto dello
 sperimento seguente al quale erasi dato del cobold, il moto peristaltico fu de'
 più violenti. Nel Cane dello sperimento 450. cui erasi prima di porlo
 al cimento fatto inghiottire Arsenico, il moto degl' intestini fu patente
 e senza irritazione, se non che, dopo, che fu toccato col veleno acido,
 divennero eglino nello stesso tempo e più corti, e più stretti. Aperto po-
 scia porzion d' uno, e toccata internamente la membrana velutata collo
 spirito di nitro dolce nella sua superior parte, si contrasse l' intestino,
 ed uscì come spremuta dalla contrazione medesima una materia giallastra
 e schiumosa, la quale veniva riasorbita poco dopo in tempo dell' abbre-
 viazione, e ternata a spigner fuori in quello della sua corrugazione;
 questo fenomeno non è nuovo, perchè Mons. Sproegel l' avea pur esso os-
 servato. Nell' altro Cane poi, cui era stato, come per forza, fatto in-
 ghiottire oppio; siccome era divenuto come stupido, quindi è, che il mo-
 to peristaltico non si vide. Aperto il duodeno, fu rilevato, che il moto
 del ventricolo, il quale rimontava nella espirazione, scoteva quest' or-
 gano in maniera, che faceane uscire la bile. Fu però riferito al Signor
 Haller, che il moto degl' intestini erasi fatto vedere, dopo ch' egli fu
 partito dal teatro anatomico, nel quale sperimentavasi. Convien dire,
 che l' oppio istupidisca ogni sensibil parte; imperocchè li due Cani, alla

spe-

sperienze 452. 453., allì quali erasi fatto prendere oppio; non solo non sentivano le punture, che facevansi loro alla cute, ma non aveano moto alcuno agli intestini. L' irritazione però de' nervi produsse le convulsioni, che in tale circostanza sogliono farsi vedere ne' muscoli, non che al diaframma. L' Autore degnissimo di queste osservazioni non vide per altro, che il primo di questi Cani. Nel Consiglio delli 18. Ottobre al numero 454., al quale era stato fatto inghiottire da Mons. Sproegel veleno sublimato, il moto peristaltico fu de' più vivaci sopra tutto ne' gracili. Fu osservato dal Signor Haller in questo animale cbiarissimamente il meccanismo della introsuscezione, che farsi a minor diametro riducendosi una porzion d' intestino in tutta la sua lunghezza, la quale viene poi ricevuta nello intestino il più vicino, che a quel tempo trovassi in istato di dilatazione. Questa porzione però agevolmente si libera dal cavo intestinale da cui è contenuta, e le nodosità senza pena vanno scioglendosi. Fu pure veduto in questo animale il moto peristaltico nel ceco, il quale formava una linea spinale. Nel Cane poi seguente, cui parimenti dal testè ricordato Mons. Sproegel erasi fatto prendere del cobold, i moti peristaltico, ed anti-peristaltico, che ne' suoi intestini si videro, che erano infiammatissimi, furono de' più vigorosi, e forti. Per lo contrario nel Consiglio allo sperimento 456. che avea preso oppio, il detto moto agli intestini non si osservò da principio; aperto poi il peritoneo, a poco a poco si andò suscitando, e regnò più che in altri, nella estensione de' gracili, e in quella dello intestino cellulare. Il Cane delli 18. Novembre al cimento 457. per ragione della forza colla quale, aperto il basso ventre, moveasi il retto, vennero spinte fuori le fecce che conteneva. Non così accadere si vide nell' altro al 158. nel quale niun moto peristaltico venne osservato, per cagione probabilmente dell' oppio, che eragli si fatto prendere, il quale dissipato l' avea. Al Cane, che ai due primi pel terzo successe, furono tratti dalla pancia gl' intestini nel mentre che moriva, ed in non so qual luogo aperti; e quantunque fossero dal loro tutto separati, li labbri della ferita si rotolarono, formossi una gran bocca, e mossi dal moto peristaltico, strisciavansi sulla tavola, su cui erano distesi. Tornò il Signor Haller a levare dalla pancia del Cane alla speranza 460. li 31. Gennaio 1752. gl' intestini tutti, e partilli in quattro parti ammucebate. Ciò fatto, osservò, che i quattro termini degli intestini del corpo separati, e divisi, conservarono benissimo senz'essere irritati il moto peristaltico: Quando in seguito poi lo furono, si videro contrarre nello stesso modo, che avrebbero fatto uniti al suo tutto, e nella situazion loro naturale. La medesima speranza fu ripetuta su due Cagnolini, che fanno le osservazioni 461., e 462. negli intestini de' quali tratti dal ventre loro, e in quattro pezzi tagliati, o partitamente ammontati, succedero gli stessi fenomeni: quello che sopra più si aggiugne è, che in questi più presto le piccole porzioni d' intestino si raffreddarono, e per conseguenza senza moto restarono. Così pure accadette vedere nel Cane della speranza 463., nel cui cimento nè più, nè meno si osservò, di quello si osservasse nelle sperienze 460, 461, e

462.; tali sperimenti sono simili al 53. di Mons. Sproegel. Rispetto poi al Cane posto al numero 464.; in questo, il moto peristaltico durò più lungo tempo di quello del cuore. Nelle due Ranocchie, che fanno il soggetto della sperienza 465. fu veduto più di una volta il moto peristaltico con tanta evidenza, con quanta si osserva negli animali a sangue caldo. La medesima cosa fu osservata nelle altre due Ranocchie delli 6. Agosto, e 23 Settembre 1752. sperimenti 466., 467. con di più il fenomeno delle introsuscezioni, le quali formate scioglievansi in appresso. Nell' anno 1754. a' 25 Settembre cimento 468. cavarono dal petto ad una Ranocchia il cuore, nel quale 15 minuti dopo videro durare il moto peristaltico. Mettendo dunque a computo la lunga serie de' sperimenti, che sul proposto argomento ha voluto il Signor Haller lasciare notati, ed a me è piaciuto voler riferiti, trovo, che 34. sono stati celebrati in Cani di varia età, e genere, 18. in Gatti, 8. in Conigli, 5. in Capretti compresi una Capra, pressochè 16. in Ranocchie, 3. in Topi, una in un Riccio, e finalmente l' ultime due in un Anguilla, e in un Corvo. Mons. Zinn con altre posteriori, e nuove sperienze fatte in animali a sangue caldo, non solo concorre a stabilire le cose notate dal Signor Haller intorno al moto peristaltico degli intestini; ma ancora a mostrar la costanza di quello del cuore dopo che le budella più non si muovono. Dagli ingiunti corelarj, che si trovano appunto trascurati da quelli del Signor Haller, tutt' altro si rileverà, ch' io, per non moltiplicar parole senza necessità, tralascio.

Sul moto del Cuore.

IL Signor Haller ha osservato, che il cuore di un gatto continuava le sue pulsazioni, non solo dopo che fu cessato il moto peristaltico degl' intestini, ma eziandio a petto aperto, e spalancato. Ha veduto la punta del cuore accostarsi alla sua base, ed è restato sorpreso, come s'abbiano potute formar dispute sopra un punto, che gli ha paruto così chiaro. Ha contemplato per più di due ore il moto del cuore di un altro gatto; le due orecchiette si contraevano ad una volta, e presso a poco li due ventricoli agivano nello stesso tempo come facevano le orecchiette. Il ventricolo sinistro fu il primo a perdere il moto, indi il destro. Le orecchiette continuavano non ostante a muoversi; elleno palpitavano più volte, prima che il cuore potesse fare una sola pulsazione. L' orecchietta sinistra restò immobile qualche tempo dopo, nel mentre che l' orecchietta destra, e la vena cava palpitavano ancora. La parte di questa orecchietta, la quale è più prossima alla vena cava, fu quella che conservò più costantemente il suo moto; ed intanto, che li ventricoli si raccorciavano, la loro punta, si alzava alcun poco.

E' cosa certa, e sincera, secondo l' opinione del Signor Haller; che il cuore si raccorcia durante la sua contrazione, e ch' egli si distende

stende, e si allunga in tempo del suo rallentamento. E' indubitato ancora, dice egli, e lo mostra con cento sperienze, che la carne del cuore non divien palida nella sua azione.

Il Signor Haller ha tagliata ad un gatto la punta del suo cuore, il quale trovavasi in contrazione, ed ha distintissimamente veduti li due ventricoli contrarsi in un medesimo tempo. Il nostro infaticabile osservatore tanto benemerito alla Repubblica Medica-anatomica ha legate le vene del cuore di un cane, senza che il cuore abbia cessato di contraersi. Ha toccato colla punta di un ferro, non che con veleno la punta, e la base del cuore, e le parti ancora, che erano tra l'una, e l'altra, ed ha trovato l'irritabilità essere generale. Ha provato in seguito, se la legatura delle due cave togliesse al cuore di muoversi, come dal Bartolini è stato assicurato; ma non ha questo effetto prodotto. Ha osservato di più; che in una infinità d'animali il cuore sorte dal petto, e sporge innanzi con violenza in tempo della espirazione; e che è attratto, ritirato indietro, ed abbasso quando l'animale inspira. E per maggior chiarezza del fin qui detto, eccovi li differenti corolarj, che il Signor Haller cava da tutti li numerosi fatti, e dalle varie sperienze che ha egli fatte sopra il cuore:

I. Il moto del cuore dura, e persiste nel tempo, che il resto del corpo animale ha perduto il calore, ed il moto. Non avvi muscolo nel corpo animale, il cui moto sia così costante, quanto quello del cuore. Continua per dieci ore intere dopo la morte apparente, o dopo che il senso, ed il moto volontario sono cessati. Il moto del cuore è sempre più durevole di quello degl' intestini; imperocchè, nè il troncamento della testa, nè la separazione della spina, nè lo strappamento del cuore medesimo dal petto, arrivano a supprimere il suo moto. Sembra, che l'esperienze del Signor Haller stabiliscano una gradazione osservata nella irritabilità delle parti del corpo animale. Le più irritabili, sono quelle, il moto delle quali falsi da loro medesime, senza irritazione. Le meno irritabili, sono quelle, che non si muovono, e non adoperano, se non se, con uno stimolo. Nella prima classe si comprendono le parti, che incessantemente si muovono, ed agiscono; nell'altra, quella che nella azione loro hanno degli intervalli, e sono meno irritabili. Eccovi dunque la gradazione, secondo la quale si hanno a locare le parti del corpo animale le più suscettibili di moto, quali sono, il cuore, gl'intestini, lo stomaco, ed il restante de' muscoli.

II. Il moto del cuore è provocato, e trattenuto dallo stimolo del sangue venoso. Legando le vene cave, ed irritando il cuore, si vedono infiacchiti i suoi moti. E' questa è la ragion principale della costanza, che mostra l'orecchietta destra nel suo moto. La vena cava le fornisce del sangue nel tempo, che il polmone non ne lascia più passare all'orecchietta, ed al ventricolo sinistro. La parte medesima dell'orecchietta, il cui moto conservasi più lungo tempo,

po, è quella che tocca la vena cava, e che ne riceve le ultime impressioni. Gli è ancora per questa ragione, che l'aria soffiata nella vena cava inferiore, è la più potente di tutte le cause, per lo cui mezzo puossi richiamare, e risvegliare l'estinto moto del cuore, e ch'ella sola adopera ancora, quando tutte le altre irritazioni sono arrivate a non potere più nulla. Gli è parimente per la medesima ragione, che l'esperienza di Mons. Hooke ha bisogno di spiegazione. Risvegliasi il suppresso moto del cuore soffiando aria, per la trachea arteria, o facendo passar sangue, e qualche volta dell'aria medesima nel ventricolo sinistro. La stessa teoria è confermata dalle sperienze, che io ho fatte, dice il Signor Haller, per levare al ventricolo destro, ed all'orecchietta corrispondente la virtù, e forza di conservare più lungo tempo il loro moto. Per ciò non è stato mestieri, che di levare alla cavità della parte destra lo stimolo del sangue, e determinarlo alla cavità della sinistra; ne è stato malagevole il pervenirvi, aprendo, e legando le vene cave; aprendo l'arteria polmonare, e vuotando pel suo mezzo il ventricolo destro, e la sua orecchietta, nel tempo, che la legatura dell'aorta racchiude, e contiene il sangue nel ventricolo, e nell'orecchietta sinistra. Da ciò viene eziandio, che la punta del cuore non è l'ultima parte vivente, perchè è quella, nella quale si vanno a raccogliere, e ad ammassare le ultime gocce del sangue. Il cuore da per tutto è irritabile; e se qualche d'una delle sue parti gode qualche vantaggio, sembra appartenere all'orecchietta destra.

III. Siccome il moto del cuore dura, e persiste anche dopo, che si è tagliata, e troncata la testa all'animale, o che gli si è levata la spinale midolla; e siccome ciò non ostante il Signor Haller non ha giammai osservato, che il moto del cuore fosse mantenuto, ed affrettato dalle irritazioni de' nervi, che queste irritazioni fossero capaci di richiamarlo estinto che fosse; quindi è che sembra ancora, che possasi conchiudere da queste sperienze, che il moto de' muscoli non dipende unicamente dalla influenza de' nervi, nè dalla loro continuità non interrotta dal cervello fino alli muscoli, ne' quali vanno a diramarsi, e ad insensibilmente perdersi. Pare per lo contrario che siavi ne' muscoli medesimi una irritabilità, che loro appartenga come in proprietà, la quale trovasi fortissima ne' muscoli vitali.

IV. Puossi cavare dagli esperimenti fin qui descritti, e rapportati, alcuni corollari, per far vedere la maniera, colla quale il cuore cessa interamente da' suoi movimenti. Pare per modo di esempio, che le orecchiette agiscono nello stesso momento; che li due ventricoli facciano lo stesso; e che il momento dell'azione delle orecchiette preceda il momento dell'azione de' ventricoli.

V. E' bastevolmente dimostrato dalla perfetta conformità di tante sperienze, che la punta del cuore si accosta alla base, e che viceversa questa scende ad approssimarsi alla punta; il perchè non ci dovrebbe più su questo essere controversia alcuna.

VI. Nè il cuore; nè li muscoli perdono di colore, e divengono palidi in tempo della loro contrazione. Il calore che fu osservato dall' Harveo; non proviene dallo scarico del sangue, che contenevano i piccoli vassellini delle carni del cuore: viene dalla uscita, e dallo scarico di quello, il quale riempiva la cavità delle orecchiette, e de' ventricoli.

VII. Il rallentamento del cuore, non consiste nell' azione naturale di un piano, o di una parte delle sue fibre: perchè il cuore in istato di riposo; o a meglio dire il cuore privo di vita, resta nello stato medesimo, nel quale si è egli posto nella diastole. alcun muscolo non agisce in questo stato di morte, e la disposizione del cuore, che domina nella diastole, non ha mestieri di muscolo per rifarsi da capo.

VIII. Le arterie coronarie si riempiono nel tempo medesimo, che riempiesi il rimanente delle arterie, ed il sangue da lor n' esce con più vivacità nel tempo in cui trovasi il cuore nella sua sistole.

IX. Le valvole non chiudono tanto esattamente gli additi del cuore, per cui non solamente l' orecchietta destra riempie le due vene cave; ma il Signor Haller ha veduto il sangue rientrare dall' aorta nel cuore, e dal cuore nell' orecchietta.

X. Il cuore si contrae con vivacità, di maniera, che tutta la forza della mano basterebbe appena per far resistenza a quello di un piccolo animale, nè dee cadere in dubbio, ch' egli non sollevasse un peso di più libbre. Non puossi però dire, che stringa fortemente il dito introdotto nella sua cavità; ed il sangue non esce che lentamente, quando gli si è tagliata la punta.

Sebbene confessi il chiarissimo Hallero, che tra la lunga serie delle sperienze ch' ei registra per lo stabilimento del suo sistema intorno al moto del cuore, siavene alcuna, che sappia, anzichè nò, di superfluo; pure niuna rigetta, tutte le pone, perchè dice aver conosciuto, che la molteplicità de' fatti, anzichè scemare, accresce la forza alle induzioni, e sempre che l' uopo il voglia, serve a persuadere i dubbiosi, e d' arme per combattere le obbiezioni, che contro loro si facessero. Nè io pure per questa medesima ragione dovrò venire biasimato, se le trascriverò tali quali le trovo; imperocchè, come ho più volte detto così mi è piaciuto di fare, non solo per rendere a tutti comuni così rilevanti fatti; ma per non tradire l' intenzione del loro Autore, che ha voluto mostrare con candidezza quanto su ciò gli è succeduto.

E senza più dunque, nello sperimento 469. avuto sopra un Gatto li 29 Aprile 1731. dice, che quantunque il moto peristaltico punto non si palesasse, non di meno il cuore a petto aperto non lasciò di vibrare; nel qual caso vide la punta accostarsi alla base, stupendosi come in una cosa tanto evidente si fossero potuto aver dispute, e contrasti.

In altro Gatto al num. 470. cui aperse il petto, ed il pericardio, considerando il moto del cuore, vide le due orecchiette contrarsi ad un tempo

po stesso con una specie di scossa, e con tale velocità, che lasciava appena il mezzo all' osservatore di distinguere il tempo della replezione loro, e della loro inanizione. Appresso il moto delle medesime dice, che quello seguiva de' ventricoli, e che il tempo, che passava dall' una di queste contrazioni all' altra, era assai lungo, per cui facilmente si perdeva. Contraevansi eglino insieme, ed accostarvansi, quantunque poco, alla punta: che il moto de' ventricoli avea una non so quale forza, che respingeva la mano, e che non gli fu difficile il vedere per lungo tratto la successione delle sue differenti parti. Aperse finalmente il cuore per la punta, e vide l' orecchietta destra gettar sangue assai nero, e fluido nel ventricolo, che ogni sforzo facea per isgravarsi di questo sangue.

Nel Gatto parimente delli 14 Giugno anno notato, che fu il soggetto della sperienza 471. tornò a vedere li due ventricoli contrarsi a un tempo stesso, e in certo tal qual modo indurirsi; il cuor battere nel mentre che il resto del corpo aveva perduto e moto, e senso. Tagliò poi la punta del cuore, aprendo in uno stesso tempo li due ventricoli; quale fatto, osservò l' uno e l' altro corrugarsi, e far uscire nel momento medesimo il sangue, che conteneva. Con tutto ciò il moto del ventricolo destro durò più lunga pezza di quello del sinistro.

Nel Coniglio allo sperimento 472., quantunque il corpo fosse senza lena, e senso; non di meno continuò il cuore a pulsare con forza.

Nella Cagna pregnante, che servì al cimento 473. in Febbrajo 1738. nel cuor della quale era stata aria soffiata pel condotto toracico dal suo celebre collega Monf. Holmann, il moto della vena cava superiore, e dell' orecchietta destra fu visibilissimo a differenza di quello della cava inferiore, che comparve men bene. In oltre osservò la contrazion dell' orecchietta esser seguita da lungi da una contrazione, men forte del ventricolo. E quantunque il cuore propriamente detto avesse cessato affatto di vibrare, non ostante l' orecchietta destra durò sette ore intere dopo la morte apparente dello animale a muoversi a quando a quando sì, ma con forza; nel qual tempo lunga pezza era, che gl' intestini aveano finito di dar segno di moto. Volle pure osservare, qual fosse la parte della medesima, la quale desse fine alle durevoli oscillazioni; e vide essere la sua punta detta culo di sacco; nè fu maraviglia, perchè l' aria soffiata, fu quella che mantenne in essa orecchietta il moto dalla sua forza eccitato. L' acqua che vi s' era dentro schizzettata nulla vi fece.

Nel Gatto delli 5 Maggio osservazione 474. per lo spazio di due ore, e più, stette contemplando il moto del cuore; e parimente vide contrarsi a una volta le due orecchiette, e poco dopo nella stessa stesissima maniera li due ventricoli, il primo de' quali a fermarsi fu il sinistro, poi il destro. L' orecchiette però continuarono non ostante a palpitare, e più volte il facevano prima, che il cuore una sola pulsazione fare potesse. L' orecchietta sinistra restò immota per qualche tempo, nel mentre che la destra, e la vena cava palparono ancora. La parte che in questa orecchietta conservò più tempo il moto, fu la più

vicina alla vena cava. Nel tempo della corrugazion de' ventricoli, la loro punta alzavasi un poco, e la ragione si è, perchè le valvole non resistendo troppo al ritorno del sangue, mestieri fu, che venisse compresso il ventricolo, e in conseguenza riempita l' orecchietta: quanto al calore del cuore, niente s' ebbe di mutazione.

Similmente nel Gatto delli 22 Giugno cimento 475. il cuore continuò per lungo tempo a vibrare, in tempo della cui azione, vide il dotto Hallero l' uno, e l' altro ventricolo approssimarsi al loro framezzo; quando l' animale fu più vicino a morire, la vena cava ciò non ostante continuò le sue pulsazioni, ed il sangue che ad essa veniva mandato dall' orecchietta destra, serviva ad irritarla. Ciò osservato, tagliò la punta del cuore, e vide questo muscolo non contrarsi che languidamente, sebbene l' orecchietta pulsasse ancora con molta energia.

Nello sperimento 476. avuto sopra un Cane li 14 Settembre, gonfiò il polmone, e vide il cuore alzarsi con lui, e divenire più perpendicolare, ciò che fece, che la sua punta trovasse allora precisamente sotto la base. Essendo poi morto lo animale, osservò su la superficie del cuore più centri di contrazione, attorno de' quali le fibre palpitavano: questi punti prendendo maggior estensione, riunironsi per produrre un tremore generale nel ventricolo: tornato a gonfiare il polmone, il cuore riprese il suo moto; ma niente d' aria passò nel ventricolo sinistro.

Nel Cane dell' osservazione 477. li 21 Luglio 1745. l' azione del cuore era debole, quando il Signor Haller cominciò a far la sua ispezione. Non di meno osservò le frequenti, e quasi incessanti contrazioni della orecchietta destra, la quale ciò non ostante non poteva arrivare a vuotarsi: il cuore si concentrava un poco, nella cui azione diveniva più corto; ciò che era cagione, che le sue carni s' increpessero in qualche maniera; in tempo della sua contrazione, vide scendere, ed abbassarsi la punta dell' orecchietta suddetta.

Nel Gatto, che servì allo sperimento 478. li 9. Agosto, vide benissimo il moto sincronico delle due orecchiette, che era similmente seguito dal moto sincronico dei due ventricoli; nella irritazione, la punta facevasi più ottusa, e breve. Agevolmente rianimar puossi, dice egli, la insiaccibita azione del cuore, soffiando aria per la trachea, e più vivamente ancora per la vena cava addominale. Osservò pure il ritorno del sangue dell' orecchietta destra nella vena cava.

Sulle due Ranocchie, delle quali si fece uso ne' sperimenti 479. 480. li 11. Agosto, vide il moto della vena cava, che è il primo a farsi in questi animali, venir seguito da quello dell' orecchietta, la cui parte destra e la prima a contrarsi, indi la sinistra, che spigne nel ventricolo l' aria che vi si è soffiata. Vide il moto del cuore non venire turbato, ed impedito dal troncamento della testa; e batter costante l' orecchietta destra, sebben fiasse tagliato il ventricolo, ed ella sia restata sola nel corpo. Osservò pure, che un tal cuore sì mal concio, e staccato dalla sua orecchietta, e posto sopra una tavola, continuò per nove ore a battere;

re; moto forse che con costanza in esso mantenuto venne, per cagione dell'aria, che vi avea fatto soffiare dentro per la ferita.

Nel Cane delle 26. Febbrajo 1746. posto allo sperimento 481. la vibrazion delle orecchiette prevenne quella del cuore, la cui punta in tempo della contrazione si fa più corta ascendendo verso la base, od increspasi sopra tutta la sua superficie. La base anzi detta non si rimosse punto in questa sperienza, nè si corrugò. E' cosa evidentissima, che lo stato della diastole del cuore, è quello, che è più durevole, quando una tale viscera trovasi totalmente senza moto. Ciò non ostante osservò il Signor Haller un ora intera la pulsazione della medesima.

Nell' altro Cane delli 8 Marzo, osservazione 482. vide ascendere il sangue per la vena cava inferiore, ed empire l'orecchietta destra, la quale per ciò si contrasse, e mandò sangue alla cava superiore: il solo ventricolo destro conservò il suo moto, immobil restando il sinistro, e la sua orecchietta, e la sua punta detta fondo del sacco s' increspò, e raccorciossi nella sua azione. Non vide farsi alcun cambiamento, quanto al colore, nè nel cuore medesimo, nè nel diaframma in tempo della loro contrazione. Vedendo il cuore quasi senza moto, fece lo sperimento di Mons. Kooke, richiamando così il moto nella vital viscera, men però bene di quello accada soffiando aria per la vena cava addominale. Avendo con ciò ricominciato a vibrare l'orecchietta destra, fu per lui agevole il vedere ascendere poi il moto al frammezzo comune alle due orecchiette, e spignere il sangue, e nella vena cava superiore, e nel fondo del sacco dell'orecchietta, che continuò a muoversi per due ore intere.

Collo sperimento al num. 483. fatto sopra un Cane li 31 Marzo non altro mostra esser cosa certa, che il cuore si raccorcia nella sua contrazione, e che si allunga ed estende nel suo rallentamento; che da questa, e da cento altre sperienze resta certo, che la detta viscera non impallidisce nella sua azione; e finalmente che sempre si richiama il moto in quest'organo soffiando aria per la vena cava.

Nel Capretto, che servì alla sperienza 484. li 7 Aprile trovò il cuore aver la sua punta oltre il dover lunga, ed acuta; nè fu difficile l'osservare il suo raccorciamento mentre vibrava, e lo tincepsarsi senza impallidire; trovò pur anco acqua nella sacca del pericardio, aperta il quale vide anco una volta sulla superficie del cuore, più non avente moto nella sua totalità, alcune ambulanti palpitazioni, che aveano i loro particolari centri, dintorno a' quali le fibre carnose si contraevano, e rilasciavano alternativamente.

Nel Gatto, che aprissi nello sperimento 485. il cuore con tale energia pulsava, che in una vibrazione respinse il dito, che gli s'era applicato: troncata la punta, e per quest'apertura guardando nella cavità de' due ventricoli, vide distintamente, che entrambi si contraevano a un tempo, ed a un tempo stesso del sangue loro si scaricavano. Nello stato però in che trovavasi questo cuore, una tale azione facevasi languissimamente.

Toccando il cuore del Gatto, su cui si cimentò alla speranza 486. col butirro d'antimonio, ne risultò una spezie di cavo piano, dal quale veniva separato il ventricolo destro dalla sua orecchietta, e che scavò profondamente le carni di quest'organo dappertutto, donde aveva col veleno toccato.

Non altro mostra la speranza al num. 487. fatta sopra una Ranocchia, se non che, esser vero, che l'orecchietta del cuore di tale animale trovavasi rossa in istato di pienezza, e pallida in quello di contrazione. La medesima cosa s'ha a dire di tutto il cuore, imperciocchè divien rosso quando è pieno, impalidisce, quando si vuota. Tale osservazione non è nuova, avendolo un tale fenomeno osservato fino al suo tempo Harveo, che lo estese pur anco agli animali a sangue caldo.

Per vedere se veramente il cuor cessasse di vibrare, legar volle nello sperimento 488. fatto sopra un Cane le vene; ma non cessò punto; imperocchè troppa è la forza colla quale l'orecchietta destra manda fuori il suo sangue.

Quantunque il cuore del Gatto alla speranza 489. avesse del tutto cessato di muoversi, non di meno toccollo il Signor Haller coll'olio di verriuolo, e con tale mezzo risvegliò in esso il moto; così successe rispetto all'orecchietta. Perduto pur anco questo forestier moto, tornò a farlo muovere per lo mezzo dell'aria, che dentro vi soffiò. Cessato per la terza volta di muoversi, più non fu mezzo di ritornarlo ad azione, irritassesi per fino la spinale midolla.

Questa osservazione al num. 490. fatta sopra il cuor d'un Gatto, differisce dall'altre tutte; imperocchè mostra, che il cuore puossi richiamare a moto colla irritazione dello scalpello, e di qualunque altro ferro nel tempo, che l'aria che dentro ci si è soffiata non agisce più: lo provò, e riuscì benissimo lo sperimento.

Avendo nel Cane, che fa il soggetto della speranza 491. separata la spinale midolla col ferro dalla sua testa, se vedere, che non ostante il cuore continuò a pulsare per un ora intera; e quando il moto fu divenuto languido, fece osservar pur anco, che la parte superiore dell'orecchietta destra non lasciò di contraersi, e di spigner sangue nella cava superiore, nel mentre che la parte inferiore di quest'orecchietta faceane ritornare nella cava inferiore. Questo moto durò ancora, sebbene il moto peristaltico fosse cessato. L'ultima parte che si vedesse muovere, fu la inferiore dell'orecchietta destra, che rimandò nella vena cava l'aria, che vi si era soffiata.

Nello sperimento 492. fatto sopra un Gatto, dice che nel tempo, che lo animale trovavasi agitato da violente convulsioni in conseguenza di ferita al cervello, scopersi il cuore; ben spruzzato d'acqua, vide contrarsi considerabilmente; la sua punta accostarsi alla base, e nello stesso tempo e la punta, e la parte del cuore, la più a quella vicina, alzarsi verso la destra davanti l'aorta. Nel mentre poi, che li battimenti del cuore l'uno all'altro con vivacità succedevano, era difficilissimo il distinguere l'intervallo delle contrazioni dell'orecchiet-
ta

ta da quelle de' ventricoli. Quando però l' animale fu fatto debole, languido, non gli fu difficile il vedere l' orecchietta pulsare tre, quattro, e poco dopo, sei volte, prima che li ventricoli si contrassero una sola. Le fibre del cuore s' increspavano in tempo della loro azione senza scolorarsi: quanto all' orecchietta, la cui sottilissima struttura lascia scorgere il sangue, che trovasi nella sua cavità, ella è rossa quando è piena, divien pallida quando è vuota. Continuo il cuore in questo stato a battere un ora intera, senza che lo animale respirasse; li ventricoli furono i primi a perdere il loro moto, e l' orecchietta destra, fu la più costante a conservarlo. In tale stato ancora, il cuore riprese il suo moto sol che soffiassesi aria per la trachea arteria.

Nello Sperimento 493. fatto sopra un Gatto, le due orecchiette vibrarono esattamente insieme, e poco dopo li ventricoli si contrassero similmente nel medesimo tempo. Il cuore non ostante non perdettero il suo moto, che un ora intera dopo la material morte dello animale.

Nel Sorcio poi delli 4 Dicembre 1750, che servì allo Sperimento 494. l' orecchietta destra seguitò a contrarsi, sebbene il cuore fosse del tutto restato senza moto.

L' esperienza 495. fatta sopra un Cane non ad altro fine fu fatta, che per vedere se tutta la circonferenza del cuore era irritabile: di fatto non trovò il Signor Haller punto delle sue carni, che irritato non si contraesse: la punta, la base, i lati, la superficie esteriore, l' interiore, tutte si contrassero, o s' irritassero collo scalpello, o si toccassero con qualche caustico.

Nel cimento 496. adoperato su di un Riccio il cuore si contrasse, senza che l' orecchietta destra si movesse. Cessato che ebbe di muoversi, venne soffiata aria per la vena cava, ed il moto di nuovo tornò alli ventricoli, che pulsarono per buona pezza, senza che l' orecchietta acquistasse energia per muoversi: Quando moveasi il cuore, la punta s' alzava, e nello stesso tempo le carni si contraevano trasversalmente. Terminato questo moto fu cercato in vano di eccitarlo coll' olio di vetrinolo. Soffiata però aria per la cava, il ventricolo riprese il suo moto.

Lo Sperimento 497. sulla Cornacchia delli 7 Gennajo 1751. è diretto a mostrare, che il cuore di questo animale batte più veloce di quello de' quadrupedi, che appena se ne possono contare le vibrazioni. Segna ancora, che quantunque fosse un buon quarto d' ora che avesse lasciato di muoversi, non ostante irritato, tornò in esso il moto perduto.

Nel Gatto della Sperimento 498., il cuore che avea cessato dal muoversi, non tornò ad azione col tocco dell' olio di vetriuolo: bensì dove toccavasi produceva non so quali particolari contrazioni, che appena erano sensibili, tanto cessavan presto. Soffiata però aria per la vena cava, tornò il moto al cuore, e soprattutto all' orecchietta destra, ed avea tale forza, che spinse l' aria medesima della quale era piena, e nel ventricolo destro, e nelle due cave. Quando ciò fecesi, era un ora intera che il moto peristaltico più non si vedea, che alcuna irritazione

gli intestini più non chiamava ad azione; e che lo animale era divenuto freddo.

Fu pure agevole al Signor Haller di vedere nel cuore della Capra giovane posta al cimento 499. quelle palpitazioni violente, che agitavano ora una parte del cuore, ora un'altra in tempo, che le orecchiette trovavansi essere pressocchè senza moto. Soffiata però in questa circostanza ancora aria per la vena cava, il cuore, sopra tutto il ventricolo destro, e l'orecchietta destra, ripresero maggiore energia, e si mossero, ma con qualche irregolarità.

Nel Coniglio alla speriienza 500. trovò il cuore battere irregolarmente, e languidamente, di modo che cessò ben presto dal vibrare: venne rinvigorito però soffiando aria per la cava, nella cui circostanza vedevasi urtato il diaframma nella sua pulsazione, il quale un ora dopo restò privo di moto totalmente.

Nel Capretto delli 6. Marzo alla speriienza 501. trovò il cuore battere con violenza; nel qual caso vide più che mai la punta accostarsi alla base, e la base un poco alla punta.

Nello stesso giorno sulla Capra del cimento 502. rinvenne il pericardio pieno d'acqua, e non ostante il moto del cuore era vivace. L'azione sua respinse il diaframma verso la destra. Aperta l'arteria coronaria osservò il sangue spicciare con forza in tempo di sistole; ed in quello di diastole, non farlo più, che lentamente.

Il moto del cuore del Pontico delli 5 Aprile, speriemento 503. era ordinato. Erano le prime a contrarsi le orecchiette, poi li ventricoli, indi il cuore, il quale continuò così a muoversi assai più degl'intestini.

Così successe nel Cane del giorno seguente, che fu il soggetto della speriienza 504., di maniera, che l'irritabilità del cuore durò più tempo di quella degl'intestini, i quali più a moto eccitar non si poterono in tempo, che li ventricoli, e l'orecchiette cominciavano le loro contrazioni quando aria soffiavasi per la cava. Era stato prima aperto il petto all'animale dell'addomine, e in conseguenza erano stati gl'intestini assai più tempo diffesi dall'aria, di quello si fosse stato il cuore.

Nelle speriienze 505., 506. fatte su due Toppi, provò il Sig. Haller anche una volta se la legatura delle due vene cave sopprimebbe il moto del cuore, come ha detto il Bartolini; ma nol sopprime punto.

Nelli tre cimenti 507. 508. 509. fatti sopra tre Cani, fu osservata l'orecchietta sinistra comechè piena di sangue, agitarsi con una velocità grande. Aperta poi l'arteria polmonare, vibrò sangue in maniera, che lo spiccio fu quasi a quello eguale, che succede nell'aorta tagliandosi. Vide in questi, e in altri Cani ancora il dotto Sperimentatore, uscire il cuore dal petto, e portarsi con violenza in tempo della espirazione verso l'anterior parte, ed essere indietro tirato, e verso il basso, quando l'animale inspira. Volea in questa circostanza provare di legare l'arteria polmonare, e le vene cave nello animale vivente; ma per la troppa violenza de' moti, che facevano per fino uscire le viscere del petto, non ci riuscì.

Me-

Mostra nello sperimento §10. fatto sopra un Cagnoletto, che è cosa certa, che le due orecchiette si contraggono a un tempo stesso; e che la prima a perdere la sua irritabilità, è la sinistra. Che le due punte de' ventricoli si avvicinano alla base: che il moto dell' orecchietta destra cominciò dalla sua punta, e che la medesima orecchietta restò pur anco irritabile, quando il cuore non lo fu più; finalmente, che la contrazione della vena succede a quella del cuore, ciò che vide chiarissimamente.

Nelle tre Ranocchie, che servirono alle sperienze notate sotto il numero §11. fu osservata una certa non so qual nube rossa salire, e scendere dall' orecchietta nel cuore, il quale è certissimo, che si allunga quando è pieno: nella stessa circostanza avendo il Signor Haller legata la vena cava inferiore, osservò il moto del cuore rallentarsi, il quale non ostante che venissero in appresso le tre maggiori vene dello animale legate, continuò a vibrare per più ore. Aperse in vano ancora l' orecchietta, ed in vano strappò il cuore, perchè la forza contrattiva del medesimo, e li polsi, ciò non per tanto, non restarono soppressi.

Ne' tre Gattini, de' quali servirono alle sperienze §12. §13. §14. furono legate la vena polmonare, e le due cave; e con tutto ciò il cuore non perdette il suo moto; li due ventricoli pulsavano insieme, il cuore restringevasi, e corrugavasi nello stesso tempo. Riguardo all' orecchiette, impallidiscono queste in effetto, quando si scaricano di buona parte del loro sangue. Solo giunse a fermare il moto del cuore vuotando perfettamente le sue vene, e le sue orecchiette, ne desso più si mosse, se non quando ebbe soffiata aria per la vena cava. Fu cosa chiara da vedere, il ventricolo destro, e la sua orecchietta continuare a pulsare in tempo, che già il ventricolo sinistro, e la sua orecchietta più non moveansi. E' notabile, che da' veleni, e dalle irritazioni meccaniche non s' abbia moto di durata, come per l' opposto trovasi avere dalla forza attiva dell' aria soffiata per le vene.

Nel cimento §15. avutosi sopra un Gatto li 27 Maggio 1741. vide anco il Sig. Haller pulsare in un tempo stesso le due orecchiette, non che la contrazione del cuore continuata fino alla punta. Aperta in seguito l' arteria polmonare per vuotare il ventricolo destro, legò nello stesso tempo l' aorta, per chiuder sangue nel ventricolo sinistro, onde potesse irritarlo. Ciò fatto osservò patentemente l' orecchietta destra pulsare più vivamente della sinistra, ed il ventricolo sinistro contraersi più fortemente del destro. E siccome questa sperienza merita d' essere riferita più diffusamente (quantunque possasi vedere nella Tesi di Monsi. Remus pag. 14. che porta il titolo di Experimenta quædam circa circulationem sanguinis instituta), quindi è, che per maggior intelligenza si fa.

Essendo stata tagliata la cava superiore, e l' inferiore legata; l' arteria polmonare aperta, ed il ventricolo destro vuotato da una competente compressione, non che l' arteria aorta prontissimamente legata, videsi l' orecchietta destra primamente quietarsi, indi il ventricolo, quantunque continuasse a muoversi per qualche tempo di concerto col sinistro, e la sua carne a scendere verso la parete mezzana del cuore. Quanto

all' altro ventricolo, che non poteva più scaricarsi nell' aorta, perchè legata; trovandosi esso pieno di sangue, non potè non a meno di moverfi, e durare in azione quattro ore intere. La sua punta saliva verso la base, e la base accostavasi un po poco alla punta. Trovavasi in riposo tutto il restante del cuore, tutto avea perduto il calor suo naturale, l'orecchietta destra la sua irritabilità; nel mentre che la punta del cuore continuava a curvarsi. Conclude da tutto ciò il Signor Haller, che sembra, per conseguenza, che l'irritazione sia la cagione eccitante del moto del cuore, e che prolungata questa, venga prolungato nello stesso tempo, il tempo medesimo, durante il quale il cuore conserva il suo moto.

Nella speranza 516. nella quale si mise a cemento una Ranocchia, l'orecchietta locata per di dietro l'aorta, e il cuore medesimo, spinsero il loro sangue nella parte sinistra del ventricolo: di là passò il sangue nella parte destra di questa cavità, e di là pure nell' aorta, che passa ad angoli obliqui innanzi all'orecchietta: legata l'aorta, il moto del cuore divenne più violento, gonfiossi, ed agitavasi per iscaricarsi. Tolta poi la legatura, si videro perfettamente le pulsazioni dell'orecchietta, del ventricolo, e dell'aorta l'una all'altra succedere. Tratto finalmente dal petto dell'animale il cuore, tanto e tanto non lasciò la medesima Ranocchia, messa in libertà, di fuggire.

Nello sperimento 517. cercossi di confirmare l'esperienza 505.: di fatti tagliò le due vene cave, legò l'aorta, aperse l'arteria polmonare per vuotare il ventricolo destro; ma non ci riuscì troppo felicemente. L'orecchietta destra, che venne vuotata esattamente perdette il suo moto quasi subito, ma quello della sinistra continuò. Nel ventricolo destro era restato alcun poco di sangue, e per ciò le sue pulsazioni furono più durabili di quelle del sinistro.

Ne' due Gatti delle sperienze 518., 519. furono legate le cave, ed aperta con un ampla incisione l'arteria polmonare, e legata l'aorta: ciò fatto l'orecchietta destra perdette tosto il suo moto nell'uno de' Gatti, e nell'altro poco tempo dopo: la sinistra pur essa, tenne lor dietro. Il ventricolo a quest'ultima corrispondente però, durò a contrarsi, ed a rilassarsi alternativamente. Quanto al destro, non scorgevasi aver moto, se non nella parte superiore circa l'origine dell'aorta. Il moto del cuore cominciava dalla sua punta, e di là ascendeva, e in un'altra contrazione scendeva dalla parte del ventricolo destro la più vicina all'aorta.

Nello sperimento 520. fatto sopra un Cane, ripeté il Signor Haller le sperienze 515. 517. 518. 519. legò, cioè le due cave, e l'aorta, ed aperse l'arteria polmonare. L'orecchietta destra perdette il suo moto nello stesso istante, e dopo essa, la sinistra cessò di pulsare: li ventricoli però continuarono non ostante a moverfi. Soffiò aria per la vena cava, e nell'orecchietta destra tornò ad eccitarsi moto in tempo, che tutto il resto del corpo non dava più segni di vita. Toccò la medesima orecchietta con agente chimico, dopo ch'ella ebbe cessato dal moverfi, e con ciò tornò a palpitare ancora.

Sul Capretto al cimento 521.: questa medesima speriienza, che è simile alla terza di Mons. Remus riuscì perfettamente. Legò l' aorta, e le due vene cave, ed aperse l' arteria polmonare. Ciò fatto, l' orecchietta destra restò tosto senza moto, e non andò guari, che il suo ventricolo fece lo stesso. Quanto al sinistro, continuò in azione, senza che la sua orecchietta si movesse, la quale era piena di sangue grumato. Quest' animale avea acqua nel pericardio, e parecchi vasi linsatici sotto l' orecchietta sinistra.

Nel cimento 522. fatto sopra una Capra giovane tornò a risare l' anzidetta speriienza 515. 521., e riuscì benissimo. Il ventricolo destro restò tosto senza moto in tempo, che il ventricolo sinistro palpitava ancora. L' orecchietta destra fu la prima a fermarsi, poi la sinistra, qualunque lungo tempo dopo.

Nello stesso giorno tornò sopra il Gatto al num. 523. a risare le speriienze 515. 522., e riuscirono benissimo; toltone un piccolissimo moto restato al ventricolo destro, che d' altronde non proveniva, che da un poco di sangue, non erasi potuto così agevolmente far uscire dalla sua cavità. Il moto però del ventricolo sinistro vedesi essere molto più considerabile.

Nelle due Ranocchie allo sperimento 524. l' appianamento della superficie, ed il color rosso, segnavano a maraviglia la diastole del cuore. Nella sistole, raccorciavasi, increpavasi, ed impallidiva; e fu facile l' osservar ciò per la ragione, che in questi animali è facile di rilevare il sangue a traverso la carne del ventricolo, e dell' orecchietta.

Fisso nella Ranocchia della speriienza 525. con un ferro i termini del moto del cuore, il quale, quantunque poco estendessesi nel suo allungamento, esponevasi non di meno a restar ferito. Vide evidentemente il Signor Haller nel tempo della sua contrazione la larghezza della sua base diminuire nello stesso tempo, che la punta si alzava, ed allontanavasi dallo stomaco. Nella diastole il cuore urtava nel taglio dello scalpello.

Nel cimento 526. avuto sopra un Anguilla dice: che questo animale ha il cuore di una struttura tutta particolare. Il pericardio è argentino, e un po' verdaastro, di una sostanza fortissima, continente acqua in quantità. Il cuore è lungo, anzi che no, più largo nella base, e di sostanza tenue verso l' aorta. L' orecchietta è locata per di dietro il cuore un poco a sinistra, trasparentissima, e per conseguenza rossa, d' una figura irregolare. La vena cava va a inserirsi nell' unione del cuore coll' orecchietta. Vedesi il moto cominciare dalla vena cava a qualche distanza del cuore. Questa vena contraendosi, scaricasi nell' orecchietta, e pochissimo dopo caccia la medesima il suo sangue nel ventricolo. Quando questo nella sua circonferenza si contrae, diviene palesemente più lungo, che non era, perchè spigne nello stesso tempo il sangue in alto, e verso l' aorta, e verso la parte inferiore contro il fegato. In questa sistatta circostanza fa passare un onda di sangue visibilissima nell' aorta, che è situata sopra il cuore, ed ha un tubo molto duro, e cel-

luloso nella sua parte inferiore. Egli è questo l'unico animale, nel quale abbia il Signor Haller veduto il cuore allargarsi nella sua contrazione. Osservò con agio, e per lungo tempo la successione regolare de' moti della vena cava, dell'orecchietta, del ventricolo, e dell'aorta. Questa legata, enfiossi estremamente, percchè ella non poteva liberarsi dal sangue, che dal cuore veniva fornito; di modo che erasi fatta di color blo come una vena. Il cuore egualmente contratto ne' suoi movimenti, agitavasi, scuotevasi e più fortemente, e con maggior forza di quello faccia nello stato naturale. In questa seconda circostanza, legò la vena cava: l'orecchietta destra cessò di vibrare, ed il cuore seguì ad agire sul sangue racchiuso nella sua cavità. Spignevalo, quando dalla punta al fegato, quando dalla base alla punta. Tagliò il filo col quale la vena cava era legata, e tosto il sangue tornato nell'orecchietta, l'orecchietta stessa ritornò a muoversi, e cominciò a battere alternativamente col cuore. Vedeanfi distintamente le rughe trasversali del cuore nella sua contrazione; nella cui terza circostanza tagliò la aorta; il primo spicchio di sangue recossi in alto più di due polici, gli altri susseguenti, furono di minore energia. Strappato a questo animale finalmente il cuore dal petto, pulsò per un ora intera, e fuor spinse, e riassorbì l'aria, che dentro ci avea fatto soffiare. Per ultimo la sua irritabilità fu molto considerabile.

Nell'altra Anguilla al num. 527. ripeter volle l'antecedente esperienza per confirmar ciò, che avea in essa osservato, ed assicurarsi dell'allungamento del cuore contratto. Per giungere a far ciò, bisogna andar guardingo, rispetto a certi vasi pieni di sangue, che legano il cuore al pericardio in questo animale, e che potrebbero intorbidare lo sperimento, se per avventura si tagliassero.

Mons. Sproegel avea fatto inghiottire all'animale, che servì alla esperienza 528. dieci granelli d'oppio, e scendere nello stomaco. Gl'intestini restarono privi d'irritabilità, ma il cuore no: di modo che fu agevole il ritornarlo a moto, quando l'ebbe perduto.

L'esperimento al num. 529. adoperato sovra una Ranocchia non è altro, che una ripetizione del precedente 528., l'esito del quale fu lo stesso, stessissimo.

Nella Ranocchia, posta al cimento 530., il moto del cuore facevasi ordinatamente; le due vene cave colle pulsazioni loro, riempivano l'orecchietta. Questa nel contraersi, impallidisce, ed empie il ventricolo, il quale dilatasi, e divien rosso. Poco dopo si vede nella sua circonferenza contrarsi, perdere il colore, e passar nell'aorta col sangue.

L'esperienza 531. fatta in altra Ranocchia, non altro pur essa fu, che una ripetizione delle esperienze 528., 529., il cui successo fu il medesimo.

Nella Ranocchia al num. 532. tagliò il Signor Haller la punta del cuore; nella cui circostanza, vide che nella sua azione si raccorciava, ed allungavasi nella sua diastole; e che aveasi una pulsazione ben distinta circa la parte della vena cava, la più al cuore vicina.

Al Coniglio delli 18. Ottobre 1751. al numero 533. erasi fatto inghiottir sublimato corrosivo. Il moto del cuore durò tanto tempo, quanto fu quello degli intestini. L'orecchiotta destra cominciò a contraersi dalla sua parte inferiore, e videasi il moto andar scendendo alle superiori: osservossi pure la sinistra muoversi di concerto nello stesso tempo coll'altra; e la punta del cuore accostata alla base durante la contrazione.

Anche al Cane della speranza 534. erasi fatto prendere del sublimato. Fu osservato in tale circostanza il ventricolo sinistro approssimarsi alla parete, che serve di frammazzo, in scendendo, ed il destro rimontare verso la detta parete. L'orecchiotta sinistra palpitò con una estrema velocità, specie di moto, che a questa è ordinarissimo.

Nel Cane al num. 535., la parte inferiore dell'orecchiotta destra, che trovavasi essere vicina alla vena cava, fu quella che conservò più lungo tempo il moto. Quanto al cuore, le due punte destra, e sinistra, furono quelle, che perdettero le ultime colla forza, vitale il moto. Elleno alzandosi un poco, s'abbreviano; la sinistra però, è più lunga dell'altra. Il cuore conservò il suo moto, ancor dopo la cessazione del peristaltico.

Nel Cane delli 9. Gennajo 1752. sperimento 536., il ventricolo destro, montò ancora verso il frammazzo, e il ventricolo sinistro scese verso la detta parete. Le fibre carnee del cuore s'increspavano in tempo della lui azione. L'estremo precipitato tremito dell'orecchiotta sinistra si fece pur anco vedere. Il moto del cuore recossi a finire, con isolati tremori, che non occupavano, che porzioni di carne separate. Il sangue uscì dall'arteria coronaria senza interrompimenti, e continuò ad uscire, e nella sistole, e nella diastole del cuore. Gli spicci però aveano maggior energia quando esso era in contrazione.

Il Cane dello sperimento 537. non gettò che pochi sospiri, quando gli si fu introdotta aria nella vena jugulare, e spirò tosto. L'orecchiotta destra non ostante continuò a contraersi: restringevassi essa dalla parte della vena cava superiore, e la punta del suo fondo discendeva. Contraevassi pur anco in vicinanza della vena cava inferiore, e respingeva il sangue ne' due tronchi della vena cava. Furono osservabili ancora li tremori isolati, ed ambulanti sulla superficie del ventricolo destro. L'orecchiotta sinistra, cessò prestissimo di muoversi. Il sangue della cavità del cuore era fluido, e battuto coll'aria.

Ne' due Cagnoletti alle sperienze 538. 539. erasi ancora soffiata aria nella vena jugulare: parevano eglino spiranti. L'orecchiotta destra scese nello stesso tempo, e si chiuse; la sinistra serrossi semplicemente a cagione dell'accostamento delle sue pareti opposte. Il seno sinistro si chiuse ancor esso. Aperto il ventricolo destro, videasi la parete di mezzo de' ventricoli raccorciarsi nell'azione, ed accostarsi nello stesso tempo dal lato sinistro. In tale momento furono osservate le carni del ventricolo destro accostarsi al frammazzo, e la base restare agitata da non so quale
fco=

scotimento. Fu richiamato in moro uno de' muscoli della valvola venosa per lo mezzo dell' aria. Il pericardio conteneva acqua.

Quantunque il Cane dello sperimento 540. restasse morto nello istante, che Monsi. Sproegel gli soffiava aria per la jugulare; il cuore non ostante, e le due orecchiette non lasciarono di battere per più di un' ora; l' orecchietta destra restringea il suo fondo, che è estremamente irritabile, spignendo il sangue così nelle due vene cave, senza ch' elleno si movessero: l' orecchiette ora pulsavano insieme, ora separatamente, la destra era però allora più frequente nel battere.

Monsi. Sproegel schizzettò aceto nella jugulare del Cane posto al num. 541, il quale non andò guari, che restò morto. L' orecchietta destra cessò tosto dal pulsare, e il moto della sinistra durò assai più; la quale in tempo della sua azione si fa più breve, ed accostasi alla sua base. Fu osservato il moto di palpitazione durare eziandio nel frammezzo, quando le orecchiette, e la sostanza del cuore non si moveano più. Spignendo aria nell' orecchietta sinistra, ella si rianimò: la destra però non si mosse, e restò col suo ventricolo totalmente immobile.

Nello sperimento 542. fatto sopra un altro Cane, videsi chiaramente il ventricolo destro salire verso la parete mezzana, in tempo, che il sinistro se ne scostava scendendo. Aperta l' arteria coronaria anteriore, fu osservato in tempo della contrazione del cuore spicciar questa sangue con forza; cosa, che così non successe in tempo di diastole; perchè il sangue usciva con molto minor energia.

Nel Cane delli 2. Marzo 1752. posto al segno 543. venne confermata la medesima osservazione. L' arteria coronaria similmente vibrò sangue con ispirito in tempo di sistole, ed in quello di diastole non uscì che con languidezza. Videsi pure salire il ventricolo destro verso il frammezzo; il quale aperto, questa trasversale membrana fu osservata a raccorciarsi. Nella contrazione del cuore, li muscoli della valvole venose s' abbreviano un poco più, e li tendini loro si rallentano. L' orecchietta destra spigne a cadauna battuta qualche porzion di sangue nel cuore. La pulsazione delle due vene cave era chiarissima, ed il cbilo veniva pel tronco superiore a derivarsi nell' orecchietta destra. Fu la prima la sinistra a perdere il suo moto, indi il di lei ventricolo, poi il destro. Il frammezzo, e l' orecchietta destra furono le parti, che la durarono con maggior costanza ne' loro movimenti.

Anco nella sperienza 545. fatta sopra un Capretto, fu osservato il sangue dell' arteria coronaria anteriore alzarsi all' altezza di un pollice, in tempo della sistole del cuore; ed uscire molto più placidamente, a senza energia in quello della diastole.

Mostrasi nello sperimento 545. che s' ebbe sopra un Cane, che l' orecchietta destra era stremamente piena; circostanza che fece, ch' ella non paresse essere irritabile del tutto. Successe sovranti volte al Signor Halter di vedere le orecchiette piene zeppe di sangue perdere il moto, per la medesima ragione. L' orecchietta sinistra in questa sperienza si contrasse con violenza unitamente al suo ventricolo, e rendette le più volte infiacchito il moto del cuore.

Nelle

Nelle due Ranocchie del cimento 546., il cuore conservò più lungo tempo il moto, e l'irritabilità di quello faceessero gl' intestini, il cui moto peristaltico erasi non per tanto fatto vedere con molto vigore. Fu agevole di veder pure il moto successivo delle parti, cioè nell' orecchietta locata per lo di dietro del cuore, nel ventricolo, e nell' aorta. Non fu difficile ancora di rilevare la palidezza, che ne nasce in conseguenza dello spogliamento del sangue, quando abbandona l' orecchietta.

Nello sperimento 547. fatto sopra una Ranocchia, fu veduta distintamente la punta del cuore alzarsi, e ricurvarsi nella sua sistole, non che alcune rughe trasversali osservate furono, e parallele tra loro, farsi eminenti sulla superficie di quest' organo.

In altro simile animale allo sperimento 548. li 18. Maggio 1754. la vena cava epatica contraendosi, riempi l' orecchietta col sangue, che in essa faceva salire. Quest' orecchietta medesima si contrasse similmente di basso in alto rimontando, ed empì il ventricolo, dal quale pure venne riempito il tubo dell' aorta. Una parte del sangue mutando strada, videsi ritornare dall' orecchietta nella vena cava: e quantunque si levasse il cuore dal petto dello animale, non ostante continuò a vivere, ed a saltare.

Nella Ranocchia delli 31. Maggio, esperimento 549. la successione delle contrazioni della vena cava, dell' orecchietta, del ventricolo, e dell' aorta comparvero distintissimamente. Riconobbesi il loro stato di pienezza da non so qual nube rossa, da cui vengono queste parti gonfiate. Tagliato il cuore a mezzo, cacciò fuori sangue in cadauna delle sue contrazioni, e la sua parte troncata, che avea la punta perduta, non lasciò che di contrarsi.

Nell' altra della sperienza 550., legata l' aorta, il cuore divenne di un rosso scuro, e si trovò pieno di sangue: e benchè lo stato di pienezza non fosse gli vantaggioso, non di meno aveva i suoi intervalli di riposo, non che le sue diafasi, che si distinguevano dalla linea dritta, che in questo stato segna la sua punta.

Tornossi a legare l' aorta nell' altra Ranocchia dello sperimento 551., il cuore con violenza agitossi, ed il tubo di questa grande arteria enfiossi sotto la legatura, di un rosso scuro addivenendo. E siccome il sangue non può seguire la sua direzione naturale per uscire dal cuore, acquista un moto retrogrado facendosi una corrente alternativa tra il ventricolo, e l' orecchietta. Il cuore contratto manda sangue all' orecchietta, ed in appresso questa gliel ritorna. In questa sperienza, come in altre a questa simili, non ho veduto seguire niuna paralizia alla legatura dell' aorta.

Nell' altra Ranocchia alla sperienza 552., fu ripetuta la medesima cosa, col medesimo successo; se non che parve, che la legatura dell' aorta avesse indebolito l' animale. Trovandosi in questo stato il cuore pieno, e non potendo scaricarsi nell' aorta, fu ugualmente osservato un raccorciamento nella sua sistole. Legata la vena cava inferiore, continuò non ostante il cuore a battere, ma con minor forza. Il moto dell' orecchietta più tempo durò di quello del cuore. In

In altro simile animale al cimento 583, la pulsazion della vena cava veder fecesi chiaramente fino al fegato. Precede ella il moto dell' orecchietta, la quale trovassi piena del sangue, che la vena cava contratta le fornisce. Legata l' aorta, e perciò il sangue non potendo più uscire dal cuore, rientrò nella cava inferiore, e la empì fino al fegato. Pochissimo tempo dopo la contrazion di questa vena, spinse il sangue verso l' orecchietta, e glie lo rese. Avvi dunque in questo animale una disposizione ad un polso venoso. Senza la legatura, videsi pure la vena contrarsi colle sue branche epatiche, ed il moto di sistole fu sensibile ancora ne' tronchi venosi dell' addomine, e del braccio.

Nell' altra Ranocchia del fatto 554. videsi la vena cava battere dopo il fegato, riempiendo l' orecchietta. Questa tal vena scaricasi nel ventricolo, ed il ventricolo diviene egualmente più lungo, e più largo nella sua diastole. Quando trovassi agitato nella sua circonferenza, fassi più breve, ed impallidisce. Il tubo dell' aorta s' empie estremamente sopra tutto, quando comprimesi in un sì fatto momento.

Nel Porcetto di latte al cimento 555., la punta del cuore non sembrò appartenere, che al ventricolo sinistro. La punta sale evidentemente nella sua contrazione, e la base del ventricolo destro accostasi nel tempo stesso alla punta, ed al frammezzo. L' orecchietta destra si contrasse sola, e senza il suo ventricolo per 30 minuti; la parte destra, e la sinistra di quest' orecchietta s' avvicinano nella loro azione l' una all' altra nella sua parte libera: nella lor base appiccata al cuore, ed alla parete delle orecchiette il cavo s' appiatta, e la convessità anteriore dell' orecchietta accostasi a questa menzionata parete. Eccoli l' ordine col quale le parti del cuore perdettero il loro moto. L' orecchietta sinistra, il suo ventricolo, il ventricolo destro, l' orecchietta destra; la vena cava, era senza moto, essendo piena zeppa di sangue.

Nel Gatto della speranza 556., l' orecchietta destra mandò sangue nella cava superiore, nella mamaria stessa, e nel tronco addominale a più di un pollice di distanza. L' orecchietta destra contrassesi per un ora intera; il suo vuoto si appiannò, e si depressi nella sua azione. Ella sugge alternativamente il sangue della cava, e glielo torna a rimandare.

Nulla dico del Pollo contenuto nell' ovo (esperimento 557.) perchè riservo questa speranza per una particolare memoria; nè altro farò che citare alcune particolarità. Il cuore del pollo si rianima, quando i suoi movimenti son divenuti languidi, dal calore, e da una irritazione meccanica. Quando il cuore ha di forza perduto, e che pena a scaricarsi del sangue che contiene, si è osservato il sangue stesso rientrare nel tubo dell' aorta, che fassi molto considerabile in questo stato dell' animale.

Eccoli la serie delle sperienze sopra il moto del cuore; nè io vò sollecito di raccoglierne il numero, potendolo fare cadauno da se medesimo. Siami grato il Lettore, e riceva con umanità ciò, che m' è piaciuto di fare per meglio instruirlo nelle cose del chiarissimo Signor Haller.

DELLO INVILUPPO

DE' NERVI

DISSERTAZIONE

DI MONSIEUR

GIOVANNI GOTTFREID
ZINN.

Quasi tutti gli Anatomici dal tempo di Galeno fino a questi nostri, sono stati portati a credere, che la tonaca de' nervi, della quale vanno involti li piccoli filamenti midollari, che escono dal cranio, e che destinata trovasi a diffenderli da ogni, e qualunque lesione, in tutto il loro corso, e finchè giungano a penetrare ne' muscoli, ed a traverso d'altre parti, sia una verace continuazione delle meningi del cervello, le quali senza cangiar di natura, s'ordini sol tanto in forma di guaina all'intorno de' nervi, i quali fuori scendono dal cranio, e dalla cavità delle vertebre, e continui ad accompagnarli fino al suo termine. Ma siccome la maggior parte credono, che questa dura madre, e degli altri ancora, che la pia sieno membrane di una estrema sensitività, riguardo alla midolla stessa spogliata d'ogni senso; quindi è, che giunti sono ad immaginarsi, che ogni sensazione dipendesse da questo inviluppo de' nervi, considerato come continuazione delle meningi del cervello, e che per ciò tutte le loro sensazioni andassero a terminarsi al sensorio comune.

Il perchè a nostri giorni il celebre Mons. Winter, Professore nell'Accademia di Leida ha tant'oltre avanzata questa teoria, che è per fino arrivato a stabilire nella dura madre il primo principio non solo della sensitività; ma altresì della irritabilità, pretendendo che le parti del corpo umano non sieno nè sensibili, nè irritabili, se non in quanto procedono elleno dalla dura madre. Molte e diverse sono le obbiezioni, che fanno si contro questa teoria, fra le quali avvenne che sono di moltissimo peso, e momento: Niun però si è, avvisato di bene esaminare, se fosse conforme alla verità anatomica lo stabilire per una verace produzione delle meningi del cervello il predicato inviluppo de' nervi. Ed eccovi il principal fondamento, sopra il quale si appoggia tutta questa teoria, levato il quale, non potrà non ameno di non precipitar tutta quanta la macchina ch'egli porta.

Suppl. Part. I.

L

II

Il Signor Haller mio illustre, e rispettabil Maestro, è il primo primo, che abbia proposta una bellissima, e laudevolicissima conghietura cavata dall' analogia delle altre parti, secondo la quale questa fodera de' nervi non è, che una semplice tela cellulosa. Quest' idea mi è sembrata così utile, ed importante, che io mi sono fermamente proposto d' illustrarla, esaminando con somma attenzione, e rigore ne' cadaveri qual fosse lo stato delle cose, tanto all' uelcir, che fanno i nervi fuori del cranio, e della cavità delle vertebre, quanto nel loro corso per mezzo a tutte le parti del corpo umano.

Tutti li nervi, che procedono, e derivansi dalla midolla del cervello, o dalla spina, sono piccoli fascetti midollosi composti di fibre distinte, e parallele dalla pia madre involuti, e riuniti in un solo pacchetto, o tronco. Negli uni ella è rossastra anzi che nò e più soda; negli altri più molle, e quasi quasi midollare, come appunto ne' nervi olfattorj, e servienti all' udito: non per tanto li piccoli vassellini, che disegnano li nervi, la scuoprono agevolmente per tutto.

Li tronchi composti di questi piccoli filetti vanno a determinarsi al loro foro nella dura madre, i quali trovansi essere ora più, ora meno lontani dalla origine, ch' eglino tirano dalla midolla; e parecchi ce ne sono, che fanno un lunghissimo cammino pei loro diversi canali, ed interstizj, prima di giungere a trovare il loro foro nella base del cranio, essendo per altro legati da per tutto in una maniera strettissima alla dura madre, e in tutto il corso del cammino, che fanno nello avanzarsi, e propagarsi tra le sue lammelle, da una sostanza cellulosa forte, corta, rossastra, e distinta dalla pia. Quando però il nervo è giunto al suo foro, la dura madre appiccata, ed incollata per così dire per tutto alle ossa, ripiegasi, e forma come una specie d' infondibolo, nel quale è ricevuto il nervo, a somiglianza d' una vagina destinata a ricevere un ferro profundato in essa che sia, e ciò fin tanto ch' egli è nella grossezza dell' osso; e siccome trovasi esso nervo legato alla dura madre per lo mezzo di più fibrille cellulose, e fortissime; quindi gli è, che la sua origine medesima, la quale è estremamente molle, non resta così agevolmente soggetta, e sottoposta a lesioni, massimamente quando accade, che il nervo all' uscire della scatola ossosa della testa si trovasse essere oltre modo in tensione. La dura madre nel portarsi fuori del cranio, e del condotto spinale col nervo, non resta la medesima nelli differenti nervi. Perchè, in quelli, che immediatamente, dopo la loro uscita, continuano il loro impreso corso intrecciati ne' muscoli, come accadere si vede nell' ottavo, e nel terzo ramo della quinta coppia, e nel nono, quando è pervenuto alla imboccatura esteriore del foro del cranio, ella separasi tosto in due lammelle, l' una delle quali conservando la solidità, e la densità, le quali caratterizzano veramente la dura madre, vedesi ripiegata attorno dell' osso, e continuarsi nella maniera la più chiara, e

mani-

manifesta nel perioftio medefimo. Quanto all' altre lammelle, in-
 veſte ella il mezzo a guifa di fodero per uno ſpazio breve, nel qual
 caſo ſembra eſſere favorevole alla opinione generalmente ricevuta :
 dopo però averlo coſì inveſtito, e per non ſo qual tratto inſenſibil-
 mente ſeguito, ora nell' un più preſto, ora più tardi nell' altro,
 diventa ella una totale membrana vaginale più laſſa, e più ſotti-
 le, e tanto va perdendo, che finalmente giugne a non eſſere più,
 che una ſemplice tela cellulofa, di qualche mole, che può gonfiarſi,
 e del tutto fomiglievole alla cellular tela, che copre i muſcoli, e
 tutte l' altre parti del corpo umano, in una parola, che conſonde-
 ſi totalmente colla cellulofa delle parti vicine. Niente di meno pe-
 rò le piccole lamminette, che toccano i nervi più d' appreſſo, tro-
 vandofi elleno compreſſe dalla forza de' muſcoli, e delle altre parti,
 che ſopra vi ſtanno, ſono di una teſſitura un poco più forte, e
 ſtretta, e continuano a ſecondare, e tener veſtito il nervo, nella
 ſteſſa maniera, che ſuccede a tutte le parti, che ſono guarnite, e
 contornate d' una ſoſtanza cellulofa. La coſa è ſopra tutto ſenſibil
 molto nella ottava coppia, la quale ſcende pel collo, e nella qua-
 le le piccole lamelle cellulari, ſono più ſtrettamente ſitte dalla pul-
 ſazion della carotide, e dalla azion delle parti vicine. Gli altri nervi,
 i quali hanno il loro corſo a traverso delle parti molliſſime, e
 della pura pinguedine, come ſono quelli, ch' entrano per la feſſu-
 ra ſenoidea dell' orbita, non ricevono ſolamente queſta tale lam-
 mella dalla dura madre, la quale in queſto luogo ripiegafi, total-
 mente nel perioftio dell' orbita; ma ſi moſtrano eglino guarniti ſol-
 lamente della loro pia madre, e d' una membranuccia cellulofa in
 tutto, e per tutto delicatiſſima. La dura madre abbandona ancora
 totalmente altri nervi, i quali gettandoſi, ed internandoſi toſto nel-
 le oſſa, vengono coſì meſſi in ſalvo da ogni ſorta d' accidente, e
 queſta membrana ſenza dividerſi, reſta affatto intera appiccata all'
 oſſo, nè ſi ſepara punto, come fa in altri luoghi, in due lamminette,
 l' una delle quali ſerve a veſtire il nervo. All' uſcita dell' olfattorio,
 la dura madre diſſende per tutti li fori della lammella etmoi-
 dea delle produzioni piene di propagini nervoſe, e di piccoli vaſe-
 ti, i quali per non ſo quale certo ſpazio ſi oſſervano diſtintamente
 nella membrana pituitaria, fino a che ſi ſvaniſcono, e perdono in-
 ſenſibilmente con eſſa ſteſſa. Io non farei lontano dal credere,
 che gli Autori, i quali nel deſcrivere la diſtribuzione del nervo ol-
 fattorio nelle parti interne delle narici, pretendono, che gli ſuoi
 germogli ſieno impacciati, ch' eglino ſi diſtribuiſcano in ramuſcel-
 li, e che non ſieno molto ottuſi, non abbiano altra coſa veduta,
 ed oſſervata, ſe non ſe, queſte produzioni della dura madre, che ſi
 diſfondono, ed impegnano nelle membrane delle narici. Chiunque
 però ha fatta la ſperienza, riconoſcerà con eſſo meco, che la ſoſtan-
 za molle, e mucilaginoſa del nervo olfattorio, {dopo aver egli paſſa-
 ta la lamella dell' oſſo etmoideo, impediſce aſſolutamente, che poſ-
 ſa

sai affermare del tutto qualche cosa di certo intorno la distribuzione sua, e le sue anostomosi cogli altri nervi.

La dura madre della midolla spinale, come noi dicemmo, di quella del cranio, forma similmente all' uscita di cadaun nervo, sempre tra due vertebre, un imbuto, o sia vagina, che abbraccia non solo il nervo in una maniera stretta; ma che fornisce, e provvede di membrana esterna il ganglio, dal quale puossi però separarla, senza che il ganglio medesimo ne riceva lesione, e farlo in modo, che non abbiassi bastevol fondamento di dire, che la dura madre stessa profundasi col nervo nel ganglio.

Quanto ai nervi della spina, eglino non-differiscono in altro, che in non avere per niun modo, alcuna lammella della dura madre, che si continui nel perioftio delle vertebre, il quale unicamente procede dal pericranio; ma che tutto questo infondibolo, che è formato dalla dura madre, risolvesi nella cellulosità attornata al nervo. In tutti questi nervi, la pia madre, dopo ch' ella è fuori uscita delle ossa, sembra cangiarsi in questa tela cellulosa delicatissima, forse non ad altro fine dalla natura fatta, che per tenere riuniti i filamenti stessi, e le ultime fibrille, ad oggetto di formarne un fascetto più considerabile nel deporre la sua natura polposa, di modo tale, che in un nervo, che abbia fatto qualche tratto di cammino tra li muscoli, non è più a portata di venire distinto da questa membrana cellulosa esteriore.

Io anderei difficilmente persuaso, che l' aracnoide esca dal cranio, quando però ella non cangi di natura, e non passi in cellulosa. Quanto a quello che spetta al nervo ottico, è differente; egli da tutti gli altri in ciò, perchè trovasi essere il solo, che sia involto d' una veracissima continuazion della dura madre, e come in una vagina fino alla pupilla dell' occhio, il quale involuppo non si risolve punto, come fa negli altri nervi in una tela cellulosa; ma puossi staccarla del tutto pulitamente dal nervo fino al suo termine; circostanza, che può aver dato campo agli Autori di credere, e di stabilire la medesima cosa, riguardo a tutti gli altri nervi del corpo umano. Di fatti la dura madre col nervo alla imboccatura esteriore del foro ottico divideasi nella maniera la più manifesta in due lammelle, l' una delle quali nel ripiegarsi da quest' angolo di divisione in fuori, riveste l' orbita in forma di perioftio, e l' altra abbracciando il nervo come una guaina innoltrasi, e si estende fino alla pupilla dell' occhio. A veracemente favellare molti Anatomici sono ancora d' opinione, che questa testè nominata vagina, la quale procede non ha dubbio dalla dura madre, essendosi fatta più grossa, cangiarsi nella sclerotica medesima. Le mie proprie e replicate osservazioni però, le quali ho più, e più volte esattamente, e con tutta quanta la più possibile attenzione, e con quella medesima della quale era io capace fatte, mi hanno abbondantemente, e senza più, persuaso e convinto, che la sclerotica, altro non sia, che una mem-

membrana propria, e particolare dell' occhio, differente del tutto dallo inviluppo del nervo ottico, che è strettissimamente legato alla origine la più densa della sclerotica attorno al nervo stesso da una forte cellulosità. Nella maniera medesima la pia madre del nervo ottico, che raccoglie, e lega insieme in un grosso nervo tutti quanti i filamenti costituenti detto nervo, i quali vengono uniti da una membrana cellulosa, perviene, ed interamente giugne, continuata col nervo, fino alla origine della retina, trovandosi essa dallo stesso nervo inseparabil per tutto, tanta è l'aderenza, che ha col medesimo. Non è poi del tutto vero, come da alcuni Autori de' più moderni pretendesi, che ella si risolva in questo luogo in cellulare; nè col comune sentimento degli Anatomici fin qui ricevuto è men vero e fondato, ch' ella formi la coroide. Cogli occhi miei propri assicurato io mi sono, ch' ella si unisce sol tanto alla coroide per lo mezzo di un legamentuccio celluloso; quando però si è dessa inoltrata col nervo nella grossa sostanza della sclerotica fino colà dove comincia a spiegarsi, e spandersi nella retina, la pia madre ripiegandosi in giro giugne alla sclerotica, e la veste internamente di modo, ch' ella forma la lammella anteriore; la quale trovasi inseparabile fino alla cornea, come in altro luogo è stato per me medesimo più amplamente, e più diffusamente dimostrato.

Fuori che sieno del cranio i nervi, siccome sono meno diftesi tra i muscoli, di quello trovansi essere in esso, quindi è, che hanno i filamenti midollari da' quali vengono costituiti una membrana cellulosa, che legati ed uniti li tiene, la quale è tanto più delicata, quanto che questi filamenti sono più piccoli, e fini; di modo tale, che nello esaminare la struttura de' più tenuissimi, la piccolezza de' quali, non ostante, resta scoperta all' occhio armato de' migliori microscopj, sempre si scorge una tela cellulosa di una estrema sottiliezza, che contorna ogni filamentuccio, ed agli altri lo unisce. Questi filetti dell' ultima piccolezza riuniscono insieme per formarne de' più considerabili, i quali sono pur essi uniti da una cellulosità più forte, fino a che sieno giunti ad essere da un ultimo inviluppo celluloso, addensato, e di qualche durezza renduto dalla forza de' muscoli ad essa sovrapposti, non che dalla pulsazione delle arterie, universalmente involti, il quale vedesi essere una continuazione della cellulosità la più sottile, che trovasi intrecciata fra li menomi filetti. Questo involto contiene tutti quanti i menzionati filamenti, e li unisce in un solo nervo; unione, che rende la fabbrica de' nervi perfettamente simile a quella de' muscoli, le ultime fibre de' quali sono similmente unite da una cellulosità in tutto sottile, a differenza del muscolo intero, che è contornato, e vestito da una cellulosità più dura, che li chiude, come in una spezie di tonaca.

In certi nervi questo inviluppo celluloso ha più grossezza, e solidità;

lidità; in altri trovasi più molle, e più delicato, e questa varietà succede secondo che li nervi prendono il loro corso, e si distribuiscono nella tale, o tal altra parte. Trovasi avere esso la sua maggior consistenza nei nervi, che si diramano, e si distribuiscono per entro a' muscoli, e ciò, perchè la loro porzione midollare, che è sì delicata non venga in alcuna maniera offesa dall' azione de' muscoli medesimi, o da qualche altra accidentalità esteriore. Ella è più molle questa cellulosità in quelli, che vanno a derivarsi nelle viscere, e sopra tutto in quelle dell' addomine, perciocchè essendo egli- no più profondamente situati si trovano meglio guardati da ogni, e qualunque lesione, come lo vengono ad essere i nervi, che entrano nell' orbita impiantandosi, e traversando la pura, e semplice pinguedine. Non trovasi però niuna parte, la quale sia delicata, e molle cotanto, quanto si rinviene ne' nervi, che passano per alcune cavità contornate da tutte le parti d' ossa, e per condotti ossofi, come osservasi nella settima coppia, e sopra tutto nella sua molle porzione; nel secondo ramo della quinta, che trovasi racchiuso nella cavità sfeno-palatina, e sopra modo nel nervo intercostale, qui, *secondo che dice il testo francese*, nè dans le bain de sang du réservoir, & accru dans son cours per la seconde racine tout à fait molle du nerf Vidien (1) fa un lungo cammino pel canale ossofo carotico, mantenendo, e sempre conservando una strema mollezza, la quale comunica a quasi tutte le propagini sue. Osservasi la medesima cosa in quelli del cardiaco, i quali trovanfi locati nella situazione, la più guardata, e sicura, ove è impossibile che arrivi loro alcun sinistro, quando però i vasi maggiori, che escon dal cuore non sieno offesi, cosa che non può accadere, senza un estremo pericolo di vita. Il secondo ramo della quinta coppia, fin tanto che si rimane nascosto in una cavità contornata d' ossa; la porzion dura del settimo, quando scende egli nell' acquedotto del Fallopio; il primo ramo del quinto allorchè diramasi, e s'apandesi diramato nell' orbita, sono del tutto molli, e teneri; ma quando questi medesimi nervi si internano, e profondano ne' muscoli, prendono, dico meglio, acquistano egli- no una fodera cellulosa molto più dura, e stretta, e addiventano vie più simili agli altri nervi muscolari. Tutto ciò fa vedere, che non potrebbe dire, a propriamente, e giustamente parlare, che un nervo sia più duro di un altro; ma che tutta la differenza che passa tra loro, non consista in altro, che nella struttura delle loro vagine. Quindi è, che per lo mezzo dello stesso cellulare involuppo, li nervi sono legati da un lato, e dall' altro alle parti vicine, come sono i nervi diaframmatici al pericardio, l' ottavo all' esofago, e li mesenterici, che partono dal ganglio femilunare alle tonache delle arterie maggiori, e vanno a derivarsi colle loro diramazioni alle viscere dell' addomine, nelle membrane delle quali questi nervi s' in-

(1) Chi volesse vedere più distesamente l' origine di questo nervo per meglio intendere questo passo, osservi l' ultima tavola del I. Tom. della nobilissima, ed incomparabil opera de' fascetti anatomici del celebratiss. Sig. Haller; non che la dissertazione del cbiariss. Mons. Mekei sulla dottrina de' gangli.

intrecciano di maniera, ch' egli è difficilissima cosa di bene separarli, a chi volesse farne la preparazione. Nelle medesime cellulese vagine sono altresì sparse, e diramate molte piccolissime arterie, e vene, le quali per riguardo alli nervi li più considerabili, trovansi avere una competente grandezza, la quale fa, che quando questi vasi vengano schiz-zettati, pingano mirabilmente il nervo. L'acqua della idropisia, ed eziandio qualche volta la pinguedine, penetra, e s' insinua negli inter-stizj cellulosi; come accade da per tutto alla cellulare membrana.

Quanto più li ramuscelli nervosi divengono piccoli, tanto più la cellulare tela appare fina, e delicata, e così di mano in mano succede fino che questi piccoli rametti si terminano in una specie di polpa dopo essersi scaricati degli involti, da' quali venivano contornati, e vestiti. Osservasi non per tanto nella retina non solo, ma altresì nelle papille della lingua, e della cute una non so quale sorta di cellulosità delle più delicate, per lo cui mezzo vengono riuniti li ultimi germogli de' nervi colli più piccoli vassellini, li quali congiunge in una sola papilla, dando con ciò qualche solidità alla midollar parte del nervo.

Alcuni di questi nervi, come pure quelli della spina, l' inter-costale, li quale per osservazione dell' accuratissimo Mons. Haller è veramente un nervo della spina, e quelli del quinto ramo, si gonfiano, ed ingrossano nel loro corso, e formano non so quali specie di tumorosità drette, roscastre, vascolose &c. fatte da una tela cellulosa dura, e fitta, che gli Anatomici chiamano col nome di ganglij. Mons. Meckel ha illustrata così bravamente tutta la dottrina de' ganglij (1), e della utilità loro, che, per mio avviso, sembra non esservi più che aggiugnere; e tutto quello che dice, e riguardo a questa propone, è appoggiato sovra argomenti così solidi, che oltre lo andare persuaso, pienamente in loro io mi quieto. Aggiungerò sol tanto un piccol numero d' idee, che mi si sono presentate allo spirito nello esaminare, e sodamente riflettere su gl' involuppi de' nervi, e che appartengono alla materia ch' io tratto.

Mons. Meckel ha già osservato, che una delle utilità, che si ha da' ganglij consiste in ciò, che da un tronco, o da un piccol numero di tronchi possonsi derivare comodamente quantità di rametti, e partendo da un punto diffondersi, e disperdersi secondo più direzioni; e siccome la tonaca cellulosa, che è portata da' tronchi, non basta per investire tutti questi ramuscelli, la natura ha aggiunti, e sostituiti i ganglij, destinati a fornire il necessario involuppo celluloso alle nuove produzioni nervose, che si diramano, ed escono da un solo ganglio. Oltre ciò, io penso, anzi credo, che una utilità de' ganglij, la quale non è da sprezzarsi, sia, che le fibre nervose, che arrivano per diversi tronchi, si mescolino ad essi in una maniera intima, cosa, che non farebbesi potuta fare con tanta facilità ne' plessi nervosi, ne' quali li differenti tronchi, che li formano, sono più tosto posati a lato l' un dall' altro, oppure incolati, anzichè essere le medesime fibre nervose intralciate tra loro. Per lo contrario

ne'

(1) Nelle memorie dell' Accademia Reale Tom. V., e Tom. IX.

ne' gangli le fibre stesse di differenti tronchi, s' intrecciano tra loro con tanta forza, che non esce dal ganglio alcun ramo per minuto, e minimo che sia, il quale non abbia ricevuto qualche fibra da tutti li tronchi, che vanno a metter capo in questo ganglio. Sembra mi per modo di esempio estremamente probabile, che non esca dal ganglio semilunare alcun piccol ramo, alla formazione del quale non concorrano tutti li tronchi, ch'entrano ne' gangli suddetti. Ma siccome la mescolanza intima di queste medesime fibre midollari non puossi fare, se non se, dopo ch' elleno si sono spogliate del tutto del loro membranoso involto, quindi è, ch' io estimo che li gangli sieno destinati a rivestire questi nuovi germogli nervosi, li quali nascono dalla combinazione delle fibre, destinate a fornire tronchi tutti differenti della cellulare veste, della quale vanno egli no bisognosi, e nello stesso tempo ad impedire, che le fibre medesime che devono meschiarsi, ed intralciarsi tra loro, non vengano così facilmente danneggiate o allontanate, e distratte. Questo è quello, che Monf. Meckel ha fatto vedere intorno ai gangli de' nervi spinali.

Quanto poi alle mie idee, soggiungo, che questa tela cellulare nervosa, o a meglio dire de' nervi, è la sede di più malattie nervose, nelle quali il cervello trovasi essere in piena sanità, e la midolla spinale senza offesa; e queste sono altresì le sole sole malattie de' nervi, che possono lasciarsi in isperanza di guarigione; e la ragione è, perchè la sostanza midollare de' nervi, la quale è affatto tenera; e molle, quella volta, che resta guasta, e malmenata, non pare più accessibile all' azione de' rimedj; e que' medici, che in questi casi s' attaccano all' alterazione ch' eglino suppongono nella qualità de' spiriti animali, spacciano sicuramente vane conghietture. Questa è la ragione per cui la paralisi delle differenti parti del corpo pare venir prodotta il più delle volte, o per cagione di piccoli vasi gonfi, & ostrutti, che attraverso passano a questa tela cellulosa, li quali vengono a comprendere la midolla; o di qualche umore sparso negli interstizj della medesima cellulare membrana, che si sia in esso coagulato, ed ingrossato a segno di divenire un tumore cistico; o finalmente di una materia morbosa, la quale per metastasi abbia fatto passaggio, e sia stata portata a decubitare in tali luoghi. Io penso, anzi giudico necessaria cosa il portar quinci alcuni esempi, de' quali ogn' uno parla oggi giorno, vo' dire, quelli delle guarigioni, che pretendonsi accadute, ed affettuate sovra membri paralitici pel solo mezzo della elettricità.

Elleno sembrano tali malattie rapportarsi a quella spezie di paralisi, che nasce dalla ostruzione de' vasi sparsi, e diramati nella cellulare membrana del nervo, che s' interisce, e si diffonde nel muscolo paralitico; li quali vasetti tutti, ripieni che sieno d' una materia per cui vengano a gonfiarsi, non che a dilatarsi quanto, mai possono, comprimono le fibre midollari del nervo, interdicono lo influxo de'

spi-

spiriti animali, che vanno a derivarsi nel muscolo; e privano in sì fatta maniera l'anima dell'impero, che ha sopra questa parte. Ciò posto, quando la forza elettrica adopera su questo membro paralitico, non solamente il moto del cuore divien più veloce; e forte, ma le arterie, esse stesse, si stringono con maggior forza, e sovra il luogo ostrutto vantaggiosamente agiscono. La macchina elettrica augmenta, e cresce similmente l'affluenza del sangue verso il luogo irritato, ed in questa maniera, la forza agente, che incessantemente, e posteriormente adopera, si accresce. L'unione di tutte queste cagioni fa, sicchè le malecole, che si trovano impacciate ne' vasetti vengano con forza scosse, e sottilizzate, e si risolvano in particelle più piccole; in somma si riducano a tale diametro, che elieno si trovino in istato di potere agevolmente passare nelle vene; oppure per lo mezzo di una maggiore, e più forte contrazione delle membrane dell'arteria ostrutta, vengano facilmente respinte ne' vasi maggiori, onde rientrino nel torrente del sangue agitato, e commosso dalla forza del cuore. Essendo dunque questi piccoli vassellini liberati dalla materia, che contenevano, riprendono il loro naturale diametro; e cessando di comprimere le fibre midollari, la circolazione allora torna a farsi in essi più libera, gli spiriti animali a restituirsi al loro interdetto circolo, e ad agire liberamente nelle parti, che s'erano, per la ragione che abbiamo sopra esposta, sottratti dall'impero dell'anima; ciò che basta per rendere il moto al membro dalla affezion paralitica attaccato.

Io non farei difficoltà di attribuire ancora alla lesion del nervo, non che alla infiammazione de' sottilissimi vasetti della membrana, o sia involto cellulare, que' strani, e terribili accidenti, che sogliono accadere, e s'ha in costume di appropriare alla infiammazione, ed alla corrosione de' tendini, e della loro fodera; come sono gli spaventevoli sintomi, che succedono qualche volta, per quanto si pretende, e crede, alla puntura de' tendini, e ne' quali una leggiera offesa, che venga fatta alle ultime falangi de' diti cagiona un dolor crudo, ed enorme, che si fa sentire, e si propaga fino alla spalla, e che vedesi quasi sempre seguita da una infiammazione tendente prestissimamente alla cancrena; da una febbre delle più acute; da convulsioni, e non di rado, dopo tutto questo, dalla morte medesima. Tale è ancora quella crudele, e pericolosissima specie di paronichia; la quale è presso poco accompagnata dalli stessi sintomi. E' malagevole il comprendere come eglino possano nascere, e venir prodotti dalla semplice lesione delli tendini, i quali non si trovano legati colle parti vicine, se non se, per lo mezzo di una sostanza cellulosa, da cui vengono essi stessi per la maggior parte composti, come si ha dalla osservazione degli Anatomici, che in questo nostro secolo tengono il primo luogo; e come finalmente sianli attribuiti alla estrema sensitività in che li medemi sono stati fin qui tenuti, la quale, come ogn'uno fa, si è renduta ragionevolmente sospetta dopo l'

esperienze, e le replicate osservazioni, che da valentissimi Uomini si sono fatte per bene assicurarlene.

La spiegazione di questi sintomi è facilissima, se si porrà in causa la lesione del nervo, e ripeterassi dalla infiammazione de' vasi della cellulare, che la produce, i quali gongoli, ed infiammati che sieno, tendono il nervo in ogni sua parte; oppure rompendosi spandono, e decubitano nella cellulosa sua membrana qualche mordace fluido, per lo cui mezzo trovasi del continuo la midolla irritata; irritazione dalla quale non possono non nascere convulsioni, che necessariamente disordinano, ed irregolare rendono la circolazione. Trovandosi indi il passaggio del sangue ne' più menomi vasi impedito, e difficoltato dalla contrazione de' nervi, ne succederanno per conseguenza, e l'ardore della infiammazione, e quella acutezza di febbre, che accompagnar suole ogni infiammatorio calore; finalmente la cancrena, lo sfacello, la morte medesima; sintomi tutti, che altro non sono, che tanti inevitabili seguiti dell'assorbimento di questo liquor canceroso.

Ciò posto, siccome tutti li nervi del braccio sono intra loro legati da molte, e frequenti anastomosi, e da diversi plessi, e che li loro piccoli ramuscelli estendonsi a tutte le parti; ciascheduno vede senza molta pena, come l'infiammazione prodotta in un qualunque nervo propagarsi per tutta la continuazione dell'inviluppo cellulare, ed anco pei vassellini, che trovansi legati a tutti gli altri, e come, ed in qual modo in brevissimo tempo celermente si avvanzi, e distenda.

Tutto ciò, che ho fin qui detto, siccome si accorda a provare per quanto parmi, che la fodera, o sia lo inviluppo de' nervi altra cosa non sia, e in altro non consista, che in una sostanza cellulare affatto affatto differente dalla dura madre, e che ancora in più nervi non trovasi continuata, quindi è, ch'io non vedo certamente, quale cosa allegar possano in favore della loro opinione coloro, che pretendono, che tutte le impressioni degli oggetti sensibili fatte sopra una qualunque parte del nervo, vengano portate all'anima per lo mezzo di questa cellulare fodera, e che l'unica causa della sensitività, ed irritabilità de' nervi nasca dall'essere eglino questi inviluppi non altro, che produzioni della dura madre.

Niuno, per quanto giovami sperare, non disconverrà, che tutta questa disputa non sia per essere terminata, se risulterà, che l'esperienza c' insegna, che tutte le vie di comunicazione tra la membrana vaginale de' nervi, e la dura madre, trovansi pienamente interdetto. In quale maniera, per modo di esempio, la sensazione potrebbe essere portata all'anima per lo mezzo de' rametti, che escono, e diramansi dal nervo intercostale, il quale nella sua origine non ha affollatamente alcuna membranosa veste? oppure pel ramuscello discendente dal secondo ramo della quinta coppia, che nella cavità sfeno-palatina è talmente allontanato dalla dura madre, che trovasi pinguedine frapposta tra d essa, e questo nervo?

Nelli

Nelli nervi medesimi, che hanno un celluloso inviluppo continuato colla sostanza cellulare, nella quale dicemmo, che la dura madre del cervello si risolveva, la sensitività, ed irritabilità faranno difficilmente attribuite a questa tela cellulosa da chiunque, farà riflessione, ch' ella non è in niuna maniera parte organica; ma che essendo nata dalla concrezione di una materia glutinosa, e ridotta in forma di membrana dalla compressione, e dalla pulsazione delle parti vicine, e de' vasi, ella non ha la menoma relazione colla fabbrica delle fibre muscolari, e nervose, e ch' ella è interamente priva della specie di quel movimento intestino, del quale sono dotati i muscoli stessi.

La midolla de' nervi sembra per lo contrario propriissima ad esercitare questa funzione, poichè ella vedesi essere manifestamente continuata colla midolla del cervello; e in effetto si osserva in essa gli stessi fenomeni del senso, e del dolore, aventi luogo nel nervo. So bene che molti Autori, fra li quali ve ne sono de' distintissimi, e tra gli altri il celebratissimo Barone de *Sovvieten* negano positivamente, che la midolla del cervello sia capace, e suscettibile di senso; o per lo meno sono moltissimo circospetti a non stabilire niuna cosa intorno a questo: ma in tutte quante l'esperienze, che ho fatte a questo proposito, ho costantemente osservato, che gli animali sembravano dare i maggiori segni di dolore, quando introducevasi nella midollar sostanza del cervello un qualunque strumento proprio, ed atto a far lesione, mentre ch' eglino sostenevano colla più perfetta tranquillità l' offesa della sostanza corticale. E perchè negaremo noi il senso alla midolla del cervello, mentre vediamo in diversi luoghi della stessa nobilissima viscera porzioni midollari differenti del tutto, le quali hanno una sì grande somiglianza co' nervi, che agevolmente si scorge non passare altre differenze tra loro, e la midolla stessa continuata in nervo, che la privazione di un inviluppo celluloso, che separa questi filamenti, o porzioni d' altri, e riunisce loro in un solo fascetto?

Ma quando ancora si accordasse, che fosse effettivamente vero, che la membrana vaginale de' nervi fosse una produzione della dura madre, per me credo avere abbondantemente dimostrato nella mia inaugural dissertazione, o con esperimenti fatti sopra animali vivi, o con sode ragioni cavate dalla notomia, che la dura madre è perfettamente insensibile, comechè quasi tutti gli Anatomici abbiano ad essa fin qui attribuita la sensazione la più squisita. Cotesto mio sentimento, trovasi maravigliosamente confermato da una esperienza, fatta sopra una persona vivente, come aveva desiderato lunghissimamente di fare. (1) Mi si è presentata una tale occasione la state

M 2

pal-

(1) Cercerebbeasi da questo dottissimo, e sottilissimo Fisco, perchè lacerata, punta, bruciata tanto con foco attuale, quanto con potenziale

passata; ed una donna inferma stata messa nello Spedale della Carità, me l'ha opportunamente somministrata.

Per ragion di una carie per morbo venereo ad essa-lei venuta, la quale aveale interamente una porzion dell' osso frontale consumata alla larghezza di due trasversali dita, restò di maniera la dura madre scoperta all' occhio di ogni uno, che potevasi toccare senza pena alcuna con uno strumento: Ora in qualunque maniera, ch' io me la toccassi, od ancora la comprimeffi, e l' irritassi, questa donna assicuravami ogni volta costantemente ch' ella nulla sentiva, quantunque si lagnasse de' dolori li più violenti, allora ch' io le toccava anco leggerissimamente la carne viva. Paragonando questo fatto colle osservazioni, le quali mi hanno servito di fondamento per provare, che la dura madre, dopo ch' ella è fuori uscita dal cranio, risolvesi in una tela cellulosa lassa, e con altri sperimenti ancora, che sono concernenti alla irritabilità, ed al moto della dura madre; sembrami, che siasi in pieno arbitrio di concludere, che la dura madre, ella stessa altro non sia, che una cellulosa membrana, insensibilmente condensata, e ridotta in una membrana forte, e solida dalla pulsazione de' vasi, e dalla pressione contro dell' ossa dure, e resistenti, e che questa membrana riprende da per tutto la sua natura, quando essendo fuori uscita pel gran foro dell' occipizio spandesi, ed allargasi liberamente nelle parti più le molli.

Quasi tutto quello del quale mi sono servito per mostrare che l' involuppo esteriore dei nervi non è una continuazione della dura madre, può venire impiegato a combattere l' opinione di Mont. le Cat, e d' altri Fisici, che stabiliscono nella pia madre la principal sede del senso. Di fatto le nostre sopra riportate osservazioni, han-

no

ziale, la dura madre sembra mostrarsi del tutto insensitiva; e poi al solo tittilarla, e solleticarla, con uno stiletto di punta ottusa tanto nella sua faccia interna, quanto nella esterna, colà dove non è stata investita dall' aria, e trovassi ancora appiccata al cranio; l' animale dia vivissimi segni di una squisita sensazione? Lo sperimento puossi fare, ed il fenomeno, almeno appresso di noi, è costantemente, come invariabile l' anno avuto a provar quindi pure gli industriosissimi, e dottissimi seguaci del Signor Haller: nè vorrei che per spiegarlo ricorresse alla compression del cervello, o a simili cose, poco calzanti mostrate dallo esperimento, e chiaro Signor Zaghi nostro; o come ad altri gli sfugisse sotto l' occhio sperimentando, quasi che gli animali della region sua fossero diversi da' nostri, e la natura fosse stata loro così avara di non averli dotati di quella cagione, che ne' nostri produce il maraviglioso effetto. Utilissima sarà questa spiegazione per illustrare una così importante materia, e di non poca gloria al Signor Zinn Uomo di tanto nobile, e sottile ingegno dotato.

no provato, che la pia madre dopo essere uscita dal cranio, cangiassi, come abbiamo mostrato, ed insegnato della dura, in una tela membranosa cellulare poco tesa, che lega tra loro i filetti nervosi, la quale ha tutti li caratteri di somiglianza colla tela cellulare esteriore, e che confondesi interamente con ella. Oltre ciò, la pia madre come è stato messo in chiaro dalle sperienze sopra questo particolare, fatte da' MM. Kavv, Ridley, e da me stesso, non mostrasi solamente ogni ora priva di sensazione, di modo che puossi con franchezza lacerare, toccarla coll' olio di vitriolo, senza che alcun animale dia il menomo segno di dolore; ma eziandio nell' uomo vivente, quando nello unirsi colla sostanza corticale formarsene una specie di fungosità, ella può essere tagliata, e distrutta da medicamenti escarotici, senza alcuna specie di dolore, o di sensazione. Ed è credibile, che la pia madre cangi di natura, dopo ch' ella è uscita dalla base cranio, dentro il quale è sempre stata insensibile, acquistò ella in seguito la facoltà del sentire?

Finalmente la natura medesima della pia madre è tale, che si ha luogo di restar preso da maraviglia, come l' opinione, che la costituisce la principal sede del senso abbia potuto dilatar sue radici, se tutti li fenomeni s' accordano ad assicurare, che questa membrana è fatta da una sottilissima cellulosità, che contiene più vasi, e li porta ordinatamente al cervello, nel quale s' inseriscono.



DISSERTATIO ALTERA

CLARISSIMI VIRI

JOANNIS GOTTFRIED ZINNI

SISTENS

*Experimenta quædam circa Corpus callosum, Cerebellum,
& Duram meningem in vivis animalibus instituta.*

CUm mihi scribendum esset tempore a dissectionibus Anatomicis alieno, talem mihi visum fuit sumere materiam disputationi, quæ per instituta in vivis animalibus experimenta usum quarundam C. H. partium attingeret. Tædio mihi enim fuit, ex pagina in paginam transcribere, & speciminis loco exhibere meram compilationem, undique ex varii generis libris, conflata. Suadente ergo Venerando Præceptore, Viro illustri de Haller, decrevi experimenta quædam capere circa corpus callosum, cerebellum, & duram matrem: tum quod præcipua his partibus mihi esse videbatur dignitas, tum quod judicia summorum nostri ævi virorum in quibusdam has ad partes pertinentibus differre inter se videbam. Hac occasione in aliis partibus quædam simul observare contigit, ut in nervis diaphragmaticis, medulla cerebri, quæ, dum phænomena omnia attente considerabam, mihi occurrerunt. Commodum mihi visum fuit disputationem dispescere duas in partes, ut in altera agerem de corpore calloso, in altera de reliquis experimentis. Id demum ingenue profiteor, me ad capienda hæc experimenta sine omni præjudicata opinione accessisse, omniaque, quantum in me fuit, accuratissime notasse, quæ, ut vidi, exhibeo.

Experim. I.

Instrumentum *Trois-quarts* dictum per canis, mediocris magnitudinis, anteriorem capitis partem, supra sinum longitudinalem, adactum, traieci per totam cerebri molem, ut in ossibus baseos cranii firmiter infixum hæreret. Canis statim post ictum ita se habuit, quasi nihil mali sibi accidisset. Alacris, omnes sensit irrationes, capite erecto huc & illuc circumspiciens, saliva tamen ex ore effluxit. Aliquamdiu post incidit in soporem, &, vel levi irritatione, vel strepitu quodam excitatus, statim in somnum relapsus est, musculis lateris dextri paralyti correptis. Tali in statu hora undecima illum reliqui. Hora quarta reversus eodem modo affectum deprehendi.

hendi. Aliam symptomatum scenam videndi cupidus, instrumentum extraxi. Omnia statim mutata. Canis ejulavit, & vomuit. Musculi dextri lateris plane paralytici, ut nec motus, nec sensus superesset. Somnus multo profundior, & quamvis gravi irritatione poterat excitari, excitatus tamen fuit stupidior, brevi post somno iterum oppressus. Pulsus febrilis. Redii eodem die hora septima, omnia eodem in statu deprehendi. Altero mane reversus, mortuum inveni. Cranio aperto, apparuit sinus longitudinalis pertusus. Vulnus, corpore calloso ab anteriori parte læso, progrediebatur retrorsum & paulo sinistrorsum per ventriculum sinistrum & corpora striata sinistra ad basin cranii, cujus ossibus instrumentum erat infixum.

Experim. I I.

Idem instrumentum traieci per caput canis majoris, paulo posterius supra sinum longitudinalem, & in vulnere reliqui. Canis vulneratus erat alacris, qui audito latratu alterius canis vicini attenderet. Altero die hora prima pomeridiana reversus, canem saluum vegetumque inveni, minime apoplecticum, & vidi, magnos illum edidisse motus, ut liberum se redderet. Cum esset dies solis, occidi canem vegetum, ne latratu vicinis molestiam facesseret. Cranio aperto, apparuit instrumentum penetrasse per medium corpus callosum, & thalamos nervorum opticorum, ubi in ventriculis anterioribus superioribus sese contingunt, pertudisse.

Experim. I I I.

Ne apoplexia ob effusum ex sinu sanguinem experimentum turbaret, adest instrumentum in dextro capitis latere a dextris sinistrorsum. Canis vixit per 22 horas, semper vegetus, alacris, nulla in parte paralyticus, ultimis tantum horis præ æstu & dolore languidior. Cum facile viderem, canem per aliquot dies posse vivere, laqueo bestiam satis vividam suffocavi, Instrumentum, discisso medio corpore calloso, ad latus sinistrum nervorum opticorum, in basi cranii sibi agglutinatorum, ossibus erat infixum. Vulnus corporis callosi Illustris. Præses ipse inspicere libuit, ne experimento fides deesset.

Experim. I V.

Eodem instrumento adacto, hora septima pomeridiana, per dextram capitis partem catuli junioris a dextris sinistrorsum, animal statim ab ictu inflicto paulo attonitum; post aliquot tamen horas plane ad se rediit, ut per totam noctem vicini illius latratum audirent. Deprehendi altero mane canem, altero quidem in latere, paralyticum, multo tamen vegetiorem, quam fuerat die priori. Cum, necessarium iter instaret, hora duodecima eodem die illum occidi, aperto utroque thorace satis magno vulnere, utroque in latere tres transversos digitos lato, nihilominus tamen vixit per quadrantem horæ

horæ. Aperto altero die cranio, vidi corpus callosum perforatum dextro in latere, una cum thalamo nervorum opticorum dextro.

Experim. V.

Scire avidus, quid contingeret, corpore calloso duobus ictibus læso, intrusi instrumentum tum a dextris sinistrorum, tum a sinistris dextrorum. Primo vulnere inficco, canis vinculis liberatus ita libere incescit, ac si omnino illæsus fuisset: Nec altero ex ictu multo pejor se habuit. Altero mane reversus, paulo languidiorem quidem inveni, sensu tamen motuque integris. Ut varia ratione doceret animal, adesti instrumentum inter primam vertebra & occiput in medullam spinalem, quo factò, sanguis summa quantitate prorupit. Vixit, licet languidissimus, nec tamen omni motu, nec omni sensu privatus, per dimidiam horam. Aperto cranio, apparuit corpus callosum duobus ictibus pertusum, ut fere tota illius pars anterior plane esset discissa. Ictus a sinistris dextrorum & paulo retrorsum vergens, per pedem hippocampi dextrum, alter a dextris sinistrorum per thalamum nervorum opticorum sinistram basin cranii adiit. In tribus ventriculis anterioribus multus sanguis erat effusus. Vertebra remotis, inveni instrumentum per mediam medullam spinalem transisse.

Experim. VI.

Canis ex effuso intra cerebrum sanguine apoplectici, vivi, cranio ferra diviso, cerebrum lamellatim excidi, ad corpus callosum, usque, corpus callosum discidi, ventriculos aperui. Animal medulla irritata ejulat, variosque motus edit, quietum antea, cum inter aperiendum, dentibus ferræ distrumperetur dura mater. Medulla demum oblongata abscissa, totum cerebrum exemi, artus convellebantur, motus cordis & respirationis integer perstabat. Toto denique, quam potui celerrime, evulso cerebello, motus cordis & profunda respiratio superfuit per aliquot minuta. Cerebello exento, intrusi stilum in medullam spinalem, artus convulsi sunt, & quo profundius adesti, eo magis posteriores partes convelli vidi.

Experim. VII.

Columba, cui cerebrum erat exentum, integro tamen cerebello, pedibus insistere potuit, cibumque in os intrusum deglutivit. Notavi in omnibus his experimentis, quod canes, dum instrumentum per medullam cerebri adigebatur, signa summi doloris, ejulatu & clamore ediderint.

SCHOLIA.

§. I.

Omibus ex memoratis experimentis clare patet, corpus callosum posse pertundi, discindi, sensu, motuque integerrimis. Per motus sum ad capienda hæc experimenta sententia quorundam recentiorum, qui sedem animæ constituunt in corpore calloso. Sedem autem animæ vocant Auctores illam partem, ubi ergo est omnium fibrarum nervearum motui inservientium, finisque omnium sentientium. Illam quærendam esse in cerebro, nemo fere hodie dubitat. Opinio enim Aristotelis, & Auctoris (1) libri de corde, qui inter opera Hippocratica refertur, jam dudum obsolevit. Nec meliori fato usa est sententia recentiorum quorundam, Perraultj (2), Tabori (3), Stuarti (4), qui, sensorium commune negantes, animam in proximo per omnes nervorum ramos, ubi illorum infima extremitas est, sentire putabant. Dolores enim post amputationem superstites, & interceptio omnis doloris a nervo compresso facillime hanc sententiam refutarunt (5). Quænam autem sit cerebri pars, cui honor hic, quod sit domicilium animæ, tribui debeat, omni tempore est pugnatum. Notissima est (6) Cartesii sententia de glandula pineali. Willisius (7) sedem animæ posuit in corporibus striatis, ita tamen, ut imaginationis sedem in corpore calloso admitteret, & præterea memoriæ & sensus communis & instinctus naturalis & passionum animæ peculiaries faceret provincias. Vievisse-nius (8), primam sensationum impressionem credidit esse in corporibus striatis, sedem vero imaginationis, & sensus communis, & memoriæ, constituit in centro ovali. Frid. Hofmann (9), Stephanus Blankaard (10), Schelhammerus (11) & alii, sedem animæ quæsi-verunt in medulla oblongata, qui posterior tamen judicio distinctam sedem, nempe corpus callosum, tribuit. Alii collocarunt in septo lucido, alii in meningibus, ut anima fere, quoties novus extitit Auctor, toties domicilium mutare cogeretur.

§. II.

Accessit demum Lancisius (12), & monarchiam adscripsit corpori calloso, tum quod non gemina sit pars, mediumque in cerebro
 Suppl. Part. I. N te

- (1) Edit. Foes. p. 269. (2) Du mouvement des yeux. p. 591. 592. du
 toucher. p. 530. (3) Tract. III. c. 3. (4) De motu musculari c. V.
 (5) Ill. Præc. prim. lin. Phys. p. 195. (6) De homine.
 (7) Anat. Cerebr. Cap. XIII. §. 8. (8) Neurogr. cap. 21. 22.
 (9) Opp. Omn. Tom. I. sect. III. §. 12. p. 85. & Tom. III. sect. I.
 c. 4. §. 8. p. 46. (10) Instit. Med. p. 253. (11) Analect.
 Anat. physiol. sect. XIII. § 25. 30. (12) De sede cogitantis anima.

teneat locum (quæ etiam fuit ratio, cur Cartesius glandulam pinealem elegerit), tum quod singularem & concinnam, præ aliis partibus, structuram in illo deprehendisse se putaret. Ne tamen fatum, glandulæ pinealis nimis durum videretur, umbram splendoris, quæ a Cartesio donata fuerat, illi reliquit, ut nempe ope geminorum, processuum ad thalamos nervorum opticorum pertingentium, spiritibus in corpore calloso jam maturatis & perfectis, ac pro animæ arbitrio ad motus membrorum organorumque determinatis, ipso itinere momentum pulsionis, ac novam, ubi & quomodo opus sit, directionis energiam suppeditaret.

§. III.

Sententia hæc de corpore calloso tum ob novitatem rei, tum ob auctoritatem Lancisii plurimorum statim fuit excepta applausu, tum Italicorum, tum transalpinorum. Inter cives in primis Manzino (1) ita arrisit hæc opinio, ut ad illam confirmandam Mathesin adferre studeret. Supponit nempe, figuram corporis callosi efformatam esse instar pontis curvilinei. Pontem hunc curvilineum duos ostendere fibrarum ordines, quorum alter efformet longitudinem pontis per arcum dispositam (qui arcus describere illi videtur portiones segmentorum sphericorum), alter vero ordo fibrarum componat latitudinem pontis, cuius adeo fibræ, quas rectilineas esse putat, & cum utroque hemisphærio cerebri, & cum fibris circularibus corporis callosi, communionem habeant. Cum vero segmenta illa fibrarum circularium corporis callosi, sint partes polygonorum infinitorum laterum, latera autem infinita possint ac debeant infinite moveri & oscillare, si excitentur; colligendum inde esse credit, minimas fibrillas componentes circularia segmenta corporis callosi, numero indeterminabiles, cum nihil aliud sint nisi infinita latera, posse infinite moveri ac oscillare, quoties sollicitatæ fuerint ab opere infinitorum objectorum, vel ab opere animæ infinite agentis. Illos vero motus & oscillationes fingit esse phantasmata objecta animæ, unde perspicui posse putat, cur anima possit concipere & excitare, tam infinita, tam indeterminabilia phantasmata objectorum tum possibile, tum impossibile. Totum tamen hoc ædificium, licet ingeniosissime exstructum, nititur fundamentis conjecturalibus & imaginariis. Nisi enim concedatur, fibras longitudinem corporis callosi efformantes, esse dispositas per arcum, qui describat portiones segmentorum sphericorum, & nisi concedatur, fibras corporis callosi posse oscillare, totum ædificium corrui.

§. IV.

Diversa plane ratione usus est Cl. Gigot de la Peyronie (2), prima-

(1) *Instit. Physico-Medico-Mechan. Diss. XXI. p. 146. seq.*

(2) *Memoir. de l'Academie des Sciences. 1741. p. 199. seq.*

marius regis Galliae Chirurgus, ad confirmandam opinionem, corpus callosum esse sedem animæ, plane persuasus, homines nunquam meris conjecturis, & mera auctoritate magni nominis virorum posse moveri. Argumentandi autem via, quam sibi elegit, hæc est: Primum ipsi axioma est: si, omnibus partibus cerebri destructis, una tantum superstitet, anima nihilominus superest, integris functionibus, necessario sequitur, solam illam partem superstitem, esse sedem animæ. Plurimis tunc allatis observationibus evincere conatur, præter corpus callosum, nullam fuisse cerebri partem, quæ non destructa interdum fuerit observata sine ulla functionum mentis læsione, & abolitione. Adfert igitur exempla, destructæ ingentis partis corticis & medullæ, destructorum corporum striatorum, thalamorum, nervorum opticorum, glandulæ pinealis, natium & testium, cerebelli, ubi tamen semper ægri integris animæ functionibus usi sunt ad extremum usque halitum. Ut vero sententia hæc de corpore calloso eo firmior redderetur, plurimas adducit observationes, ubi, corpore calloso aut pressso, aut ad partem destructo, functiones animæ turbatæ, & tandem omnino abolitæ, visæ sunt. Omnibus ex his observationibus concludi posse putat, corpus callosum esse sedem functionum animæ.

§. V.

Num vero argumenta Cl. de la Peyronie tanto robore pollent, ut sibi persuadet? Advertamus ad allata exempla animum, omni præjudicata opinione liberum, & videamus, an fundamento esse possint argumentis, quæ illis superstruxit. In omnibus illis historiis corpus callosum fuit pressum a pure, sanguine, tumoribus, aut illi incumbentibus, aut in cavitate ventriculi contentis. Nulla tunc, ratione, habita partium cerebri corpori calloso subjectarum, evincere inde conatur Cl. Vir, ægros male sese habuisse ex solo vitio corporis callosi. Cur autem corpora striata, principium nempe crurum cerebri, quæ pressso corpore calloso non possunt non una simul adfici, plane negligit? Prævidit hanc objectionem Cl. La Peyronie, illamque sic diluere studet, pressionem corporum striatorum non multum hic valere, cum multa docuerint exempla (1), vitam fuisse superstitem, corporibus striatis plane destructis. Sed hac responsione, objectio non plane removeri videtur. Si enim ex una, alteraque observatione, ubi, vita superstitet, corpora striata destructa sunt inventa, concludere statim liceret, nunquam illorum læsionem, aut pressionem, alicujus momenti esse faciendam, eodem & multo potiori jure de omni fere cerebri hæmisphærio possemus asserere, nulla illius pressione functiones C. H. posse turbari, quia maxima illius pars interdum

N 2

de-

(1) Petit lettre a un Medecin. I. obs. I. & obs. III. Memoir A. R. S. p. 208. 209.

destructa fuisse legatur, salva tamen vita per multos sæpe dies, integritque animæ functionibus. Quid tamen frequentius contingit, quam apoplexia, aut saltem hemiplegia, ex pressione cerebri ab effuso sanguine, illiusque satis sæpe exigua parte, inter cerebrum & ossa cranii contenta?

§. V I.

Sed simus faciles, concedamus, mala illa ex vitio solius corporis callosi fuisse nata. Num vero privilegium hoc soli corpori calloso competit? Nulla est facile cerebri pars, vel a corpore calloso remotissima, cujus vitium non aliquando aut vitam ipsam, aut integritatem functionum animæ sustulerit, omnibus aliis illæsis. Ex innumeris observationibus, paucas tantum seligam, earum in primis partium ratione habita, quibus, quodammodo male adfectis, via spirituum a corpore calloso ad partes non penitus intercipi poterat. Sic (1) Wepferus exemplum apoplexiæ post duodecim horas lethalis affert ex Fernelio de abdit. rer. caus. ubi discisso capite, neque ossis, neque meningum, neque substantiæ cerebri quidquam fuit diffractum, sed sanguis tantum, duorum cochlearium mensura, ex disruptis interioribus oculi venis, in cerebri basi procubuit. Num hac sanguinis quantitate omne inter spirituum per crura cerebri in nervos intercludi poterat? Tulpus (2) itidem refert historiam viri ex apoplexia mortui, a fracto osse sphenoido, & sanguine in basin cranii collecto. Alia non pauca apoplexiæ exempla ex effuso in basin cranii sanguine habet Wepferus (3), Bonetus, alique. Vulnerabatur (4) quidam, baculo acuto, in oculi sinistri orbita superiori: illis, qui curationi præerant, vulnus exigui momenti videbatur; brevi tamen post obiit patiens. Huc quoque pertinent vulnera cerebelli, eaque satis parva interdum subito lethalia. Cerebellum enim, læsum nihil peculiare obtinere, nec semper mortem adferre, inferius manifeste patebit. Sic catelli (5) Bohnii, cultello in cerebellum adactō, statim post leviores partium externarum convulsiones expirarunt. Ridleyus (6) vidit, vulnerato canis cerebello, statim de vita fuisse actum. Idem refert Vievssenius (7). Ipsa quædam historia a Cl. de la Peyronie (8) allata, hic nobis succurrit puellæ ex cephalæa mortuæ, in qua, cranio aperto, præter abscessum super nates & infundibulum, nullum vitium fuit inventum. Videmus ergo, ex funesto effectu partis alicujus cerebri non statim posse colligi, sedem animæ ibi esse collocatam. An non (9) eadem lethalitas, aut major, vul-

(1) *Trat. de apopl.* p. 234. (2) *Observ. Med. l. I. c. III. p. 7.*
 (3) *Trat. de apopl. obs.* III. p. 11. (4) *Russch. Observ. Anat. Chir. Centur. Obs.* 54. (5) *De renunc. vuln.* p. 230. (6) *Anat. Cerebr. cap. XVII. p. 167. Edit. Lugd. Bat.* (7) *Neurogr. univ. l. 1. c. 20.* (8) *Mem. A. R. S. 1741. p. 205. n. f.* (9) *Ursit jam hoc argumentum Vener. ac Ill. Præs. in prim. lin. Physiol. S. 82. p. 196.*

vulnerum medullæ spinalis? quæ tamen non est animæ sedes, cum ea compressa, deleta, diu homo supervivat, integerrimis mentis functionibus.

§. VII.

Sed multa præter ea sunt alia, quæ sententiæ huic de corpore calloso, sede animæ, ita adversantur, ut hanc theoriam, si non plane evertant, dubiam tamen semper & suspectam reddere possint, vel si omnino nulla hanc circa rem capta fuissent experimenta. Quæ autem contra illam possunt adduci, alia ex Anatome tum humana, tum comparata, alia ex observationibus, captisque in vivis animantibus experimentis, sunt desumpta. Sedem animæ esse locum, ubi omnes totius corporis nervi conveniunt, nemo facile est, qui dubitat. Omnium autem nervorum stamina idem in punctum posse convenire, ipsa impenetrabilitas corporum impedit. In concessio ergo est, partem illam alicujus esse magnitudinis. Illam vero non adeo exiguum esse posse, inde conicio, quod omnes fibrillæ nervæ per totum corpus dispersæ, nulla excepta, ibi confluere debeant, quum unumquodque nerveum vasculum, ab omnibus aliis distinctum, currat a fine illius extremo ad usque primam in cerebro originem. Fin-di (1) enim nervos, persuaderi nobis non patiuntur determinata vitia partium non omnium, sed singularum, a cerebri vitiis, aphoniæ, surditates, mutitates, paralyses in primis singulorum musculorum. Conjungas nunc, quæso, molem medullæ spinalis, omnesque nervos, qui per cranii foramina prodeunt, & consideres, an moles corporis callosi, cum collectione omnium illorum nervorum, ullo modo possit comparari. Video effugium quoddam, obitient forte, fibras in nervis esse tela cellulosa conjunctas, quæ molem augeat. Sed fabrica medullæ spinalis, plerorumque nervorum in origine fabricæ corporis callosi est simillima. Num autem omnes nervi conveniunt in corpore calloso? Videmus, illos diversissimis & a corpore calloso remotissimis locis medullæ oblongatæ produci. Sic oritur nervus patheticus a stria medullari conjungente pedunculos cerebelli retro testes. Quintus a pedunculis cerebelli evidentissime. Septimus parte molliori ex ipso ventriculo quarto, altera dura, a parte cruris cerebelli proxima ponti. Octavus ab intervallo corporum olivarium & pyramidalium (2). Quis vero ullum horum nervorum deduceret a corpore calloso? Qua ratione corpus callosum cum nervis opticis connexum dici potest? Oriuntur illi maxima ex parte ex thalamis, & (3) præterea a natibus striæ medullari transversim thalamis adiuncta? Albam vero membranam, qua superius nervi optici obducuntur, medullaribus fibris constantem, neque a superiori Centri Ova-

lis

(1) Conf. Ill. Prac. Prim. lin. Phys. p. 192. (2) Conf. Ill. Pras. Prim. lin. Phys. §. 371. p. 187. (3) Santorin. Obs. Anat. c. III. §. 14. p. 63.

is regione prodire, neque illuc contendere ac terminari, contra Vievissenium jam affirmavit Santorinus (1). Neque ullo modo probabile est, nervos valde longe ab ea sede provenire, quam solertia Anatomicorum demonstravit. Quænam autem cogitari potest ratio, cur natura nervum mollem ex ventriculo quarto, quartum ex stria illa medullari retro testes &c. produxerit, si omnes nervi convenient in corpore calloso? Cur fibræ ex corpore calloso, per tot ambages ad principium fere usque medullæ spinalis, progressæ, ibi demum, reflexæ, rursus ascendendo principium quinti & quarti constituerent? Nervi autem esse originem ibi, ubi arteriola desinit, & fibra medullaris incipit, Ill. Præc. (2) ita demonstrasse videtur, ut nullus plane dubitationis locus relinquatur.

S. VIII.

Alterum, quod opinionem hanc de corpore calloso infirmare potest, nobis suggerit argumentum Anatomia comparata. Valde enim est improbabile, sedem animæ esse locatam in parte quadam, quæ per unum, alterumque tantum genus animalium regnat. Præter hominem autem & bestias quadrupedes, omnia animalia corpore calloso carent. Willisius (3) jam observavit, aves corpore calloso destitui, arbitratus illius vicem supplere duas eminentias orbiculares intus cavas ad utrumque latus medullæ oblongatæ sitas. Parisini (4) in dissectione struthionis in primis attentione dignum hoc putarunt, nullum apparere in avibus corpus callosum, sed duo hemisphæria cerebri, ubique inter se divisa, jungi invicem posteriori tantum cerebri parte, fibrillis quibusdam tenuissimis. Eandem fere fabricam reperiri in omnibus avibus. Piscium (5) cerebrum maxima ex parte cum cerebro avium summam habet similitudinem, quorum etiam medullæ oblongatæ duæ illæ protuberantiæ sunt adnatæ, quibus præterea minimum pro corporis mole est cerebrum. Amphibia inter & pisces hac in re, summa intercedit affinitas. Insectis vero cerebrum ita parvum est, ut subinde, (6) quid sit cerebrum, possit ignorari, vel certe minutissima particula (7), ganglio medullæ spinalis non major, reperiatur. Multa tamen iis ex animalibus, quæ destituuntur corpore calloso, sunt satis astuta, & pleraque quadrupeda sagacitate superant, apud exemplo, quæ videntur Castorum industriam aut æquare, aut vincere. Si quis autem vellet pro lubitu, uti fecit Willisius (8), aliam cerebri particulam eligere, cum illo non disputabimus. Nulla enim unquam observatione, nullo experimento, rem ita sese

(1) Ibid. cap. III. §. 7. p. 56.

(2) Prim. lin. Phys. §. 83. p. 196.

(3) Anat. Cerebri c. 5.

(4) Mem. A. R. S. diff. des anim. Tom.

I. p. 373.

(5) Willis. ibid.

(6) Swammerd. Bibl. nat. T.

XV. f. 6. T. XXII. f. 6. T. XXIX. f. 7.

(7) Ibid. T. XXVIII. f. 3. T.

XXXIV. f. 7. T. XI. f. 9.

(8) l. c.

sese habere, declarare poterit, & eodem jure, quo unica ex imaginatione particulæ illæ sedem animæ adscripsit, unusquisque illi honorem hunc poterit denegare.

§. I X.

Timidus tamen, etsi omnibus his munitus, accederem ad sententiam hanc de corpore calloso, sede animæ, oppugnandam, quæ tot tantisque Viris fuit probata, nisi observationes afferri possint, quibus constitit, vitam & functiones animales superfuisse integras, corpore calloso presso, aut alio modo læso. Temerarium fortasse quibusdam videbitur, me, hominem juvenem, promittere exempla corporis callosi vitiat, sine abolitione & turbatione functionum animalium, cum Cl. de la Peyronie (1) Vir tantæ famæ, affirmet, se nunquam in ullo auctore legisse observationem læsi corporis callosi, ubi functiones animales non fuerint aut penitus abolitæ, aut saltem magis vel minus turbatæ. Nullus tamen, puto, facile mihi succensabit, qui consideret, me nullam attulisse observationem, nisi ubi aut corporis callosi plana facta fuerit mentio, aut vitium ita se habuerit, ut corpus callosum communem ruinam effugere non poterit. Fateor quidem, exempla corporis callosi, ex morbo male affecti, sine ulla turbatione functionum animæ, aut sensus abolitione, non tam frequenter inveniri. Nemini autem facile mirum hoc videbitur, qui non ignoret, vix unquam corpus callosum posse affici sine omni injuria partium vicinarum & subiacentium. Huc accedit, quod diligentia observatorum hac in re nos deserat. Nimis pauceni sunt Wepferi, qui, quænam singulæ cerebri partes fuerint læsæ, accurate nobis tradant.

§. X.

Non parum infirmari mihi videtur dignitas corporis callosi historiis illis hydrocephalorum, quibus cerebrum enormiter sæpe fuit extensum. Eoque confidentius illis utor, quum in ægris La Peyronianis plerisque omnes funesti eventus, levi tantum præssione, sæpe fuerint tributi. Omnem fere fidem superat, quod narrat Tulpius (2), de puero quinquenni hydrocephalico, qui ad mortem usque gaudebat integris mentis muniis, cujus tamen cerebrum ab exuberante aqua ita fuerat distentum, ut, amissa figura globosa, in formam convexi fornacis redactum, instar alicujus crassioris membranæ adhæresceret undique arcuata ossium dissolutorum circumferentiæ. Confusa hæc cerebri intricati congeries jam tunc, uti refert Tulpius, suggestit multis inexpugnabile argumentum, adversus distincta illa loca, quæ nonnulli assignant cuilibet animæ facultati. Non multum abimilis est historia hydrocephali, quæ in bienni puella observavit

Ve-

(1) *Mem. A. R. S.* p. 217. *A.* 1741.

(2) *Obs. Med. l. I. c.* 24.

Vesalius (1) Augustæ Vindelicorum, quæ ad mortem usque sensibus integris est usæ. Aquæ vis erat collecta in dextro, sinistroque cerebri ventriculo, quorum amplitudo ita increverat, ut novem fere aquæ libras continuerint, cerebrum vero ita erat extensum, ut in capitis membranæ quasi modo esset tenue, & quodammodo continuum cum tenui sua membrana corpus, cum cerebellum interim, cerebrique basis universa secundum naturam se haberent, nullibi nisi in cerebri ventriculis aqua reperta. Confirmantur hæc exemplo pueri bimuli hydrocephalici (2), qui semper alacris, nunquam vexatus stupore, dolore capitis, defectu appetentiæ aut indigestione, nunquam ægrota- vit, nisi paucis diebus ante mortem, cujus in unoquoque cerebri ven- triculo laterali pinta aquæ fuit reperta. Apud Parisinos (3) extat si- milis historia duorum puellorum, qui, sine ulla convulsione aut de- fectu rationis, extincti sunt. Duo anteriores ventriculi & tertius erant una cavitas, quæ continebat tres mensuras aquæ, quas vocant *chopines*, substantia cerebri ad digiti minimi crassitiem redacta. Multo magis pugnat contra hanc sententiam, quod narrat Diemer- broeckius (4) de ægro, cujus in ventriculis cerebri anterioribus plus- quam semi-libra puris fuit inventa, qui nihilominus sanæ semper exitit mentis, motuque non fuit privatus ad mortem usque. Fieri non potuit, quin his in casibus corporis callosi fabrica summe fuerit turbata, sine ulla tamen mentis turbatione subsecuta.

§. XL

Sed majus vero pondus additur, iis, quæ dicta sunt contra sen- tentiam Lancisianam de corpore calloso, si afferri possint observa- tiones, quibus constitit, vitam, & sæpe sensum & motum per ali- quos dies superfuisse, corpore calloso aut plane destructo, aut ve- hementissime tamen læso. Morum certe cordis & respirationis inte- grum perstitisse, etsi corpus callosum una cum omni cerebro fuerit destructum, non adeo pauca docent exempla. Canis, cui Vieussenius (5), capite per superiora aperto, cerebrum totum ex calvaria exem- rat, per sex horas respiravit. Chiracus (6) evulsit cani cerebrum, qui nihilominus per aliquod tempus vixisse legitur. Canem per ho- ram vixisse, cerebro lamellatim excisso, testatur Peraulcius (7). Ea- dem fere experimenta repetiit Kavvius (8), qui canibus per fora- men ope trepani factum scalpello utriusque hemisphærii medullam diffregit. Omnes quidem muscoli his in canibus post alterum tertium, quantumque horæ minutum reddebantur paralytici, cordis tamen & res-

(1) De fabrica C. H. lib. I. c. 5. p. 24. (2) Phil. Trans. n. 256.
 (3) Anc. Mem. (4) Anat. C. H. lib. III. c. X. p. 394.
 (5) Neurogr. lib. I. c. XX. p. 123. (6) Phil. Trans. n. 226.
 p. 461. (7) Mécanique des animaux lib. II. c. 7.
 (8) Vid. Imperum faciens Hipp. pag. 257. seq.

respirationis actio pergebat, quas in cane ita relicto, post octavam horam superstitē, languidas se comperisse affirmat.

§. XII.

Cur autem immoremur hujusmodi observationibus, quæ vitam tantum vegetabilem perstitisse docent, cum interdum non solum sensus & motus, sed & ipsa vis cogitandi superstes fuisse legatur, corpore calloso vitiato? Multum in primis hic valet, ad confirmanda, quæ diximus contra dignitatem corporis callosi, historia feminae, quam nobis tradidit Wepferus (1), cujus capite aperto corpora striata & portio corporis callosi exulcerata, inæqualia & quasi lacera apparuerunt, ex abscessu ovi magnitudine in ventriculo dextro reposito. Illa tamen scœmina ad ultimum usque halitum accurate vidit & acute audivit; deliravit quidem per quoddam dies, ante obitum, tamen ad mentem rediit, hemiplectica quoad motum sinistro in latere, integro tamen sensu, tum in sinistra tum in dextra corporis parte, usæ est ad vitæ extremum. Similis extat historia apud Morgagnium, (2) inventa inter schedas a Valsalva relictas. Vir septuagenario major, nullo morbo laborans, nisi quod, per aliquot annos languidius incederet, in colloquiis tarde responderet, debiliq̃ue admodum visu esset, subito apoplexia correptus intra paucas horas examinatur. In ventriculis cerebri multus erat effusus sanguis. Sed vetustior causa, atque adeo locus, unde prodierat, in ipsa cerebri erat substantia, quæ alte erosa ad extimam usque superficiem cerebri & præterea in latum ad pugni dimidium inventa fuit. Hæc autem erosio thalamum præsertim nervi optici occupaverat, eumque dextrum. Non video, quomodo corpus callosum, thalamo incumbens, communem ruinam potuerit effugere. Maximi hic quoque videntur esse momenti experimenta in canibus, licet alium ob finem, instituta, quibus animalibus totum exentum fuit emisphærium, corpore calloso per omnem longitudinem discisso, ut nempe inde pateret, utrum in sano latere, an in vulnerato muscoli redderentur paralytici. Experimentum tale legitur in Commentariis (3) Academiæ scientiarum Bononiensis, a Cl. Molinello institutum, qui, cum sinistram cranii partem viventi cani aperuisset, resectumque cerebri lobum indidem penitus exemisset, adnotavit, sinistra in parte sensum & motum fuisse integrum, cum utrumque in dextro periisset. Auctores horum Commentariorum id ipsum confirmantes addunt, se scire, multos alios viros idem sumsisse experimentum, eodem exitu. Sed jam ante Molinellum, Petrus (4) eundem effectum observavit, & quod in primis ad rem nostram facita, affirmavit, experimentum nunquam successu carere, si corpora striata dissecantur, aut a cerebri hemisphærio

Suppl. Part. I.

O

phærio

(1) *Trat. de apoplexia hist.* XIV. p. 397. 401. (2) *Epist. Anat.* XIII. §. 19.

(3) *Tom. I. p.* 139. (4) *Lettre a un medecin.* I. Obs. 2.

phærio plane separentur. Qua ratione autem corpora striata possint a cerebri hemisphærio plane separari, intacto corpore calloso, omnino non video. Testatur præterea, canem, cui dimidium cerebrum exemerat, non statim mortuum fuisse. Magnam meretur attentionem observatio Chiraci (1). Exemit cani dimidium cerebrum, non ideo non potuit animal artus movere & ambulare: totum evulsit cerebrum, sed sensus & respiratio integra superfuert. Cur bestia non statim mortua cadit, dum domicilium animæ destruebatur? Omitto historias infantum sine cerebro natorum, etsi in quibusdam præter cordis & respirationis actionem quarundam aliarum partium motus fuerit interdum deprehensus.

§. XIII.

Hæc fere sunt, quæ adferre volui, ut experimentis meis eo facilius fides haberetur. Temerarium enim & in homine juvene non facile condonandum, mihi visum est, sententiæ, quæ viris, fama, & auctoritate pollentibus, fuit probata, experimenta quædam opponere, &, ut sibi credatur, ab aliis exigere, nisi simul, tum veritatem Anatomicam illis respondere, tum observationes aliorum eundem effectum affirmare, demonstraret. Quænam igitur utilitas corporis callosi, striarumque in illo apparentium, esse videtur? Opinio certe veterum, illud impedire, ne pituita in ventriculos defluat, nunc plane obsolevit. Verosimillimum est (2), principem illius usum esse, communicationem aliquam motuum forte & sensuum inter utrumque hemisphærium facere. Et Morgagnius (3) arbitratur, decussationem illam fibrarum, cujus ope fieri videtur, ut dextero cerebri latere læso, potius sinistri lateris nervi per totum corpus resolvantur, & contra, in primis in corpore calloso esse quærendam. Fibris enim illis medullaribus, quæ in rima, inter corpora pyramidalia descendente, ab uno latere in alterum sunt ductæ, parum tribuit, quæ illi secundum accuratissimas observationes transversæ potius (4), quam decussatæ esse videntur, ut putet, pro quibusdam quasi canalibus, ut vocant, communicationis esse habendas, per quos æqualis utrinque fluidi copia conservetur. Nec ad hanc explicationem faciunt fibræ, quæ in utraque annularis protuberantiæ crepidine, & præsertim in anteriore apparent, cum eæ non ad cerebrum, sed ad cerebelli pedunculos attineant.

§. XIV.

Progrediamur nunc ad explicationem aliorum phænomenorum, quæ mihi, dum experimenta caperem, notatu digna videbantur. Cum in

(1) Phil. Transf. n. 226. (2) Ill. Præc. Prim. lin. Physf. §. 398.

(3) Epist. Anat. XIII. §. 20. 21.

(4) Consentientem habet Ill. Præc. in Comm. Boerb. §. 269. n. d. p. 524. Prim. lin. Physf. §. 369. p. 186.

in omnibus meis experimentis, non corpus callosum solum, sed præter illud aliæ quoque partes, in primis vero semper medulla oblongata fuerint vulneratæ, inde quoque colligi posse puto, vulnera hujus partis, modo contingant sine magna effusione sanguinis, non tam subito esse lethalia, uti cum aliis Frid. Hoffmanno (1) in primis visum fuit, qui sedem animæ ibi collocatam esse arbitratus; vel minimam ejus læsionem subitam mortem adferre affirmat. Parisini (2) nonnulla habent exempla hominum, qui sanati fuerant, etsi medulla oblongata multum fuerit læsa globulo plumbeo, per superiorem orbitam in cerebrum ingresso. Alias cerebri partes, quæ meis in experimentis sunt simul vulneratæ, ut corpora striata, thalamos nerv. opt. &c. hæcenus omittere videtur. Observationes enim a Cl. La Peyronie (3) collectæ, tum Petiti (4), Valsalvæ (5), aliorumque experimenta satis manifesto docent, nec vitam, nec functiones animales statim tolli, partibus illis destructis & læsis. Cum ergo ex his omnibus elucescat, nec ulli singulari in cerebro particulæ monarchiam illam posse adscribi, nec maxima vulnera & abcessus late depasti lateralia cerebri hemisphæria, dum sensus integer superstes fuit, credere sinant, animæ sedem per omne cerebrum esse extensam; quid est cur dubitemus, sententiam sequi III. Præceptoris, (6) ubique nempe esse animæ sedem, ubi initium est nervi cujuscunque, ut omnium nervorum junctæ primæ origines efficiant verum sensorium commune?

§. X V.

Mirum mihi videbatur, canes, quibus instrumento sinus longitudinalis erat pertusus, non statim ob sanguinem effusum ex apoplexia esse mortuos. Uterque enim per plures horas supervixit, alter per 12., alter per 18., & posterior quidem semper alacris & vegetus. Nec adeo multus in ventriculis sanguis erat effusus, grumus vero sanguinis vulnus ad basin cerebri usque replebat. Non video, quid apoplexiam vehementissimam impedire potuerit, præter ipsum instrumentum cylindrica figura præditum, quod in vulnere reliqueram. Dura enim mater circa acum triquetrum sese constringens sanguinis effluxum sistere potuit. Rem autem revera ita sese habere, inde colligi potest, quod alter canis, quamprimum instrumentum fuerat extractum, in profundissimum soporem inciderit, pauloque post interierit. Negari tamen non potest, canonem illum, de lethaliitate vulnerum sinus longitudinalis, non tam late patere, ut non aliquam

O 2

exce-

(1) Oper. omn. Tom. I. sect. III. §. 12. p. 85. (2) Accad. des Chirurg. p. 312. seq. (3) Loc. cit. (4) Loc. cit.
 (5) Morgagn. Epist. Anat. XIII. §. 19. (6) Comm. Boerb. Vol. IV. §. 568, n. a. Prim. lin. Phys. §. 82. 83. Eadem est sententia Cel. Kavvii loc. cit. §. 344.

exceptionem patiatur. Non desunt enim exempla hujusmodi vuln-
rum sanatorum, quale refert La Motte (1), ubi, lata plaga per su-
periolem capitis partem inflicta, non solum sinus fuit apertus, sed
& ipse cerebri cortex vulneratus. Multo magis hic potest ad persua-
dendum historia, quam refert Marchettus (2), vulneris, quod dif-
fecto sinu longitudinali ad corpus callosum usque penetraverat, ne-
que lethale fuerat, hæmorrhagia fortissimis adstringentibus domita.
Sharpus (3) quoque testatur, bis se vidisse, hujus partis vulnera,
necem non attulisse. Eadem observatio pulsationem sinuum ex par-
te quoque refutare videtur. Nisi enim æquabilis fuisset sanguinis in
sinibus fluxus, & si sanguis nunc majori modo, modo minori im-
petu per sinus propelleretur, relictio instrumenti vix potuisset impe-
dire, quin sanguis, super corpus callosum effusus, subitanam apo-
plexiam produxisset, quæ tamen altero tum demum, postquam in-
strumentum fuerat extractum, est secuta. De sensibilitate medullæ
cerebri, & duræ matris inferius agendi locus erit.

TRanseamus nunc ad reliqua experimenta, circa cerebellum, du-
ram matrem, nervosque diaphragmaticos instituta. Omnia si-
mul afferam, cum interdum eodem in animale varia fuerint obser-
vata.

Experim. I.

Per partem inferiorem lateralem dexteram ossis occipitis, canis,
mediocris magnitudinis, adeg instrumentum *trois quarts* dictum, di-
rectione fere horizontali, eo usque, donec in os oppositum impin-
geret. Canis ab ictu statim paulum attonitus sensim tamen ad se re-
diit, magnosque edidit clamores. Factum hoc est vespere circa ho-
ram sextam. Cum altero die hora prima pomeridiana redirem, de-
prehendi canem vegetum, qui, ut a vicinis audivi, per omne tem-
pus multum latraverat. Cum viderem, animal hoc ex vulnere non
multum fuisse affectum, extraxi instrumentum, pertudique os occipi-
tis paulo superius in media illius parte. Vulnere hoc inflicto statim
apoplexia corripiebatur. Altero die reversus mortuum inveni. Cra-
nio aperto & cerebro exento, vidi vulnus die esterno illatum pene-
trasse inter tentorium & cerebellum ad basin crani. Omnia erant
plena sanguine coagulato, tum in basi crani, tum inter tentorium
& cerebellum, cum sinus quartus magno vulnere apertus esset. Vul-
nus vero primum illatum progrediebatur per ipsam mediam cerebel-
li substantiam ad latus oppositum. Facile patet, canem ex secundo
vulnere apoplecticum periisse.

Expe-

(1) *Traité de Chirurgie* Tom. II. Obs. 161. p. 343. (2) *Obs. med. chir.* 4.
(3) *Treatise of the operations of Surgery.* p. 142.

Experim. I I.

Instrumentum intrusi in mediam posteriorem partem ossis occipitis, ea directione, ut ictus antrorsum paulumque deorsum vergeret. Canis, etsi quodammodo stupefactus, nec motu tamen nec sensu carebat, ut irritatus ejularet. Altero die hora decima reversus, æque vividum deprehendi, ac priori die. Alio tunc vulnere perforavi cerebellum, instrumento adacto per ossis occipitis inferiorem lateralem partem, a sinistris dextrorsum, deorsum. Vesper hora sexta vitam adhuc trahebat, etsi languidissimam, omni sensu motuque privatus, superstitite tantum levissima cordis & respirationis actione. Quo viso, decrevi experimenta capere circa nervos diaphragmaticos. Thorace aperto, omnia cadaveris instar frigebant, respiratio tamen & cordis motus pergebat. Nervo diaphragmatico digitis fortissime compresso, & supra compressionem irritato, diaphragma constringebatur, ligavi nervum, supra ligaturam irritavi, nulla autem inde secuta est diaphragmatis concussio. Infra ligaturam vero irritato nervo, diaphragma contrahebatur. Amputavi nervum, abscissam partem irritavi, subsequuta semper diaphragmatis contratione. Idem observavi altero in latere. Constringebatur diaphragma, sive nervum sursum, sive deorsum stringerem. Aperto cranio vidi, vulnus priori vice infictum per medullas cerebelli substantiam in cerebrum usque penetrasse; alterum vero vulnus paulo inferius a latere per medullam cerebelli, transiens ventriculum quartum, ad latus capitis oppositum progressum esse. Ventriculus quartus grumo sanguinis repletus, & medulla spinalis undique sanguine circumfusa fuit.

Experim. I I I.

Eadem experimenta repeti in cane apoplectico, omnia phaenomena prioribus simillima. Quibus observatis, cor uno ictu excidi, quod in manu per quatuor minuta, quoties acie scalpelli fuerit irritatum, fortiter pulsabat. Projectum in aquam frigidam, palpitabat aliquoties, usque dum esset plane frige factum.

Experim. I V.

Ope trepani frusto orbiculari ex cranio capitis canis exsecto, ablata muscoli temporalis parte, duram matrem nudatam pupugi, irritavi mucrone scalpelli, infundi solutionem Mercurii sublimati, sed animal nullum plane signum dedit doloris, omnis convulsionis expers. Cum hanc ob rem canem apoplecticum putarem, irritavi cutem pendulam, ille vero, optime percipere, alto clamore testabatur. Motus duræ matris motui arteriarum synchronus fuit, quarum in diastole attollebatur, in systole subsidebat. Discissi dura matre, discepsi, pupugi, irritavi corticem. nullum doloris signum in animale apparuit. Intruso stilo ad medullam cerebri, canis ejulat, valde vero convelli non vidi. Quo magis evidens esset convulsio, liberavi

ravi vinculis canem. Ambulat per cameram, sed quasi ebrius & stupidus. Iterum immisi stilum in medullam, alte clamat, sed non convellitur, ambulare pergit. Paulo post per gyrum circumambulat per aliquot minuta, ut equi, qui molendinas movent, sæpe cadit, modo in hanc, modo in illam partem, erectus gyratim pergit ambulare. Post quædam minuta uno ictu concidit in terram, totoque corpore convellitur. Sublatus pedibus insistere non amplius potest. Tabulæ imponitur, omne corpus flectitur in semicirculum, musculis ex parte opposita, nempe sinistra, resolutis, verberatus ejulat. Stilum trajicio per cerebrum in cerebellum. Animal convellitur toto corpore, in primis autem opisthotono corripitur. Bis vel ter post aliquam quietem succutitur omni corpore, ut canes corpus succutere solent, qui in aquam injecti, terram rursus attigerunt. Sensim languidior factus, nullis verberibus, nulla irritatione potest excitari, & brevi post profundas respirationes moritur, convulsionibus & spasms paulo ante mortem cessantibus.

Experim. V.

Ex canis junioris cranio parte orbiculari trepano ablata, duram matrem, ut in priori experimento, scalpello irritavi & oleo vitrioli instillato, nulla plane deprehendi doloris signa, etsi oleum vitrioli proximas carnes, quas attingebat, depasceretur. Oleo vitrioli duræ meningi innatante, canis alacris, capite erecto huc & illuc circumspexit. Sanguis ex arteria magna duræ matris discissa undatim profluens impedit, quo minus experimenta circa ipsam medullam, instillando oleum vitrioli, potuerim instituere. Adegi scalpellum in cerebri hemisphærium dexterum, canis optime sentiens convulsus est. Intruso vero scalpello per cerebrum ad cerebellum usque, oriebantur omnibus in corporis partibus convulsiones horrendæ, ut nulla pars quiesceret. Cerebro per utrumque hemisphærium ad basin usque dissecto, & cerebello pene in pulpam rotato, cor per aliquot minuta magnis ictibus pulsabat. Per foramen cerebrum magna quantitate propellebatur.

SCHOLIA.

§. I.

AB eo inde tempore, quo Willisius, distinctas, animalitatis & vitalitatis provincias, primus proposuerat, dissensus semper fuit auctorum circa lethalitytem vitiorum & vulnèrum cerebelli. Willisianæ sectæ affectæ, vitia & vulnèra illa lethalia esse affirmantes, opinionem suam comprobare studebant observationibus quorundam, ut Viëssennii (1), Drelincourtii (2), Perraultii (3), Ridleyi (4), Boh-

(1) Neurogr. univ. l. I. c. XX.
des animaux. l. II. c. 7.

(2) Canicid. III.

(3) Mécanique

(4) Anat. Cerebr. Cap. XVII. p. 167.

Bohnii (1), &c. quibus constitit, cerebello læso, aut presso; statim fuisse actum de vita animalis. Alii ad refutandam hanc sententiam afferunt historias quasdam hominum & animalium, quibus cerebellum fuit vulneratum, insigniter pressum, aut plane destructum, vita satis diu superstita. Ne ergo hac in discrepantia auctorum, sola aliorum auctoritate nixus in alterutram transiisse sententiam viderer, optimum esse credidi, rem ad examen revocare, ipsique oculis meis, quæ doceant experimenta, intueri. Apparet autem ex iis experimentis, vitam superesse per multas horas, cerebello vehementer læso. Alter enim canis, cui cerebellum erat pertusum satis magno instrumento, vixit alacris per 12 horas, alter post duo inflata vulnera per 24 horas, etsi ultimis horis ob medullam spinalem sanguine oppressam languidissimus. In duobus aliis pergebat cordis & respirationis actio per horam fere, cerebello omni lacerato. Quæ phaenomena dum attendo, & cum aliorum observationibus confero, omnino me inde concludere posse videor, nervos organa involuntaria adeuntes non ex solo cerebello oriri. Collegi autem varias observationes cerebelli vulnerati, scirrhusi, compressi, corrupti, ablati, integerrimis tamen plerumque vitalibus functionibus. Non immorabor historiis illis animalium, quorum cor pergit moveri per aliquot horas, detruncato capite, cuiusmodi sunt Wepleri (2), Boylæi (3), Bartholini (4), aliorumque. Infinita enim exempla omnia in eo consentiunt, cor, etsi e corpore sit exemptum, vi quadam in se ipso recondita, motum continuare, interdum per horas usque, dum plane frigidatum fuerit. Alia adiunt enim, quæ multo plus exhibent. Attentione certe dignum est, quod narratur in *Philosophicis Transactionibus Anglicanis* (5): Chiracum nempe abstulisse cani cerebellum, qui nihilominus per 24 horas vixerit. Idem (6) testatur, alium canem vixisse per horam, evulso cerebello, postquam, respiratione cessante, aer in pulmonem inflatus erat. Petitus (7), parte cranii trepano ablata, immisso scalpello abscidit partem hemisphærii sinistri cerebelli, canis, qui, tribus demum horis exactis, post operationem mortuus est. Idem experimentum repetitum fuit altero in cane, qui per sex dies tali in statu vixit, respiratione bona & sensu semper gaudens omnibus in corporis partibus. Affirmat Idem Vir Cl. in multis aliis canibus eadem se phaenomena vidisse. Excitatus fuit hæc ad experimenta ab historia militis globulo plumbeo vulnerati, qui trajectus per partem sinistram cerebelli, penetravit ad lobum posteriorem hemisphærii sinistri cerebri. Mortuus est quadraginta tribus horis post acceptum vulnus. Respiratio per omne hoc tempus bona, pulsus non turbatus, sensibilitas toto in corpore super-

fuit.

(1) De Renunc. vul. p. 230. (2) De cic. aquat. p. 90.

(3) De utilit. Philof. exper. p. 114. (4) Epist. Cent. IV. ep. 92.

p. 521. (5) n. 226. (6) Ibid. (7) Lettere 11. a un Medecin.

fuit. Kavvius (1) immisso altius in medullam cerebelli scalpello, notavit, respirationem & cordis motum superfuisse post quartum quintumve minutum vario in diversis canibus tempusculo. Idem (2) adegit stilum per foramen magnum occipitis ea directione, ut transiens cerebellum, medullam oblongatam læderet. Animal dimissum hærente intus stilo salit per cameram cadens, subsultu erectum iterum decidens; aliud os (3) clamantis instar aperit, effectu tamen non sonoro, aliud vero sonitum satis altum edidit. Os (4), pollicis longitudine & dimidii pollicis latitudine, figuræ irregularis, invenerunt Parisini in cerebello epileptici. Nec plane desunt exempla cerebelli vulnerati, &, refragante licet opinione omnium fere Chirurgorum, feliciter sanati. Sic Veslingius (5), cum subsisteret Cairi in Aegypto, sanavit senem Abyssinum, cui acinace juxta lambdoidæam futuram vulnus erat inflictum, quod, utramque meningem pervadens, cerebellum ad duorum digitorum latitudinem stringebat. Nullius mali symptomatis fit ibi mentio. His non dissimilia in gravissimo vulnere Patavii se deprehendisse testatur. Similem fere narrat (6) Platnerus curationem factam a Chirurgo Argentoratensi Le Maire, in homine, cui non minima pars occipitis cum notabili portione corticis cerebelli fuit ense ablata. La Motte (7) refert, hominem convalescere sine febre alioque malo signo, cuius os occipitis a lapidis ictu collisum defecerat, & sanguis sub eo & sub dura matre ex ruptis arteriis effluerat. Cerebellum interdum, morbis pene inutile redditum fuit, vita satis diu superstiti. Legimus illud degenerasse in scirrhum, quale invenerunt Parisini (8), in puero per duos annos ante mortem stupido. Omnibus functionibus animalibus turbatis, pulsus tamen erat regularis, etsi parvus, respiratio debilis & frequens. Dissecto capite apparuit cerebellum cum dimidia parte, posteriore medullæ oblongatæ scirrhum, in massam quandam albam, homogineam, concretum. Paucos demum ante annos observavit Ven. ac Ill. Præc. (9) in puella sex fere annos nata, quæ stipem ostiatim petere solebat, scirrhum enormem duarum utrinque unciarum diametro, in quem tota aut medullaris aut corticalis substantia cerebelli degeneraverat. Harderus (10) reperit in cerebello puellæ, per quosdam ante mortem dies summa cephalalgia vexatæ, tres scirrhos, globulorum instar tangendos, quorum unus erat nucleus myristicæ magnitudine. Similem vidit morbum Lancisius (11) in

ce-

(1) L. c. §. 326. (2) Ibid. §. 327. (3) Idem phenomenon a me fuit observatum in cane, cui cerebrum erat laceratum, stilo, uti hic contigit, intus hærente. (4) M. A. R. S. 1737. bist. 8. (5) Obs. Anat. & epist. postb. n. XIII. p. 84. (6) Instit. Chirurg. §. 547. p. 344. (7) Chirurg. Tom. II. p. 322. (8) Mem. A. R. S. 1705. n. 13. p. 56. (9) Phil. Trans. n. 474. (10) Apian. Obs. p. 238. (11) De noxiis paludum effluviis. I. II, epid. III. c. VI. p. 218.

in cerebello hominis, motibus convulsivis obnoxii. Apparuit nempe corpus quoddam durum, album, latum duos transversos digitos, & longum tres, ex pluribus glandulis compactum, nonnullis con-
 vestitum membranis. In *Eph. Nat. Cur.* (1) occurrit historia pueri hydrocephalici, cujus cerebellum repertum fuit induratum cum dura matre & cranio cohærens, nulla cavitate superflite. In eodem libro (2) legitur alia observatio cerebelli putrefacti, corpusculis glandulosis scatentis. Aeger hic periit convulsus. Cl. La Peyronie (3) describit tumorem durum in ventriculo quarto hærentem, ovi gallinæ magnitudine, occupantem locum cerebelli, quod in laminam tenacem, lineam crassam, redactum, tumorem involuebat. Aeger, paucis ante mortem diebus, convulsionibus correptus ad extremum usque halitum usus est functionibus animæ integris, sensuque exquisito; nec respiratio, nec cordis actio turbata fuisse legitur. Brisseau (4) habet observationem tumoris duri, ovi columbini magnitudine, siti in medio cerebello. Homo (5) moritur peripneumonia, antea sinistro in latere paralyticus. Inter duram matrem cerebelli dextro in latere, & os occipitis, inventæ sunt duæ drachmæ sanguinis jam putridi. Adolescens in capite percussus die post vulnus inflictum undecimo moritur. (6) Resecto cranio inflammata appaerere meninges, & cerebellum corruptum. Nunquam febricitavit, nunquam deliravit, nisi paucis horis ante mortem. In cerebello hominis phrenitide & convulsionibus subito mortui, repertus fuit abscessus, scatens humore pallide flavo. (7) Huc quoque pertinent historiæ (8) infantum, qui per aliquot dies vixerunt, etsi cerebrum & cerebellum plane defuerit. Adde his aves, resecto capite incidentes, narrante Entio (9), Saario, Albino (10), Kavvio (11). Animalia imperfectiora plane omitto, de quibus multo magis mirabilia narrantur. Excusabunt, spero, lectores hanc compilationem non vanæ ostentationis gratia, sed eo in primis animo factam, ut manifesto pateret, vulnera & vitia cerebelli non solum non esse lethalia, sed etiam ne turbari quidem motus organorum vitalium, etsi viscus illud plane sit destructum. Hæc fuit causa, cur in allatis observationibus in primis attenderim ad motum cordis & respirationis. Non adeo mirum tamen hoc nobis videbitur, si consulamus Anatomen, quæ do-
 Suppl. Part. I. P cet,

(1) *Dec. III. An. IV. p. 148.* (2) *Dec. II. An. IX. p. 429.*
 (3) *Mem. A. R. S. 1741. p. 208.* (4) *Observ. III. p. 27.*
 (5) *Morg. Epist. Anat. XIII. §. 23.* (6) *Bonet. sepulcret. Anat. l. IV. sect. XII. p. 561.* (7) *Ibidem l. I. sect. XIII. obs. XI. p. 324.*
 (8) *Vid. hujusmodi exempla in Misc. Cur. An. 3. p. 120. Misc. Med. Phys. Gall. An. 3. p. 54. Eph. Nat. Cur. Dec. I. An. III. Observ. 179. p. 207. Phil. Transf. n. 226.* (9) *Op. omn. p. 553.* (10) *Eadem sine dubio cum Albiniana est historia, quam refert Auctor libri: l'homme machine p. 73.* (11) *Libro sapius citato. §. 331.*

cet, maximos (1) & plurimos, cordis & organorum respirationi interservientium, nervos, provenire a medulla spinali, quibuscum, si conferantur rami intercostales & octavi paris, ad organa vitalia tendentes, videbimus, affirmari posse, maximam partem liquidi nervosi vitalis venire ex medulla, parvam ex cerebro & cerebello. Confirmatur hæc sententia funesto eventu vulnerum medullæ spinalis.)

§. I I.

Si allatas cerebelli læsi observationes attendamus, non solum inde patet, vitalitatis sedem non esse quærendam in cerebello, sed confirmari quoque videtur sententia eorum (2), qui in ipsius medullaribus cerebri substantiæ vasculis anastomosis agnoscunt. Nisi enim ad hujusmodi inosculacionem confugiamus, non video, qua ratione possit explicari, quod illæ partes, quarum nervi ex ipsis pedunculis cerebelli prodeunt, ex destructione tamen hujus visceris nullo modo fuerint male affectæ. Nec sufficere videtur responsio, omnes nervos habere fibras & a cerebro & a cerebello. Etsi enim inde sequatur, partes illas non plane posse privari omni affluxu liquidi nervei, fieri tamen non posset, quin illarum actio multum turbaretur, destructis omnibus fibris ex cerebello venientibus, nisi fibræ ejusdem nervi in ipsa cerebri medulla anastomosis haberent cum aliis fibris nerveis, cujus ope defectus liquidi nervei ex cerebello venientis posset compensari. Evidentissime hoc in primis apparet in nervo quinto. Oritur ille ex pedunculis cerebelli, nec olfactum tamen, nec gustum, nec ullam partem aliam, ad quam hujus nervi rami tendunt, in illis hominibus, qui cerebello scirrholo laborabant, vitiatam fuisse legimus: id quod tamen necessario fieri debuisset, nisi lateralia adessent vascula communicantia, per quæ fibræ, quæ prius vehebant liquidum in cerebello secretum, nunc spiritus ex promptuario cerebri possent recipere. Nec repugnat hæc sententia rectitudini illi fibrarum, cujus supra mentio fuit facta. Possunt enim fibræ ab origine ad finem usque indivisæ decurrere, & nihilominus per canales laterales inter se communicare.

§. I I I.

Pauca sunt adicienda circa experimenta in nervis diaphragmaticis capta. Apparuit nempe, si nervi, tum ligati, tum abscissi, irritentur infra ligaturam & infra amputationem, diaphragma manifestissime constringi. Observatum id jam video a Syvammerdamio (3), ranæ musciculum cum nervo excisum, si nervus pungatur, convelli

(1) Conf. Ill. Prac. Prim. lin. Phys. §. 94. (2) Kavvius in primis, placere sibi hanc sententiam, testatur in libro sapius citato. §. 323. Nec ab illa esse alienum Ill. Morgagnium, patet ex ep. XIII. §. 21.
(3) Bibl. nat. p. 839.

Velli & fines adducere. Affirmat Petrus (1), diaphragma contrahi, si nervus diaphragmaticus abscissus irritetur. Simile cepit experimentum I. B. Du Hamel (2), pungendo nervum abscissum ranæ. Nervo in moribundis canibus irritato, musculos vidit convelli (3) Stenonis F. Ex his colligi posse videtur, quod jam tunc suspicatus est Cl. Du Hamel, ipsis nervis, etsi omne cum cerebro commercium sit interceptum, inesse irritabilitatem, sive vim illam excitandi motus, si irritatio quædam accesserit. Est hæc vis illa, quam insitam esse invenerunt summi nostro ævo viri (4), non solum omnibus fere partibus corporis animalium, sed & vegetabilibus quibusdam, quæ tamen in irritabilitate summum discrimen, quod intercederet inter animalia & vegetabilia, ad nostra usque tempora est quæsitum. Et certe, si aliquid in toto medicinæ ambitu meretur attentionem, hoc ipsum est. Ubi sunt limites, si irritabilitas auferatur, qui ponantur inter regnum animale & vegetabile, ne utriusque fines extremi inter se confluant, cum alterum distinctionis signum a propagatione specierum petitem, a polypis jam fuerit sublatum? Multum autem in primis facit vis illa ad explicationem quorundam, quæ in C. H. contingunt, phænomenorum (5). Addiscere enim inde quodammodo possumus, quæ ratione motus quidam fieri possint in corpore nostro, non solum, quando anima imperium non exercet, sed tunc etiam, quando mutatio nervi ad sensorium commune usque non perfertur. Quando hæc minutius meditor, & simul considero historias illas animalium, quæ cerebro aut absente, aut destructo, aut una cum capite abscisso per aliquod tempus respirasse leguntur, dubitatio mihi venit in mentem, annon perpetua alternatio respirationis inter motus, qui sine animæ imperio ex sola irritatione nervorum fiunt, referri mereatur. (6) Huc accedit, quod fœtus in lucem nunc editi, non ineptius, organis respirationi inservientibus, utantur, quam adulti, qui exempla viderunt. Quis autem docuit fœtum recens natum respirare, quum omnes idæ adveniant per sensus, nemine fere a Lockio dissentiente? In primis multum hic valent observationes illæ, quibus docemur, respirationem non solum continuari in summe apoplecticis, sed etiam, postquam per sat longum tempus fuerat intercepta, posse restitui ex sola irritatione nervorum nasalium in suffocatis aut aqua submersis, quibus cor jam desit pulsare. Omni tempore, medici sese torserunt, quæ ratione tot muscoli possint agere sine animæ imperio, in quos tamen anima, quoties velit, imperium possit exercere. Actum agerem, si varias illas opiniones circa cau-

(1) Lettre a un medecin. II. p. 21. (2) Hist. A. R. S. 1700. obs. 12.
 (3) Myol. spec. p. 78. ed Bat. (4) Vid. Dissert. de irritabilitate, quæ prodiit nuper Lugduni Bat. Conf. præterea Ill. Præf. Comm. Boerb. Vol. IV. §. DC. n. a. p. 586. (5) Conf. hic in primis diff. cit. de irritabilitate. (6) Innui idem jam videtur cit. diff.

sam alternæ illius perennitatis hic vellem enumerare. Conferantur hac de re in primis Ill. Præceptoris *Commentarii Boerhaviani* (1), qui non solum omnes theorias attulit, sed etiam, quam infirmis nitantur fundamentis, optime demonstravit. Si ulla tamen explicatio, quæ aliquam huic phænomeno possit lucem accendere, sperari debeat, a stimulo certe illa petenda esse videtur. Ut res fiat clarius, exemplo illam illustrabimus. Videmus in sternuatione irritato nervulo quoddam secundi rami quinti paris, irritationem statim propagari per omnes intercostalis trunci ramos, (qui nervus maxima ex parte ex eodem secundo ramo quinti paris oritur) (2), & musculos respirationis post magnam inspirationem ad fortissimam expirationem convelli, nervis eorum in consensum tractis, qui cum intercostali communicant. Nec adeo multum me terret objectio illa, sternutationem esse morbum, esse motum convulsivum, respirationem verum esse motum sanum, naturalem. Sufficit demonstrasse, nervulo uno irritato, musculos multos, a nervo irritato remotos, in motum trahi posse. Simile quid fieri videtur in actione respirationis. Certum est, & post inspirationem & post expirationem, sanguinem difficiliter per pulmonem circumagi, anxietatem quandam oriri, vasa magna sanguine stagnante distendi, adeoque illorum nervos, ut & pulmonis & cordis; non satis facile sese evacuantis, moleste affici. Num adeo absona est opinio, horum nervorum irritationem ope intercostalis transire in nervos musculorum respirationis, unde perennis illorum motus oriatur? Actio autem horum musculorum in respiratione eo minor est actione eorundem musculorum in sternutatione, quo minor est irritatio illa nervorum pulmonalium & cardiacorum; (quæ in homine sano & bene respirante ne quidem sentitur) irritatione maxima nervorum nasalium in sternutatione. Non quidem ignoro, plurimos nervos pulmonum oriri ex parte octavo. Sed præter (3) nervulos a plexibus cardiacis cum magnis vasis accedentes, par octavum & intercostale vario modo inter se communicant. Multa quidem hic restant obscura, nec spes est, problema hoc unquam ita solvi posse, ut non semper quædam adsint, in quibus medicorum ingenia possint sese exercere. Notandum hic præterea esse putavi, me non satis esse persuasum de veritate illius hypotheseos, omnem consensum fieri, unice intermedio sensorio communi. (4) Neque enim hac cum sententia conciliare observationes illas infantum

(1) Vol. V. P. I. §. DCXIX. n. c. (2) Debemus hoc inventum nobilissimum industria Cl. Meckelii, qui in *dissert. sua utilissima*, de quinto pare nervorum cerebri, §. LXV. hanc veram intercostalis originem non solum accuratissime descripsit, sed etiam addita elegantissima figura ob oculos nobis posuit. (3) Ill. Præs. Prim. lin. Pbyf. §. CCLXXIII. (4) Quæ sententia in primis arridet Cel. Kavvio. Vid. lib. sapius cit. §. 197. 198.

tum sine cerebro viventium, nec video, quem in finem natura tot fecerit anastomoses nervorum, illisque (1) interdum canales per durissima ossa formaverit, si nervi nusquam directe inter se consentiant.

§. I V.

Adgredior nunc quæstionem illam de sensibilitate duræ matris; qua in re ab omnibus fere Anatomicis mihi est dissentiendum. Omnes enim fere ad nostra usque tempora pro indubitato habent, duram matrem sensu præditam esse satis exquisito. Perducti hoc ad credendum fuisse videntur, alii, qui spiritus nerveos statuunt, quod sibi persuadent, illam membranam, quæ contineat sensilissimam nervorum medullarem substantiam, non posse non accuratissime sentire; alii vero, quod duram matrem originem omnium toto in corpore membranarum esse putent, quas omnes summe sensiles sibi fingunt, permoti exemplo periostrii. Quid? quod Baglivius (2), & alii, in primis ex Stahlianæ sectæ, solum systema membranarum sentire affirmant, exclusa medulla. Ut vero sententiæ illi, duram matrem summe esse sensilem, robur addatur, afferunt experimenta Pacchionii (3), & Baglivii (4), qui tradunt, canes, dura matre acu aut spiritu quoddam acri irritata, ejulasse, vehementer sese distorsisse, motibusque convulsivis fuisse correptos. Nervos, qui irritationem ad sensorium commune perferrent, primum neglexerunt, arbitrati duram meningem nervis non indigere, quæ illis ipsis vim sentiendi suggereret, & mirum est, quomodo Pacchionius (5), qui postea cohortem nervorum obtrudere nobis voluit, sese torqueat, ut demonstret, improbable esse, nervos in duram matrem abire. Postquam autem ad illos indagandos accesserunt, nervi duræ meningis ubique occurrebant. Sic Vieussenius (6), & Winslovius (7) furculos nerveos deducunt a pari quinto, excurrentes ab hoc nervo, dum per sinum cavernosum, ut illi putant, transit. Ridleyus (8) tribuit duræ matri nervos, ab anteriori ramo quinti paris ortos. Nervulum ex dura portione septimi ortum per fissuram aquæductus Fallopii in cranium retrogradi, & plurimis furculis partim in duram matrem, partim in nervum quintum diffundi, credit Valsalva (9). Nec ab hac sententia prorsus est alienus Ill. Morgagnus (10). Sed jam ante

-
- (1) e. g. canalus nervi Vidiani per apophysin pterygoideam, fissura aquæductus Fallopii in canaliculum continuata via chordæ tympani per os petrosum. Conf. Cl. Meckelii diss. cit. §. LXIII. LXIV. n. m.
 (2) Opp. omn. specim. de fibra motrice l. I. c. V. Coroll. IV. p. 287.
 (3) Opusc. Anat. de dura Meninge c. V. (4) l. c. p. 277.
 (5) l. c. p. 50. (6) Neurogr. univ. p. 170. depingit illos Tab. XXII. lit. a. a. (7) Expos. Anat. Tom. III. p. 147. n. 28.
 (8) Anat. Cer. p. 6. (9) Trat. de aure humana cap. III. §. X.
 (10) Epist. Anat. XII. §. 31. 35.

te Valsalvam idem docuit Vieussenius (1). Simoncellius (2) fingit; nervum mollem ex labyrintho in cerebrum & duram matrem redire, illasque in partes pluribus furculis disseminari. Alias minutissimas nervi auditorii propaggines ab interiori ossis petrosi facie in duram matrem pergentes habet Pacchionius (3). Idem (4) memorat filamenta nervea ex medulla oblongata in duram matrem dispersa, quæ frequenter se vidisse testatur Ill. Præc. (5) Ab octavo pari quidam dicti sunt D. Lieutaud. (6). Ab accessorio deducit quosdam Cel. Senac. (7) Alios habet Pacchionius in ipso libro extricatu difficillimos. Quibus rationibus permoti Celeberrimi in arte Medica Viri (8) eo usque sunt progressi, ut ipsi medullæ cerebri sensum denegantes omnes dolores capitis solis integumentis quærendos esse putarent. Sed videamus, an omnia hæc nunc a nobis allata tanti sint roboris, ut nihil contra illa possit responderi. Etsi omnes fere Anatomici nobis refragentur, La Motte (9) tamen in sententiam nostram inclinat, cujus judicium non dubitem, centenis aliis anteferre. Illum enim summi Medici hanc in primis ob causam magni faciunt, quod nunquam a vero ad præconceptam hypothesein detorqueri se patiatur, omniaque, quæ illi observata fuerunt proficua vel noxia, candide enarret, ut nec errores dissimulet. Alii autem, si forte in rem præjudicatæ opinioni refragantem incidant, illam negligunt, fallacia quadam se decipi suspicantes, nec adserta observationibus superstruunt, quæ verissime tamen concludendo inde elici queunt. Accidisse illud in primis hac in re videmus. Plurimæ sane docent observationes (10), ossicula & squamas ossis divulsas duram matrem perforasse, lacerasse, nec ægrum de dolore fuisse questum. Sit instar omnium experimentum Petiti (11), qui cani malleo cranium ita diffregit, ut plurimæ festucæ duræ matri paululum inflammatæ infixæ hærent. Animal per octo dies semper bene sese habuit, nisi quod ex latere opposito paralyticum appareret, quietum jacuit, avide, quæcunque offerebantur, comedit, nec ejulavit, nisi per paucas horas ante mortem. Cur animal nullum plane edit signum doloris, si dura mater tam exquisitè sensilis est? Quam atrox est dolor, quando festucæ cuti, aut periosteio infixæ hærent? Quid vero dicimus de experimen-

(1) l. c. l. III. c. III. p. 176. (2) Conf. Ill. Heister. Comp. Anat. n. 62.
 (3) l. c. p. 148. (4) *ibid.* (5) Comm. Boerb. Vol. II §. CCCI. n. 4, (6) p. 388. (7) Comm. Comp. Anat. Ill. Heist. p. 612. (8) Galen. de locis affectis lib. III. cap. 13. Ed. Charter. Tom. VII. p. 448. Duret. in Coac. Pranot. Hipp. p. 87. Wepfer. de affect. cap. obs. LX. p. 174. Nec displicet hæc sententia Ill. Sömmerring. Comm. apb. 267. p. 435. 436. (9) Chirurg. Tom. I. p. 56.
 (10) Quales vide apud Tulpium lib. I. cap. I. Ill. Mem. de Acad. de Chir. p. 316. 317. 320. obs. VII. 327. obs. XI.
 (11) l. cit. p. 10.

rimentis Baglivii & Pacchioni? Quædam certe in illis sunt phænomena, quæ cum aliorum observatis adeo plane non possunt conciliari, ut multum de robore argumentorum, quæ illis inniuntur, decedat. Cum enim illi, irritata dura matre, canem statim convelli affirmant, mirum sane est, quod nec Ridleyus (1), nec Drelincourtius (2), nec Amstelædamenses (3), nec Kavvius (4), nec Petitus (5), nec alii ulla convulsionis signa, læsa dura matre, deprehendere potuerint. Anton. de Heyde (6) assert observationem duræ meningis in cane vulneratæ, & sine gravibus symptomatibus curatæ. Ridleyus quidem & Kavvius, canem signa doloris dedisse perhibent. Illius tamen verba „canis perforationem acute persentiscere videbatur,, satis demonstrant, illum dubium incertumque fluctuare. Nimis autem facile hujusmodi experimenta possunt turbari, ut nunquam plane persuasi esse possimus; utrum canis ab irritata dura matre, an ab alia parte læsa, ut cute, pericranio, dolorem percipiat, cum e contrario observatio vix fallere posse videatur, qua constitit, canem alacrem, qui levem tantum puncturam cutis, acute se sentire testatus est, irritata dura matre acu & oleo vitrioli, nullum doloris indicium exhibuisse. Argumenta vero, quæ a nervis duræ matris desumuntur, tam infirmis & vacillantibus nituntur fundamentis, ut illis sane moveri non deceat. Illi enim nervi ita sunt incerti, ut Auctores nullibi minus inter se consentiant. Nervos a quinto pari nec Ill. Præses (7), nec Cl. Meckelius (8) invenire potuerunt, licet uterque omai studio in illos inquisiverit. Sic quoque de nervo illo, quem Valsalva per fissuram aquæductus Fallopii in cranium regredi putavit, accuratissimis observationibus Cl. Meckelii (9) meliora sumus edocti. Ille enim neque ex duro oritur, neque plurimis furculis in duram matrem diffunditur, sed ex nervo Vidiano, in cranium regresso, ortus, sub ramo tertio quinti paris, & sub dura matre extrorsum, sursum & retrorsum tendit, & per dictam fissuram nervum durum septimi paris adit. Simoncellium nihil aliud vidisse nisi eundem nervum, de quo modo diximus, & reliqua ex ingenio fuisse addita, Ill. Præc. jam docuit (10), idque tum ex Pacchioni ad Fantonium epistola (11), tum ex Valsalvæ posthumis (12) satis superque apparet. Nervi ex octavo pare Dm. Lievtaud, neque Ill. Præc. neque Ill. Winslovvio, neque ulli alteri Anatomico unquam visi sunt, ut de eorum veritate merito dubitare liceat. Surculi ex accessorio in duram matrem abeuntes oculis summorum ævi nostri Anatomicorum,

-
- (1) Phil. Transf. n. 287. (2) Canicid. V. (3) Colleg. priv. l. 44.
 (4) l. cit. § 325. (5) l. c. p. 10. (6) Obs. Med. XIX.
 (7) Comm. Boerb. Vol. II. §. CCLXXX. n. 4.
 (8) Diss. cit. §. XXXIII. (9) Ibid. §. LXIV.
 (10) Comm. Boerb. Vol. IV. §. CLXIV. n. 4. (11) Op. p. 147.
 (12) Tract. de aere hum. p. 133.

rum, Morgagnii, Santorini, Winslovii, Ill. Præsides vix subtrahere sese potuissent, apud quos tamen omnes de illis altum est silentium. Ill. Huberus (1) quidem mentionem facit quorundam filamentorum ab accessorio in duram matrem discedentium. Ita tamen de illis loquitur, ut facile pateat, se non plane de veritate hujus rei esse persuasum, cum aperte fateatur, se tantum credere, illa in dura matre infusi. Filamenta ex medulla oblongata in duram matrem abire, nemo vidit. Reliqua huc pertinentia, ut in ipso Pachioni libro sunt obscurissima, ita nullius plane Anatomici testimonio possunt confirmari. Quæ cum ita sint, aut ego plurimum fallor, aut valde improbabile videtur, duram matrem esse tam exquisitè sensilem, sine ullo nervo certe visibili, cujus rei nullum in C. H. habemus exemplum. Qui autem affirmant, duram matrem non posse non acute sentire, quod substantiam cerebri medullarem contineat, cogitent, quæso, nullibi duram matrem immediate medullam cerebri contingere, sed ubique fere, iis certe in locis, ubi experimenta capiuntur, & dolores percipiuntur, corticem esse interpositum. Quis autem cortici tribueret sensum, qui meris constat valculis, & dum in fungum excrescit, sine dolore abscindi, immo medicamentis rodentibus potest auferri? Nec minus ignavum est argumentum, quod petitur a conjunctione duræ matris cum omnibus corporis nostri membranis. Etsi enim negandum non sit, periosteum esse illius propages, minime tamen idem potest affirmare de reliquis membranis; & summi ævi nostri viri monent (2), non esse omnem membranam productæ duræ & piæ matris per nervos adlatæ pro involucri, expansionem, sed singularem organicam ex fibris intertextis constare membranam peritonæi, pleuræ, pericardii, cutis, aliarumque partium, in quibus omnibus ordinantur nervi, diversimode pro sensu & motu vario, nudati tamen ab involucri suis, priusquam officio fungatur, qui cum in primis maximo numero abeat in periosteum, non mirum est, exquisitam illorum esse sensibilitatem. Sed si concederemus, omnes corporis membranas a dura meninge oriri, cujus magni erit adversarii usus, cum argumentis recentiorum, in primis Boerhaavii (3), & Ill. Præsides (4) plane fuerit evictum, sensationem non fieri ope membranarum, sed spirituum nervorum. Nonne autem dolores capitis phreniticorum satis aperte sensibilitatem duræ matris demonstrant, cujus inflammationem Celeberrimi in arte Medica Viri (5) causam proximam phrenitidis vere constituunt? Fateor, me hac objectionem non moveri, ut sententiam meam deferam.

(1) *Trat. de medulla spinali* §. IX. p. 17. 18. not. 9. (2) *Vid. Kavvii*
Trat. de perspirabilitate Hipp. cap. XXVIII. (3) *Instit. Med. §.*
284. 285. (4) *Comm. Vol. II. §. 284. n. b.*
 (5) e. g. Boerb. in *apbor. 776. illius Commentator Ill. van Swie-*
ten. Tom. II. p. 605.

ram. Nondum enim plane sum persuasus de veritate illius asserti, semper hunc morbum ab inflammatione meningum produci, secutus hac in re viros summos, Willisium (1), & Bonetum (2), quorum uterque affirmat, se sæpius vidisse in dissectione cadaverum meninges inflammatas, nec ægros phrenesi, sed affectu quodam soporoso perisse. Præterea habentur apud Bonetum (3) plurima exempla phrenitidis sine ulla meningum inflammatione. Corticem autem hoc in morbo esse inflammatum, nemo facile negabit, & ipsa Boerhaviï observatione (4) rem ita sese habere constitit. Cum vero ille sit medullæ cerebri sensibilissimæ continuus, fieri non potest, quin vasculis illius sanguine inflammato distentis, medulla ipsa sensibilissima male afficiatur.

§. V.

Hic autem objici mihi posse video, summos esse viros, qui dubitent, an plane possit affirmari, ipsam cerebri medullam dolere. Præter illos, quos supra jam nominavimus, invenio Rowhaultium, (5) Mauritium Hofmannum (6), aliosque, qui eadem fiat in opinione, & ipse Ill. Syvietenius (7) tradit, quamprimum læsa fuerit medulla, tunc statim convulsionibus omnia sic turbari, ut, an simul dolor adsit, non possit determinari. Qua in primis ratione sum permotus, ut in omnibus meis experimentis accurate attenderem, an canes, dum instrumentum per medullam cerebri trajiciatur, doloris indicium exhibent. Omnes autem, quotquot vulneravi canes, læsa medulla maximum se dolorem percipere, misero ejulatu sunt testati. Et video idem fuisse observatum, tum in Ridleyi (8), tum in Kavvii (9) experimentis. Ille enim aperte docuit, canem, specillo profundius adacto, sensus dolorifici indicia maxima dedisse, & hic affirmat, in omnibus suis canicidiis ejulatum fuisse deprehensum. Num autem assertum illud, omnem læsionem medullæ statim subsequi convulsiones, experientia satis confirmatur? Si conferantur illa, quæ apud Bonetum (10), aliosque observatores habentur, plurimis exemplis constabit, abscessus fuisse deprehensos in ipsa substantia medullofa cerebri post diuturnum capitis dolorem mortuorum, qui tamen nunquam per omnem morbi decursum convulsionibus correptos fuisse leguntur. Non solum autem illud contigit in vitiis cere-

Suppl. Part. I.

Q

bri

(1) De anima brutorum p. II. c. X. p. 429. (2) Sepulcret. Anat. lib. I. sect. VII. obs. I. p. 187. (3) Obs. VII. XIII. XIV. XV. XVI. Additam obs. (4) Ill. van-Swvieren. Comm. §. 775. p. 604. (5) De la tete p. 60. (6) Idea Machinæ hum. p. 232. (7) Comm. aph. 267. Tom. I. p. 435. (8) Phil. Transf. n. 287. (9) Imper. fac. Hipp. §. 327. (10) Sepulcr. Acad. lib. I. Sect. I. Obs. 47. 48. 50. 53. 61. 63. & c. Mem. Acad. Cbir. p. 324. 325. Mem. A. S. R. 1741. p. 202. n. c. f. p. 206. & c.

bri chronicis, sed plurimæ etiam extant historiæ læsionum medullæ subitarum, sine ulla subsequuta convulsione. (1) Sed illa sententia, medullam cerebri non dolere, adversari videtur omni Anatomicorum de nervis doctrinæ. Omnes nunc fere in eo consentiunt, (si morosiores quosdam excipias, qui, cæco hypothesis amore ducti, nunquam opinionem, quam semel sunt amplexi, deserent), nervos esse continuos medullæ, illamque solam esse medullam, quæ sentiat. Videmus præterea variis in locis cerebri tractus medullares diversissimos (2), qui nervis adeo sunt similes, ut facile appareat, solam vaginam membranaceam iis deesse. Medulla reliqua, ubi nullæ striæ apparent, a lacertis illis fibrarum collectarum in fasciculos nullâ ratione differt, omni habitu simillima. Num autem medulla cerebri, quamprimum in nervos fuerit continuata, aliam naturam induit, ut eædem fibræ alio in loco sensu gauderent, in altero vero illa vi sentiendi plane destitutæ? Nec illa objectio ullius momenti est, functiones animæ turbatum iri, si in ipso illius palatio, ubi menti ideæ repræsentantur, sensatio fieret. Hoc enim tunc demum esset metuendum, si sedes animæ per omnem cerebri medullam esset extenta. Aliter autem sese rem habere, animamque tantum habitare in junctis omnium nervorum primis originibus, supra jam demonstratum esse videtur.

§. VI.

Verum ut ab isto diverticulo in viam redeamus: Etsi argumenta contra sensilitatem duræ matris allata sufficere posse videantur, illis tamen multum accedet roboris, si consideretur dura meninx tanquam cellulosa fabrica densa, compacta, constans fibrilis arctissime stipatis, quantumcunque firma & solida videatur, quæ tela cellulosa per omnem corporis ambitum sensus est experta, nisi nervi per eam decurrant. Multa autem sunt, quæ illud suadeant. Constat experimentis, duram matrem brevi maceratione in flocculentum omnino cellulosumque habitum, æque ac alias membranas, abire. (3) Nec refutare possunt hanc sententiam fibræ illæ duræ meningis. Nam regularitatem illam & pulchritudinem, quam descripsit, & figuris Pachionus exhibuit, nec Ill. Præses (4), nec alii recentiores Anatomici (5) videre potuerunt. Confusæ sunt, variæ intricatæ, per omnem duram

(1) Conf. Mem. Acad. Chir. p. 314. 315. 316. Petit. lettres a un Medecin. Wepfer. de apopl. p. 225. bist. XII. p. 365.

(2) Conf. Ill. Præs. Comm. Boerb. Vol. II. §. CCLXX. n. b.

(3) Vid. Cl. Schobingeri, amici mei dilectissimi, Diss. Inaug. de tela cellulosa in fabrica C. H. dignitate §. LXVI.

(4) l. c. Vol. II. §. CCCIV. n. d.

(5) e. g. Winslow. l. c. Tom. IV. §. 48.

duram matrem sine ullo ordine sparsæ. Nec facile video, qua ulla ratione ab aliis membranis, ut peritonæo, pleura, pericardio differat, adeo, ut non dubitem, duram matrem eadem fortasse ratione fuisse formatam, ut illæ factæ fuisse videntur. Valde enim probabile est, in tenero foetu ambiisse cerebrum meram glutinosam, sensim cellulosam factam substantiam; partem internam perpetua pulsatione arteriarum corticis, & pressione cerebri in membranam compactam, levem, compressam fuisse, remanente textu exteriori spongioso, alpero, ut exterior lamina peritonæi apparet, cujus cellulosæ fabricæ ope revera in tenero foetu, priusquam ossa generata fuerint, cum pericranio cohæret. Paulatim ossa inter membranas pronascuntur, quibus aspera illa exterior lamina innumeris fibris & vasis tota dura membrana firmissime adhæret, ut omnino, sine maxima vi, non possit separari. Sensim tamen in adultis cohæsis illa minor fit, & spongiosa illa exterior lamina fit densior, lævior, archiisque stipatur, cum in dies plurima vasa, quæ duræ matri cum ossibus erant communia, occæcentur, & maxima pars fibrillarum cellulosarum, quibus illa ossibus adnectebatur, perpetua pulsatione arteriarum duræ matris contra resistantia ossa, deteratur, ita tamen, ut quibusdam in locis per totam viam tenacissime cranio adglutinetur. Ipsa figura irregularis sinuum, & trabeculæ illæ transversæ, certissima fabricæ cellulosæ reliquiæ, sententiam hanc de generatione duræ matris comprobare videntur. Quæ omnia circa duram matrem a me animadvertenda si quis attendat, utcumque de argumentis meis existimabit, res tamen ipsa fortassis quibusdam non indigna videbitur, quæ accuratiori examini subiciatur, cujusque in naturam repetitis experimentis longius inquiratur.

§. VII.

Explicanda restant quædam phænomena, quæ hisce in experimentis nobis occurrerunt. Notavi, alterum canem cujus duram matrem irritavi, intruso aliquoties in dextrum cerebri hemisphærium stilo, per gyrum circumambulasse, quem quidem ita conficit, ut a dextris sinistrorsum tenderet. Facile hujus rei ratio reddi potest ex veritate illa Anatomica, læso alterutro hæmisphærio, musculos lateris oppositi paralyticos fieri. Cum enim hanc ob causam musculi pedum lateris sinistri nimis essent debiles, quam ut satis commode illis uti & insistere posset, fieri non potuit, quin, quum recta procedere vellet, illi singulis passibus sinistrorsum deflecterentur. Secretione spirituum in dextro hemisphærio sensim magis magisque turbata, illorumque influxu in nervos musculorum sinistri lateris intercepto, omnes musculi lateris oppositi plena paralyfi correpti fuerunt, ut, sublato antagonismo, ob tractionem musculorum dextri lateris, corpus in arcum flecteretur.

S. VIII.

Pauca adhuc, priusquam huic specimini finis imponatur, verba adiciam de quibusdam observationibus, quæ mihi, experimenta memorata instituenti, hisce in canibus sese obtulerunt, etsi ad propositum nostrum non pertineant. Omnibus illis canicidiis didici, quod jam annotavit Kavvius, canes mordacissimos, lætos, fieri meticulosos, ut ab illis, vulnere inflicto, nullum plane periculum sit metuendum. Cujus rei cum prioribus in experimentis non haberem rationem, neque canes ad puncturam partium, statim, solutis vinculis, dimitterem, accidit non semel, ut nec convulsiones, nec phænomena, satis evidenter apparerent. Quodam in cane inveni aneurisma intestini cujusdam tenuis, cujus quoque lien tumoribus scirrhosis totus obsessus erat.



DE IRRITABILITATE

DISPUTATIO MEDICA

QUAM

IN UNIVERSITATE HAFNIENSI

SUB PRÆSENTIA

CLARISSIMI VIRI

GEORGJ CHRISTIANI OEDER M. D.

HABUIT

PETRUS ASCANIUS M. C.

P R Æ F A T I O.

Nata hæc scriptio est ex meditationibus, & experimentis, quæ mihi creabam oblectamenta inter varias nupero tempore sedis mutationes, solus & remotior a librorum copia, & dulciore etiam confortio amicorum, communia oblectamenta quarentium. In chartam conieci aliquas meditationes in amicorum quorundam gratiam. Deinde visum est offerre hæc scriptiõnem Perillustri de Haller, venerabili Præceptoris, inter cujus virtutes ego discipulus humanitatem potissimum nomino, cum ex literis ejus intelligerem in Irritabilitatem tum maxime inquiri a Cl. Zimmermanno. Nondum tam hujus disputationem, nondum Ill. Senaci de corde librum, nondum alia ad hoc argumentum pertinentia scripta legeram. Hanc nunc scriptiõnem cum ita rationes meæ postulare videantur, propono talem, paucis quidem mutatis, qualis in manibus Perill. Halleri est. Hæc te B. L. volebam scire.

Deinde præfanda erat excusatio, quod non nisi parum mutavi scriptiõnem, ne putes B. L. nihil me ex libris, quos modo nominavi, profecisse. Nihil, quod magni momenti sit, muto, quoniam in optatam perfectiorem formam, & ita, uti animus esset, mutare neque occasio nunc neque tempus fuit. Non licuisse proponere etiam imperfectam opellam neque diffiteor, siquidem plane nihil novi utilisve continentem propono, & vix audeo sperare, illud eorum quæ forte objiciuntur levissimum fore, quod imperfecta est. Irritabilitas nova regio est, & regni scientiarum medicarum pars incultior. Abeunt, ut fit, in diversa coloni, aliter alii operam collocant ad juvanda incrementa communia, quæ qui multum movendo nihil promovent, culpandi demum sunt.

Cum neque injucundum, & utile in historia artium sit videre, quomodo res accendant lumina rebus, atque per errores ad veritatem eatur, excusor, quod edo scriptiõnem hæc etiam cum illis quibusdam opinionibus meis, contra quas postliminio dubitationes nata sunt. Pauca annotationes nunc addo.

Ad excitandam expectationem utilium ad praxin medicam veritatum ex doctrina de Irritabilitate sufficit commemorare, non solum duram cerebri meningem, sed & per nupera experimenta, pleuram, peritonæum, tendines musculorum sensu carere &c. explicari inflammationes cum utilitate missionum sanguinis, sine irritabilitate non posse.

Vides B. L. plus me in ipsa scriptiõne promittere, quam nunc præsto, etiam hæc in praxi utilitatem argumenti mei, sed persuadere minime me fore otiosum, neque horum etiam promissorum immemorem, minime si contigerit felicitas, ut quod amor artis suadet, dulce officium jubeat, ad incrementum scientiæ corporis humani qualemcumque operam meam navare.

§. I.

Scripturus de Irritabilitate, argumento novissimis annis merito attentionem non solum Physiologorum, sed & Philosophorum non Medicorum, spero neque superfluum rem facere me visurum illis, & gratam multis horum. Memini sæpius amicos meos aliquos, decente Philosophos curiositate cupidos scientiæ corporis sui, partis pulcherrimæ philosophiæ naturalis & utilissimæ, desiderare scriptiorem talem, quæ concinno ordine explicaret doctrinam de irritabilitate, atque pro dignitate rei longissime patentem usum ejus offenderet. His itaque placuero, clare & ordine & talia scribens, quæ intelligere non cum magna difficultate possint, sed & audeo sperare, aliqua me dicturum, quibus etiam artis peritiorum gratiam ineam.

Certe Irritabilitas, aut antiquior vox *stimulus* non sine sensu voces, ut sunt, quibus videtur, magno discrimine distinguunt recentiorum, neque nimis multorum Physiologorum libros, decem, aut viginti annis non vetustiores, ab omnibus antecedentibus, atque hæc semper epocha merebitur esse maximi augmenti scientiæ in historia non physiologiæ solum, sed & totius medicinæ.

Non plane nova res est Irritabilitas (& stimulus ejus synonymon antiqua vox est) non magis quam Electricitas, sed cum minima ejus particula nota veteribus fuerit, meretur nova res dici. Quotidiana sunt experimenta culinaria, sed culinaria obvia hominibus, qui nihil inde proficere possunt neglecta autem Philosophis, sæpe vulgi omnia nimis spernentibus. Obfuit ipsa rei simplicitas, nam docet historia medicinæ temporum post Harvejum, Physiologis plerisque, sæculi autem superioris potissimum, omnia quævis magis placuisse, quam simplicitatem, utique Chemicis.

Si citius de Irritabilitate cogitatum fuisset, poterat citius compesci magna lis, quæ Germanos potissimum Medicos commisit, eorum, qui dicuntur Mechanici, & illorum, qui animam corporis conditorem, & reatricem dicunt omnium actionum in corpore auctorem esse. Nam cum ratio & ille, quem dicunt sensus communis a mechanicorum parte sit, fueritque; tamen non magis quam adversariorum sententia se probabant, mechanismi, quibus perpetuitatem actionum effici mechanici dicebant.

Incipiam itaque experimentis monstrando quid sit Irritabilitas, & demonstrando mereri hanc proprietatem fibrarum animalium locum inter illa, quæ dicuntur *Principia*, unde phænomenorum ratio petenda est, & ad quæ qui liquido rem deduxit explicasse phænomena censetur. Itaque deinceps reddam hoc principio usum rationem, motum perpetuorum, & plurimorum interruptorum in corpore humano. Ostendam etiam utilitatem hujus principii in cognitione morborum. Denique audebo conjectura tentare ipsius irritabilitatis expli-

plicationem, etque ejus causam assequi. Dividam omnia compluribus dissertationibus, hac adseram *Irritabilitatem* tanquam *Principium*. Abstinebo a citatione auctorum. Experimenta quæ afferam, nisi ubi monuero ab aliis sumpta esse, mea dicere possum, quippe a me facta. Lectorum meorum, quibus maxime gratum facere studeo parum interest scire, qui alii auctores eadem fecerint, artis autem, & historiæ gnari; si quid est in meis novi, observabunt, non me movente.

§. I I.

Itaque ordine enarrabo experimenta:

I. Variis acerbis irritavi ranarum vivarum, & integrarum nudatas carnes. Maximas & pertinacissimas convulsiones talis communis, & ammoniacum excitat. Venenorum mineralium effectus vehementer differt, nam nimis fortia oleum vitrioli, & mercurius sublimatus, mox rigiditatem inducunt, & ligneas fibras efficiunt, albas a mercurio. Itaque hic quidem nulla perdurans convulsio, sed venenis tactorum locorum, & in vicinia vasa plenissima conspiciuntur.

II. Irritavi etiam jam enectarum ranarum carnes, aut in abscissis membris, contremuitque jam per 2. horas cum tribus quadrantibus exanimis ranæ pes adperso carni sale madefacto.

III. Cor ranæ adhuc in fine horæ secundæ, postquam exentum erat, micuit refocillatum. Vehementissimus motus est auriculæ, & venæ, ventriculus citius quiescit.

IV. Observavi constanter multum irritata corda, aut mica salis perpetuo agentis tacta, citius desinere moveri, citius etiam soli exposita, quod cum fit, vehementer, quamdiu moventur.

V. Ranæ aperui abdomen, & thoracem, exemi cor, & eodem tempore alterum femur a corpore resecai. Hoc femur eo modo, quem mox dicam, irritato ischiadico nervo, convulsus est totus. Interim sine corde mutila rana vixit per 1 horam cum dimidio, post quod tempus femur etiam alterum resectum, irritato nervo, contremuit.

VI. In abscisso ranæ femore nudavi ischiadicum nervum. Hunc comprehendi tenacula subtili, & compressi caput nervi. Convellabatur totus pes vehementissime. Hæc nervi pars altera tertiaque vice comprehenditur nullo motu sequente, sed si pergitur ad proximam partem nervi sanam, convellitur pes, quemadmodum in initio. Id spectaculum perpendo sensim per totum femur usque ad bifurcationem nervi, his etiam singillatim ramis irritatis, continuari per quadrantem horæ potest.

VII. Infinita sunt experimenta culinaria in hanc rem. Generatim quidem animalium frigidorum, ut sunt pisces, & ranæ, carnes
motus

motus ténaciores sunt, quam animalium, quorum sanguis calet, insectorum etiam pertinacissima vita est, tum integrorum, tum partium resectorum. Mordet læthali eventu viperæ resectum caput. Sed tamen etiam in calidis animalibus observatur, etsi debiliior, & breviori tempore durans, capacitas ad motum partium a corpore resectorum.

VIII. In cuniculis non mutilatis ab applicato carni sale, & oleo vitrioli, & mercurio sublimato, observavi similia illis, quæ dixi de ranis, sed minus durabilia.

IX. In canibus in quibus alia experimenta in cerebro facta erant, corde penitus jam quieto, & corpore ad contactum frigido, accedens ad aperiendum cranium, nudatorum, & discissorum temporalium musculorum carnes vehementer adhuc palpitare vidi.

X. Sæpe cuniculis, canibus, & felibus cor exemi, expressi sanguinem, fovi in manibus, & vidi palpitare per complura minuta. e. g. in uno fele exemptum, primum sponte movebatur per 8. min. Deinde solum auriculæ, cor autem nonnisi compunctum, sed tum vehementissime, idque adhuc per 20. minuta. Pericardio hoc contentum erat, aliud eodem tempore, pericardio solutum citius desit moveri.

XI. Nota sunt experimenta, quibus cor ad motum revocatur, aere in cavas inflato, in asperam arteriam, in ductum thoracicum.

XII. Lego Stenonem tertia hora post mortem vidisse adhuc motum in cava superiori sanguine eo adacto. Diutiores motum ejus cavæ ipsius cordis motu ego etiam vidi: sed annon in Stenoniana observatione hic motus a compressione? Stenonis libri non sunt præsto.

XIII. Aperto in felibus thorace, resecta sterni parte, exempto corde, tamen aliquoties adhuc fortissime movebatur totus thorax.

XIV. Notissima est historia a Bacone Verulamio relata de corde hominis, perduellionis pœnam luentis, ex vivi corpore exsecto, aliquoties ad miram altitudinem unius, & dimidii pedis etsi paulatim minorem exiliente.

XV. Narrat auctor libelli, *Homona machina*, gallum indicum, ablato cœsum uno ictu ejus capite ab ebrio milite, concidisse, sed currere incepisse, obvium parieti deflexisse, movisse alas, denique in cursu procidisse, ut tamen etiam tunc omnia ejus membra moverentur adhuc.

XVI. Quotidianum est videre similes & vehementissimas agitationes volatilium a coquis, vulneratis carotidibus, & aspera arteria, projectorum.

XVII. Quotidianum est videre motum pertinacissimum in disjunctis membris insectorum.

XVIII. Ligato aut abscisso nervo diaphragmatico, & aut parte infra ligaturam, aut resecta musculo continuo stricta, aut puncta etiam, diaphragma vehementer movetur.

XIX. Invenio relatum experimentum, quod mihi non satis successit. Ligatur diaphragmaticus nervus, irritatur infra ligaturam, sed paulatim irritationem nullus motus sequitur. Hoc facto laxatur ligatura; & paulo post denuo constringitur, tumque redit ad irritationem motus. Hoc vidi, pressio leniter inter digitos nervo, ita tamen ut supra digitum irritato non moveretur diaphragma, postea, remotis digitis, irritato nervo in loco superiori eo in quo digiti fuerant, sequi motum. Videtur mihi ligatura nimium damnum inferre nervo destruendo ejus medullam.

XX. Observavi cum in animalibus experimenta facerem in thorace, intacto abdomine, hoc postea aperto, diu post exemptum cor, intestina valde, & diu irritabilia, non item, cum citius abdomen aperiebatur. Conf. quæ dixi de corde pericardio incluso.

XXI. Nunquam potui, irritato aliquo nervo, producere motum, nisi in illis musculis, in quos definit, sive ligassem truncum cujus ramus erat irritatus, sive minus. Post nimiam tractionem alicujus nervi sequitur convulsio universalis. Hanc etiam vidi in ranæ nervis spinalibus, qui ischiadicum componunt, oleo vitrioli tactis.

§. III.

Ex his observationibus collatis concludi possunt hæc.

I. Datam esse fibris muscularibus facultatem, ut ad contactum omnium fere corporum, quibus non semper continguntur, moveantur, quæ est *Irritabilitas* (1).

II. Hanc facultatem musculos a nervis habere.

III. Nervos vehere ad musculos fluidum, quod appellari potest recepto nomine *spirituum animalium*.

IV. Hoc semper plenos esse musculos, tamquam diu ad motum habiles esse, & irritabilitatem in ipsis superesse, quamdiu hujus fluidi aliqua pars superest.

V. Addo non opus esse ad singulas musculorum actiones singulis influxibus novæ portionis spirituum animalium.

Particulatim singula assequar.

§. IV.

(1) Irritabilitatem hic dico sensu specialiore, & considero musculorum. Universali sensu omnium partium est, quæ etsi motus non sint, tamen sensus capaces sunt, quod ea sola sunt, quæ nervos recipiunt.

Ceterum quomodo irritata tali parte, quæ ipsa motus incapax est, fiat ut muscoli moveantur, quos ipsos stimulus non attingit, dicere convenit cum de consensu dicetur.

§. I V.

Dico ad contactum omnium fere corporum irritari musculos, nam non solum non audeo affirmare, quod neque tentari, neque tentari cum omnibus corporibus potest, sed & videtur probabile esse, aliqua corpora posse, quorum contrarius effectus sit.

Manifestum est irritabilitatem ab aliis corporibus majorem, ab aliis minorem esse. Oritur febris a comestis pipere, aliisque acribus, sine dubio non solum a stimulo in ventriculo, & intestinis; sed & a receptis in sanguinem particulis ipsum cor stimulantibus. Omnis in universum chylus etiam e blandissimis sanguini admixtus cor irritat, quod in phisicis manifestissimum inde etiam colligi potest, quod qui adfueti sunt non cænare, mane cum surgent, pauciores pulsus quam alii numerant. Cum sint quæ gradu diverso irritant, probabile est, esse posse quæ irritabilitatem tollunt.

Narrat R. Mead. in experimentis D. Nichols, qui ponderosi olei cohobatione ex aqua Laurocerasi parati, dachmam unam tribus aquæ congiis solvit, & hujus aquæ uncias duas cani mediocris magnitudinis in os infudit, canem in ipso per æsophagum transitu non integro dimidio horæ minuto necatum fuisse. Cogitari hic potest de omnibus narcoticis, inde a fortissimis usque ad emulsionem amygdalarum dulcium.

Magnus hic aperitur campus illustraturo novis experimentis fertilem meditationum irritabilitatem. Ego certe in animo habeo, quavis data occasione raperiri quam potero plurima, hac scriptione contentus fundamenta posuisse.

§. V.

Potest irritabilitas optimo jure inter principia Physiologiæ referri, & potest satisfecisse proposito suo censei, qui in explicando phænomenon aliquod, rem liquido ad irritabilitatem deduxerit.

Neque merentur, tamquam sensu cassæ voces irritabilitas & stimulus rideri, ut sit a non paucis, inter quos honoris causa nomino D. Sauvagesium. Potest ab eo, qui ejus dissertationem de causa februm legens videt, poni in sublato æquilibrio virium motricium corporis, postulari clara idea harum virium, & potest quæri causa causæ, nam id quidem omnes scimus, illas vires, quas cor in febris consumit, detrahi musculis reliquis, & inter hos illis, qui solent voluntate regi, sed nempe illud cuperem rescire a claro viro cur æquilibrio tollatur. Se de hac re dicam alio loco & tempore cum de utilitate doctrinæ de irritabilitate in praxi dicam.

Videntur mihi illi, quibus adeo non placet stimuli vox similes esse illis, qui in Philosophia naturali attractionis vocem ferre non possunt. Utamur his vocibus ad designanda phænomena, quæ cogitantes

tantes non cogitabimus nihil; securi interim de causis ultimis. An causæ attractionis cognitio separanda sit, aut querenda adeo, meum non est dicere; causæ irritabilitatis, hoc est quomodo fiat, ut a contactu corporum ad musculos motus sequatur, dici forte olim poterit.

§. V I.

Sunt novissimi & celeberrimi auctores, qui irritabilitatem afferunt proprietatem generalem partium animalium esse non dependentem a cerebro, & nervis. Cor, exempli gratia, ajunt moveri vi aliqua cordis fibræ inhærente.

Non illud urgebo, quod posset contra hanc sententiam, non esse multiplicandas præter necessitatem proprietates corporum, & quod fieri per pauca potest, non faciendum esse per multa, accedere hanc sententiam ad qualitates occultas, nihil aut parum relinqui nervis, & cerebro, mittam, inquam, hæc omnia, nam superfluas faciunt has disputationes experimenta quæ attuli. Si in ranæ abscisso femore ischiadico nervo; si in canibus abscisso diaphragmatico nervo, irritatis, muscoli moventur, hoc est, si in his nervis a commercio cum cerebro, & spinali medulla, unde ipsi omnia habent, separatis restat aliquid ad movendos musculos aptum, cur illud, quod in ipsis musculis separatis solis restat, non venerit ipsis per nervos.

Cum maxima pars nervorum cordis ita positi sint, ut impossibile sit eos ligare, mirum non est, ligatis quibusdam, mortem animalium in tere omnibus experimentis tarde secutam fuisse. An non inde colligas, pendere a nervis causam motus cordis potius quam ab illa, quam isti auctores dicunt quidem irritabilitatem, sed ab omni nexu cum nervis separant?

Illam sententiam a cerebri dura meninge cum origine etiam irritabilitatem omnes reliquas partes corporis habere, reliquias antiquatæ Baglivianæ opinionis, scio a celebri ejus auctore desertum esset, permoto experimentis Cl. Zinnii, quæ docent, insensilem duram matrem esse. Præsens fui, cum primum hæc experimenta fierent, & deinde, ipse repetii. Præterea non video cur credere velimus, omnia ex dura matre orta esse, ne quidem a nervis. At hanc longam litteram non incipiam perorare.

§. V I I.

Ingeniosa est sententia & magnis viris digna; irritabilitatem proprietatem esse non modo animatorum, sed & vegetantium corporum, itaque non a nervis pendentem, qui his nulli sunt.

At experimenta quæ attuli (§. II. §. 6.) docent, ut mihi quidem videtur, manifesto in animalibus, a nervis pendere. Quæ in simplicissimis animalibus, quibus cerebrum nullum est, polypis, quæ
etiam

etiam in plantis observatur irritabilitas, videtur omnino etiam pendere a succis specificis pro fabrica cujusque horum organicorum corporum, ut tamen pleraque in plantis phænomena, in Parietaria, Balsamine, Mimosis videantur ex elasticitate, & determinata structura partium explicabilia esse.

§. VIII.

Venit musculis motus sui causa per nervos, oriuntur nervi ex cerebro, cerebello, & medulla spinali, in quibus magnis visceribus, ex tanta copia sanguinis, quæ eo appellitur, aliquid secerni par est, quod nervis infunditur: ergo dantur spiritus animales. An ullo alio modo reddi ratio potest phænomenorum in compressis, ligatis, resectis nervis.

§. IX.

Docet magnus Boerhaavius, spirituum horum nervosorum magnam copiam esse, & continue & æquabiliter generari. Sed idem, semper magnus Vir, durante, inquit, inspiratione pulmo quiescet, hinc sanguis minus transibit, minori copia agetur in cor sinistrum, hinc minus in cerebellum, ejusque nervos, tunc sanguis minus aget in musculos intercostales, ergo sequitur expiratio. Talia ratiocinia plusquam uno loco in ejus scriptis recurrunt. Deprecor hanc animadvertens contradictionem, iniqua nimiorum sectatorum judicia, qui non justius quam ego venerari magni Viri memoriam possunt.

Quoniam magna copia, & continue, & æquabiliter generantur hi spiritus, quippe secreti ex sanguine continenter per arterias allato, neque eo ordine consumuntur, quo generantur, oportet alicubi asservari, & penum eorum esse, atque hanc penum in quieto rerum statu æquabiliter omnibus nervis & musculis pro portione dividi. Itaque non modo illi, qui secreti sunt impenduntur ad motum spiritus, sed depromuntur ex penu, in quam ex omni visceris ambitu affluit jugiter, dato tempore determinatum supplementum.

Atque hoc est, quod docent experimenta allata, musculos semper plenos esse liquido nerveo in integro rerum statu, atque solutos etiam a nervis non perdere momento vim motricem, neque magis hic quam alibi saltum naturam amare.

Si ita uno continuo filo in tot ambagibus spiritus qui modo generati sunt, ex sanguine systole proxima cordis allato, impenderentur, etsi ex parte tantum, ad efficiendam proximam systolem cordis, aut inspirationem, possetne vel per quadrantem horæ durare vitam, adeo infinitis casibus, & eorum quæ extrinsecus sunt, influxui obnoxia?

An exalant spiritus animales, an transmutati perdunt movendi vim, an per circulum redeunt, pars saltem, ad sanguinem, cerebrum, quæ adeo? Incertum est utrum fiat, consumi certissimum est.

§. X.

§. X.

Non quidem ea præcisè copia, quæ in aliquo loco consumitur, eodemque tempore quo consumitur, redditur illi loco, alioqui vix posset locum habere lassitudo partialis, sed generatim verum est, ubi stimulus ibi affluxus spirituum, etsi definiri non possit, qua proportionem ad eum locum, qui plus dato tempore consumit, devertantur spiritus animales ex sensorio communi, & publica penu, cui suæ suppetiæ ita uti secernuntur, adfluunt æquabiliter.

Potest, sicubi aliqua pars nimis irritatur, nimisque agit, ratio qua impenduntur spiritus animales in diversa loca, nimis iniqua esse, adeo ut alii muscoli deficiente ipsius iusta parte virium motricium fatiscant. Ita in febribus corde nimis virium dissipante, quæ etiam vires ex sanguine inordinatè moto, & alterati incipiente, difficilius ac parcius reparantur, musculi reliqua debiles sunt. Ita in tabe dorsali, ob maximam consumptionem spirituum cum semine, oritur, & crescit quotidie lassitudo, & flavescentia corporis, potissimum musculorum voluntariorum, nam illi quorum perpetuus motus est ob stimulos suos, ad se semper trahunt suas portiones, oritur debilitas oculorum, quibus magna copia spirituum continenter opus est, adeo ut huic parvæ corporis parti privata tria paria nervorum, & a tribus aliis rami dati sint, oritur fatuitas, aut si acris alias ingenii homines sunt, citior vitæ finis, quæ desinit, non opinantibus hominibus, non satis de periculo monitis, quoniam dolor vix ullus est. Sed plures tales pathologiæ considerationes afferentur alio, & magis suo, loco.

§. X I.

Cum caro posita extra nexum cum sensorio communi & nervis, irritata moveri possit, patet non opus esse ad singulas musculorum, arterias singulis influxibus novæ portionis spirituum. Videtur omnino muscularis motus peragi non accessione novæ undæ fluentis in musculus, sed commotione fluidi præsentis, & complentis in sano statu musculares fibras, & nervos earum, incipiente aut in sensorio communi, aut eo loco ubi stimulus applicatur. Sed quæ, & qualis ea commotio est? Nescio, neque magis, opinor, quam qui maxime sunt intelligentes. Credo tamen non ita desperandum planè, ut ne tentanda quidem ejus investigatio sit, & esse utique hic locum hypotheseos, modo aliquid semper veri, etsi forte olim demum post complures hypotheses antiquatas verum invenietur.

§. X I I.

Forte non superfluum fuerint deprecari, & defendere a me suspicionem, ad quam nimis proni sunt quidam meticulosi homines, & quidam

quidam etiam novissimi sectæ alicujus medici contra mechanicos, quasi eatur assertum sententiam, quæ est auctoris libelli *L'Homme machine*. Hic homo certe abutitur experimentis de irritabilitate p. 71. seq. libri sui. Si corpus machina est instructa principio corporeo motus & consistentiæ suæ, si cordis motus, si respiratio, si chyli præparatio, si hæc sine quibus durare corpus non per brevissimum tempus potest, si hæc quæ necessaria sunt, fiunt necessitate mechanica, neque fiunt animæ imperio, ergo anima nulla est, ergo cogitationes, comparationes idearum, ergo omnes actiones, motusque corporis, ergo ea omnia, quæ conscientia unumquemque sua docet, non esse necessaria, & posse non fieri, fiunt pariter mechanice, & necessario omnia. Talis est argumentatio hujus hominis his verbis: *Posez le moindre principe de mouvement, les caps animés, auront tout ce qu'il leur faut pour se mouvoir, sentir, penser, se repentir, & se conduire en un mot dans le physique, & dans la moral qui en dépend.*

Hic mihi videtur totius libelli maxime dolosus, & laborans locus esse, atque flagitandum ab auctore, ut ingentem hiatum, qui hic in argumentatione ejus est, expleat si potest.

Libri contra libellum scripti non leguntur ab illis, qui maxime opus habent rectiora edoceri, sed qui libellos amant legere, non libros.

Cuperem scire quomodo aut Stahlianus, aut Cartesianus, aut alii etiam, qui vitia virtutesque a corpore induci credunt, refutare dictum libellum velint?

§. XIII.

Vulgaris est definitio mortis, quod sit separatio animæ, & corporis. Sed potest quæri, utrum quoniam ab anima corpus deseritur, corrumpatur corpus, an quoniam corpus destruitur, discedere anima cogatur? Illi homines qui ex aquis post satis longum tempus extrahi, aut a patibulis abscissi, ad vitam revocati sunt, idem revocati sunt, quoniam anima postliminio in corpus rediit, an quoniam idonea corporum habitata est cura, sine qua post non ita longum tempus in putredinem abitura erant?

Docent hæc historiæ, & Bruhierii totus liber de incertitudine mortis signorum, & experimenta de irritabilitate, ideam mortis non exhauriri ullius solius partis, neque cordis, neque omnium quiete, sed jungi debere incapacitatem ad motum.

§. XIV.

Proximum est uti irritabilitate ad reddendam rationem motuum perpetuorum, qui dicuntur actiones vitales.

Opusne est refutare sententiam eorum qui contendunt, animam horum motuum auctorem esse? An non satis est citasse experimentum

tum in ranæ dissectis membris. Ego certe gaudeo, non mihi incumbere officium omnem humanam sapientiam superans, sed melius perspectum esse vitæ meæ, principio motore corporis mei constanter agente, quamdiu hæc machina potest durare.

Neque lubet reliquas sententias de causâ harum perpetuarum actionum referre, & retutare. Chemicorum certe opiniones nominatim refutasse est. Omnium maximè tolerabilis est illa, quæ cum magnis aliis viris Boerhavio dicta est, brevis sed identidem recurrens paralytis muscularium fibrarum, & defectus liquidi nervosi. Sed demonstravi semper musculos liquido nervo plenos esse, atque aliquamdiu etiam sublato commercio cum cerebro, cerebello, aut medulla spinali, ad motum adhuc aptos, ut non possint momento paralytici fieri. Deinde impossibile est nervos, teretes, tenues funiculos, factos fortibus membranis, neque tenfos, sed satis laxos, comprimî posse a visceribus, inter quæ decurrunt, quin ab ipsis arteriis. Denique etiam si possint, efficeretur hac alternata compressione, non illa, quæ perhibetur paralytis, sed motus musculorum, nam pressio inter digitos nervo, rescisso ligatore sive minus, convellitur musculus.

§. X V.

Conabor sola expositione observationum, & animadversione structuræ partium deducere eo Lectores meos, ut ipsi sibi possint reddere rationem phænomenorum.

Potest circulatio sanguinis demonstrari ex sola directione valvularum cordis, & poterat inventa fuisse longo ante Harvejum tempore, si Anatomici videntes has valvulas voluissent cogitare de earum usu, & quærere cui bono? Ita decet quærere cui bono diversitas valvularum venosarum cordis ab arteriosis, tum reticulata structura parietum cordis, & auricularum, & connexio valvularum cum columnis superficiei internæ cordis per filamenta? Cui bono hic irregularis contextus, nisi non ille solus usus est venosarum valvularum, ut ne elabi ex ventriculis in sinus auriculasque sanguinem sinant. Hic si solus esset, melius similes essent arteriosis, quæ regulares cum sint, multo aptius & accuratius ocludunt sanguini articularum redditur ad cor. Itaque si qua hypothesis hujus irregularitatis, sed constantis, rationem dederit, & naturæ consilium ostenderit, non parum se vel hoc solo commendaverit.

Narrabo seriem morientium partium, quemadmodum observavi in cuniculo. Circumjeci primo laqueum collo, deinde aperui thoracem. Vidi palpitationes ventriculorum, aurium, venæ cavæ, non certo numero sibi respondere, cor autem totum eodem tempore convelli, venæ etiam, & dextræ auriculæ contemporaneos motus esse. Primum desinit corpus cordis moveri, deinde auricula sinistra, post horam demum dimidiâ auricula dextra cum cavarum venarum repletiſſimarum sinu, postquam jam sensus, motusque reliquos omnis perierant

rierant exceptis convulsivis motibus diaphragmatis admodum pertinacibus, & ventriculi intestinorumque motu. In cava superiore, quamdiu durabat maxime validus erat motus, in ejus tractu æquali fere pollicis latitudini, qui motus talis fuit, qualis intestinorum a fibris longitudinalibus motorum.

§. X V I.

Collatis experimentis quæ in antecedentibus exposita sunt, quæque ostendunt cordis sensibilitatem, devenitur ad mechanismum cordis motus, quem exponam.

Adveniens ex pulmone, & toto corpore sanguis per venas pulmonales, & cavas, complet auriculas, saccos musculosos. Hi non solum continguntur ab hoc sanguine, sed & extenduntur, nam ex pulmone advenit vi expirationis pressus, & cavæ etiam satis fortibus tunicis factæ suum pellunt, impeditum a reditu tum ab Eustachiana valvula in inferiori, tum ab ipso pondere in superiori. Itaque hi sacci contactus, & extensionis impatientes, qui maximè afficit teretes carnes rete formantes, quarum multæ tenues sunt, & filamentorum similes, ad motum cientur, exonerantque se sanguine suo, qui postus inter hanc vim & sanguinem successurum, non potest non in ventriculos labi, aperiendo, & reclinando valvulas, quæ orificio quæque sui ventriculi in circulum adnatæ, illud in præcedente systole clauferant. Ita in ventriculos delatus sanguis invenit eorum superficiem internam, puncta adeo contactus insigniter multiplicata per irregularem structuram, colliculos, & valles, & anfractus formatos a columnis, & reliquis fasciculis musculosis, varæ magnitudinis, multiplici modo inter se cohærentibus, multis admodum gracilibus. Deinde, quod maxime animadverti velim, sanguis subit valvulas, & ad orificium applicare nititur, sed cum sint alligatæ ad columnas filamentis eo protensis ex ambitu valvularum, non possunt cedere prementi sanguini, ob quam causam necesse est hæc filamenta vehementer tendi, columnasque adeo ipsas, quibus inseruntur, trahi. Hæc omnia plusquam sufficiunt ad excitandum ad motum cor.

Cessante causâ, cessat effectus. Cor liberatum stimulis suis redit in pristinum, & naturalem statum, quæ est diastole. Supervacaneum itaque est circumspicere causas diastoles.

§. X V I I.

Hic mechanismus exhibet ideam perpetui mobilis. Effectus sit reciproca causâ, nectunturque causæ, & effectus invicem in circulum. Ipse sanguis est causâ motus sui; invenit cor irritabile; cor irritabile est ob repletas spiritibus animalibus musculosas fibras; hi spiritus secernuntur in cerebro ex sanguine arterioso appulso vi cordis.

Suppl. Part. I.

S

Utrum

Utrum præfers intelligens Lector hunc mechanismum, an actionem indefinenter repetitam rectoris animæ? Utrum præfers mutuos natus planetarum quibus in orbibus suis continentur, an dæmonia, quæ sphaeras suas regunt?

Augēt admirationem hujus mechanismi, qui inventorem & opificem sapientissimum testatur, consideratio respirationis.

Cæterum fateor me legisse in Ill. Senaci commentario in compend. Anatomiae Heisterianum p. 806. animadversionem de distractione tenuium fasciculorum cordis, illum autem majorem librum, quem ibi promissum ante annum edidit, non legisse. Moneo hoc etsi ceterum abstinens a citationibus, ne plagiarium me forte aliquis dicere possit.

§. XVIII.

Arteriæ non solum quod elasticæ sunt agunt, sed & musculosæ cum sint, agunt multo quam est elasticitas potentiore musculari vi. Subsultim progrediens sanguis ferit & attollit arteriarum parietes, tanto magis, quod præcedens unda retropulsæ etiam ex parte versus cor, succedenti impedimento aliquo est, quæ consideratio ideam pulsus efficit. Ictæ ergo, & extensæ irritatæ agunt musculares fibræ.

§. XIX.

Venio a motu cordis ad respirationem. Qui persuasus de causa, quam dixi motus cordis esse, ad considerandam respirationem accesserit, eum credo non posse non proclivem esse ad suspicandum, respirationis etiam causam irritabilem esse debere. Utar methodo qua usus sum de corde dicens.

Observare cui lubet potest, dum placide respirat, consentire reciprocactionem aeris, & motum cordis constanti rythmo, atque inveniet triplicatum ut plurimum numerum motuum cordis numeri respirationum tempore eodem. In me numero hac hora antemeridiana 212. pulsus & respirationes 71. intra tria minuta. Utile fuerit observare tempora pulsus, & respirationis, dum in quieto & solito statu cor & pectus non sunt.

Docere sensus unumquemque suus potest, etsi varie modificandi respirationem facultas sit, penitus inhibendi vim non esse, atque dum conatur eam suppressere, invita voluntate ad motum cieri musculos, ut conscientia propria doceat, non moveri ideo quod moniti sensu molesto periculum quippe mortis evitaturi ipsi moveamus musculos. Certe mihi videtur eos, qui etiam dormientes quin apoplecticos sapientiae talis & capiendi consilii capaces credi volunt, testimonium præbere amoris sui præjudicatarum opinionum potius, quam veritatis. Neque magni momenti obiectio est, quod vellicati dormitores, & apoplectici, acerrimis stimulis vexati corpus movent; nam hi stimuli;

si diu agunt, dormientes, & apoplecticos, siquidem in his ulla spes supervest, denique ex somno, & lethargo excutiunt, respiratio autem in utroque modo sopitis continuatur, neque ille, quem perhibent, molestus sensus, etsi identidem recurrens, soporem tollit. Mancipia Congoenſia, qui miseri mortales ipsi se suffocare dicuntur, faciunt id revolutam linguam inferendo in asperam arteriam, quemadmodum, usu interdum venit in infantibus post rescissionem frenuli linguæ.

Docent pariter sternutatio, tussis, & sæpiſſime oſcitatio, quam non penitus sub imperio nostro thorax sit. Qui accurate ad se ipsos attendunt, dum pandiculationibus urgentur, aut sicubi in incommodo situ membra diu sine motu conservata fuerunt, observabunt sæpe convulsivas sollicitationes, nempe pressis musculis a sanguine in omni ejus partis venoso systemate stagnante. In respiratione quieta, & larynge nullo alio officio fungente, exspiratio sine ullius musculi auxilio fit, quemadmodum inspiratio in viris certè solo diaphragmate peragitur. Abdominales musculi ipsi non agunt, sed sequuntur retrocedentia viscera, quæ ipsa diaphragma sequuntur. Solus labor est invenire causam inspirationis. Exspiratio necessario sequitur, quippe qua thorax, vi contra pondus suum, & cartilaginum elatorem in inspiratione motus reducitur in pristinum statum, & diaphragma laxatum naturalem suum conum format. Dati autem animalibus musculi expirationi inservientes, quemadmodum inspiratorii accessorii, ideo sunt, ut morari, & accelerare inspirationes, & expirationes possint.

Docet figura pulmonis, quæ quasi formam cera, exprimit cavitatem thoracis, & monstrat ipse adpectus semper pulmonem parietibus omnibus thoracis in utroque respirationis stadio applicari, sive explicatos sequatur, sive a redeuntibus comprimatur. Itaque pulmones latera quæ semper contingunt, aliquo modo premunt; premunt autem diversis tempusculis respirationis diversa vi. Peracta expiratione pulmo ad minimum volumen reductus recipit mox sanguinem ex dextro ventriculo appulsum, itaque jam repletior a primo post expirationem pulsu comprimit fortius ubique pleuram, onerat etiam diaphragma, quæ compressio & quod onus a secundo pulsu augentur, atque ita intenduntur, usque dum inspiratio sequitur.

Arteriæ pulmonalis totum systema capacius est venoso, contra quam in toto corpore, ventriculus item dexter cordis capacior sinistro, tenuiorque. Palam est hanc causam capacitatis arteriæ & dextri ventriculi unam eandemque esse, & palam est hanc causam resistantiam esse, quæ in pulmonibus opponitur sanguini arterioso. Venæ autem pulmonales, quia sanguis earum per expirationem fortiter motus facile ad sinistrum ventriculum fertur, parum dilatantur. In reliquo autem toto corpore venæ ampli canales sunt, cum recipiant fluidum cujus tardus motus est.

§. XX.

Ex his collatis colligo mechanisum respirationis hunc esse. Dum thorax ante inspirationem in statu est, qui ipsi propter pondus & cartilagine & viscerum abdominalium pressionem naturalis est, applicato ubique ad ejus concavitatem pulmone, advenit ex dextro cordis ventriculo sanguis vi satis magna pulsus, occupatque partem loci, quem aer semper post expirationem in pulmone superstes, nunc autem loco pulsus, tenuerat. Itaque sensibilis membrana pleura (1) premitur a repletionem viscere, & repleto sanguine calido, & sanguine tanto densiore quam aer est, idque post prægressam expirationem, quæ semper thoracis calorem temperat, diaphragma insuper ipso solo ponderosioris pulmonis monere non nihil afficitur. Hinc diaphragma & alii muscoli ad motum cientur, & ampliorem thoracem faciunt.

§. XXI.

In fœtu, qui nondum respiravit, maximum obstaculum sanguini per pulmones trajecturo opponitur, ita ut parva solum quantitas in venas veniat, reliqua aut per foramen ovale sinistrum cor petente, aut per anastomosis magnarum arteriarum in decursu suo pergente. Juvat considerare hanc circulationem attento ad Merianam litem oculo.

Apertum est ob parum pervium pulmonem, inde ex quo in minimo fœtu formari pulmo incipit, nasci debere diversitatem cavitatum ventriculorum cordis, arteriarum pulmonalis, & aortæ, & arteriæ venæque pulmonalis, quæ rationes mutantur postquam sublata sunt resistentiæ, quæ sanguini arteriæ pulmonalis opponebantur, ita ut crescente homine arteriæ pulmonalis capacitas ab aorta superetur, venosum autem pulmonale systema semper angustius sit arterioso, quoniam cito & facile per venas sanguis fluit. Compensata est resistentia in pulmone fœtus duplici modo, alio succurritur, ventriculo, atrioque dextro, alio arteriæ pulmonali, & succurritur tum contractionis tum laxationis cordis tempore.

Cum parum sanguinis per pulmonales venas advehatur, facillime sinistrum cordis atrium admittit ex dextro sanguinem perforamen ovale. Itaque neque nimis oneratur dextra auricula dexterque ventriculus, neque sinistris sanguis deest.

In ductu arterioso, communi ramo magnarum arteriarum, occurrunt sibi unde sanguinis dextri ventriculi, & sinistri, contrariis dire-

(1) An quoniam irritabilem pleuram esse negant Cl. Zimmermanni experimenta, tollit mechanisus meus? An nihil efficere posse censenda est compressio diaphragmatis & intercostalium muscutorum, etsi mediata?

directionibus pulsæ a ventriculis eodem tempore se contrahentibus; Necesse est valde ductum tendi, neque mirum aut arterias pulmonales, aut aortam prope cor amplitudine superare. Inferitur ductus, continuatio trunci arteriæ pulmonalis, in aortam in fine curvaturæ, ita ut aortico sanguini aditus in ductum tere æque facilis sit ac via est in continuatione aortæ, & ex ductu in aortam non sit facillimus. Itaque non potest non aorticus sanguis arteriæ pulmonalis sanguini perductum in aortam tendenti impedimento esse, neque potest hic pulmonalis arteriæ sanguis commodè pergere, nisi succedendo quatenus viam ipsi aorticus facit, ipse suas vias in aorta descendente inveniens.

Postquam cæperunt reciprocationes aeris patefacto per pulmones transitu, plus quam antea sanguinis per venas pulmonales ad sinistrum atrium cordis venit. Ergo non potest, ut antea fiebat, ex dextris sanguis admitti, cui porta clauditur, applicata ad foramen valvula a sanguine per venas pulmonares in saccum veniente. Ita continenter appressa valvula cum margine coalescit, & foramen obturat. Pariter deferit sanguis dextri ventriculi viam per ductum arteriosum difficiliorem quam est nunc monstrata per pulmones.

Si Merius cogitasset, ductum arteriosum adeo magnum esse, quoniam ab undis obnitentibus sanguinis extenditur, pulmonalem, porro arteriam ita insigniter aorta majorem, quoniam ob difficultatem trajectus per pulmonem a sanguine dilatatur, non ita argumentatus esset: quoniam capacior est pulmonalis arteria quam est aorta; ergo major etiam in illam, quam in hanc sanguinis copia venit, ergo in dextrum sinum ex sinistro sanguis ex pulmone, redux venit, atque una cum cavarum sanguine dextrum ventriculum ingressus in arteriam pulmonalem compellitur.

S. XXII.


Tangam quæstionem de utilitate respirationis. Ad hanc quæstionem ego ita respondeo. Non ut ex uno ventriculo cordis ad alterum sanguis venire possit, fabricatus est pulmo, sed ut respiratio fieri posset, assignata est sanguini via per pulmones. Voluit auctor fabricæ humanæ hominem aeris incolam esse, voluit loqui posse, & reliquis officiis fungi, ad quæ modulatione aeris opus est. Fecit sapientissimus Artifex, cujus consilio neque casu humanam naturam, formatam esse, si quo alio, certe hoc argumento patet, quod factus inutile ipsi in utero organon habet, sed ad futuros usus destinatum, fecit itaque machinam reciprocationi aeris aptam, atque ne desinere unquam hæc reciprocatio posset, nexuit vinculo indissolubili cum motu cordis. Verum etiam hic quod in tota natura obtinet, & una machina plus simplici scopo servit. Respiratione non solum alvus, vesica, uterus exonerantur, sed & perpetuum & publicum ejus beneficium pro toto abdomine est, nam sine ea non intelligitur, quomo-

do

do venarum portarum sanguis, quomodo speciatim splenicus ipso tempore quo maximus ejus usus est, quomodo in universum omnis venosus sanguis abdominis moveri possit. Pariter etiam in sanguinem ipsum ex respiratione utilitatem redundare dubium non est, eaque satis magna utilitas sola fuerit, quod sanguis vi pulmone incalcescit, nam calore evolvi possunt diversi humores, quibus sanguis componitur, ut suis quisque locis & organis secerni tanto facilius possint. Quæ autem de aliis usibus tam multa auctores dicunt, hoc prætervise, certe illud ostendunt, quod in tota natura observatur, nimis sedulæ & operosæ hominum imaginationi plerumque non aridire naturæ simplicitatem.

§. XXXII.

De sternutatione, de oscitatione &c. convenit dicere alia dissertatione de consensu partium. Tantum adhuc addam aliquid de experimentis D. D. Herissaut, Houtson, Bremond. Feci ipse experimenta in quinque felibus, pullis deinceps. Nunquam vidi per vulnera sive parva, sive magna prorumpere pulmonem nisi in expiratione, nunquam in inspiratione. Quamdiu in uno tantum latere, vulnus est sic satis naturalis respiratio est etsi fortis, & animalia satis sunt vocalia. Laborum pulmonis apices, in expiratione costis vehementissime depresso, protrusi sæpe, ubi parvum vulnus est, incarcerati quasi hernia inter angustiora in inspiratione spatia intercostalia, vulnus obturant. Postquam etiam latus alterum pertusum est, violentissimis & convulsivis motibus sursum deorsum thorax rapitur. Superfuit tamen vox aliqua in uno seculo etiam tum per 6. min. horæ, sed in incarcerato, ut dixi, in parvis vulneribus pulmone. Mediastino pertuso, aut remotis abdominalibus visceribus, diaphragmate, respiratio æque violenta est ac violato utroque latere. Illud quod invenio D. Herissaut sanasse canem, cui vulnus in utroque latere infligerat, fateor mirum mihi videri. Rescissa sterni parte tamen vehementissimi thoracis motus diu continuantur.



LETTERA

DI GIAMBATISTA VERNA

Professor Cerusico di Torino:

ALL' ILLUSTRISSIMO SIG. BARON

DE HALLER.

DOTTISSIMO SIGNORE.

SE dote singolare, e propria non fosse di chi più degli altri in ogni genere di buona letteratura è andato innanzi il guardare con buon occhio, e accogliere benignamente coloro, che di camminare per l' aspra, e lunga via delle scienze coll' industria, e coll' indefessa fatica desiderosi si mostrano, io certamente, dottissimo Sig. Haller, e a voi, e alla letteraria repubblica del tutto ignoto, ardito non avrei di comparirvi avanti con una mia lettera: ma siccome colle eccellenti, ed utilissime opere vostre avete fatto dottamente conoscere al mondo tutto

Quanta dottrina è quella, che v' animanta:

le anatomiche, le botaniche, le fisiologiche, e le pratiche materie illustrando quant' altri mai; così mi lusingo, che non siate per ifdegnare questa mia, qualunque siasi, picciola narrazione d' alcune cose osservate dopo la lettura delle memorie vostre presentate alla Real Società di Gottinga, di cui con tanta vostra gloria ne siete Presidente perpetuo. Conoscendo voi, quanto giustamente pensato abbiano que' massimi Filosofi, i quali poco, o niun caso dell' autorità sola facendo, qualora trattasi di cose fisiche, che all' occhio, e all' attenta osservazione possono esser soggette, vogliono, che le replicate diligenti esperienze servano di guida per giugnere allo scoprimento della verità, e di queste soltanto mostrarsi paghi, e contenti, e a queste unicamente credono, ancorchè di varie cose veggano come difficil sia, per non dire impossibile, il render ragione, preso avete a esaminare coll' occhio vostro acutissimo, e penetrantissimo alcune proposizioni riguardanti varie parti del corpo animale giudicate, sto per dire, da quasi tutto il Mondo come infallibili, e a voi è accaduto ciò, che ad altri accadde già, che colla scor-

ta

ta de' ben guidati sensi scoperto hanno, quanto s'inganni, chi colla sola ragione discorrer vuole di sì fatte materie. In fatti chi mai in un secolo tanto illuminato, qual' è il nostro, può essere nelle filosofiche scuole sì giovine, che non sappia, quanto travierebbe, la verità delle anatomiche, e filosofiche materie ricercando, se dalle minute, ed esatte osservazioni per poco s'allontanasse? Al massimo nostro Poeta, che pure fiorì in tempi, in cui le scienze fisiche erano ancor lontane dalla perfezione, alla quale giunte le veggiamo, ed erano, per dir così bambine, disse Beatrice, che gli uomini, qualora non sono guidati da' sensi alla scoperta della verità, facilmente s'ingannano, e che la ragione, volendo far da se, nè badando a' sensi, ha corte l'ali.

*Ella sorrise alquanto; e poi, s'egli erra
L'opinion, mi disse, de' mortali,
Dove chiave di senso non disserra,*

*Certo non ti dovrien punger gli spirali
D'ammirazione omai: poi dietro a' sensi
Vedi, che la ragione ha corte l'ali.*

Se questa si contentasse di conoscere i propri confini, e trasportar non si lasciasse talora a oltrepassarli, volendo pur chiaro scorgere ciò, che la forza del nostro corto vedere trascende, tante, e tante ipotesi non si leggerebbero messe fuori per spiegare i fenomeni della natura, le quali poste alla pietra del paragone, cioè esaminate colle osservazioni, si sono dimostrate del tutto vane, e insufficienti. E per non allontanarmi dall'argomento della mia lettera non si farebbero certamente, credo io, finte nella dura madre, e ne tendini alcune diramazioni nervose, che a' perspicacissimi occhi vostri, eruditissimo Signore, nè a quelli d'altri valenti anatomici non è stato fin ora concesso il poterle scoprire. Per quel che tocca a me, ancorchè non mi sia mai lusingato di poter giugnere a scoprire cose non vedute da voi, e da altri avvezzi a ditaminare minutamente le opere naturali, pure per quell'innata curiosità, che ho sempre avuto di conoscere la struttura del corpo umano, e pel desiderio massimo, che nutrisco per la verità, più d'una volta mi son posto a ricercare con occhio attentissimo, se riuscir mi potesse di rinvenire alcuna delle tanto celebrate diramazioni: ma null'altro m'è avvenuto di conoscere, se non che a me è impossibile il vedere verun filamento nervoso penetrante nella sostanza del tendine di Achille, o della dura madre. Mossi nondimeno alcuni dalla novità delle vostre osservazioni, e da quelle del Castelli, dello Zimmermann, e d'altri o valenti vostri scolari, o seguaci della vostra dottrina, avendola trovata conforme alla verità, non hanno potuto darsi pace, che la dura madre, il pericranio, il perioftio, i legamenti

menti, e i tendini sieno insensibili, come voi avete insegnato. Ottima cosa è in questi casi il dubitare, ancorchè sieno uomini mas-
simi, che parlino, e il cercare, se ciò, che essi dicono, è confor-
me alla verità, non può, se non commendarsi da chi che sia: la
qual ricerca far si dee senza passione, e senza prevenzione alcuna
per le invecchiate opinioni, seguendo passo passo la natura. Io non
mi conosco sì poco, che affibbiar mi voglia la giornea di decidere
in cosa di tanta delicatezza, qual è la sensitività, o insensitività d'
alcune parti del nostro corpo; e siccome ho in somma considerazio-
ne le egregie vostre osservazioni, che insensitive le dimostrano, co-
si non ardisco oppormi apertamente a quelle d' altri uomini celebri,
che sensitive in ogni modo le vogliono. Per la qual cosa mi con-
tenterò di narrarvi ciò, che a me, e ad alcuni altri è avvenuto di
osservare; e tanto più volentieri il fo, acciocchè note vi sieno dal-
la penna mia medesima, e con quella schietissima verità, con cui
le ho fatto, le seguenti osservazioni.

Essendo caduto dall' altezza di dodici piedi in circa un matto-
ne sul capo nella parte mezzana, e superiore dell' osso parietale de-
stro al muratore Mattia Rama di Graglia, d' età di trentott' anni,
il dì cinque di Novembre dell' anno scorso, non fu egli sorpreso
subito da gravi sintomi, null' altro nel luogo del colpo scorgendosi,
che una semplice contusione ne' tegumenti con un po' di lacerazio-
ne di questi. Il temperamento vigoroso del muratore, e la necessità
di procacciarsi sostentimento furon cagione, ch' egli non curando
il male sofferto, continuasse per qualche tempo il suo lavoro; da
cui non si potè distogliere, se non quando fu attaccato da dolor di
capo, e da febbre, che il diciatette dello stesso mese lo costrinsero
a cercar ricovero nello Spedale di S. Giovanni Battista. Il Sig. An-
drea Verna mio cugino, Cerusico primario di questo Spedale il vi-
sitò, e trovollo con gravezza di capo, larga contusione ne' tegu-
menti, e acuto dolore fisso nel luogo medesimo, su cui cadde il mat-
tone, sintomi accompagnati da febbre gagliarda. L' osservazione di
tali sintomi lo mossero a fare un taglio in croce a' tegumenti, e
al periosio per iscoprire ben bene l' osso, e togliere nel tempo stes-
so qualunque ineguale stiratura, che da tal membrana nascer potes-
se. Scoperto l' osso, in tal guisa vide in esso una sottilissima fissa-
ra: per la qual cosa gli fece il convenevole apparecchio, e gli or-
dinò varie missioni di sangue, alcuni clisteri, e leggerissimo nutri-
mento. Niuna diminuzione di sintomi produssero nel malato questi
rimedj; sicchè, temendo non fosse la cagione ferma al di sotto dell'
osso, pensò, per tentar pure di recargli sollievo, di passare all' ope-
razione del trapano, e m' avvisò di visitarlo il giorno seguente, e
di fargliela, qualora avessi tale operazione creduto opportuna. Il
vidi col Signor Baldi Cerusico Collegiato nella Regia Università,
e assistente dello Spedale, con molti altri Cerusici, e Scolari, e vo-
lendo prima d' ogni altra cosa esser certo, se egli era vegeto, e sa-

no di mente, e in istato di giudicare, e di sentire, non toccai l'apparecchio, ma postomeli in faccia, e fermo guardandolo in viso, gli domandai primieramente, in qual luogo egli si fosse, e' mi rispose d' essere in un letto nello Spedale di S. Giovanni. Gliene chiesi la cagione; e mi disse esservi per grave dolor di capo, cagionato da un colpo di mattone cadutogli sopra. Gli ricercai s' e' sapeva in qual luogo egli si era quando ebbe il colpo: mi replicò, ch' egli era ritto in piedi, lavorando sopra una muraglia di fondamento, quando senza avvedersene gli cadde un mattone sul capo. Soggiunsi, s' e' sapeva da qual altezza caduto fosse il mattone: ed egli prontamente rispose da altezza a un di presso doppia dell' altezza delle cortine del letto, in cui giacendo mi sto presentemente. Ciascun ben vede da queste risposte, senza ch' io addur ne debba altre prove, che nulla avea sofferto il malato nè nell' udito, nè nella favella; e che sano sanissimo era di mente. Vedrassi ora, se a questi sensi corrispondeva quello della vista, di cui m' accertai con queste osservazioni. Gli feci chiudere vicendevolmente ora un occhio, ora un altro, e mentr' egli stava riguardando coll' occhio aperto, saper volli da lui il colore del mio viso, dell' abito mio, e degli altri oggetti, che lo circondavano, e che gli metteva innanzi l' un dopo l' altro. E' distinse esattamente ogni cosa, e d' ogni cosa mi ragguagliò minutamente, confessando di non aver altro incomodo in questa parte, che un senso di peso ne' sopraccigli. Dopo tale diligente esame, e tal certezza della mente, e de' sensi del malato mi posi a scoprir la ferita, da cui levato l' apparecchio vidi l' osso nel mezzo alquanto livido colla sottile fissura da mio cugino accennatami. Gli altri sintomi, de' quali il malato prima si doléva, continuavano colla stessa veemenza, ancorchè dilatati fossero i tegumenti, e il pericranio. Vennemi pertanto in mente, nè credo senza ragione, che per la veemenza del colpo rotto si fosse qualche picciol canale, e uscitone da esso l' umore, ristagnasse o al di sotto dell' osso, o al di sotto della dura madre, dal qual ristagno cagionati fossero sì continui incomodi, e tanto pericolosi. Per la qual cosa volendo pure cercare ogni via di ridonare, se possibil fosse, in qualche guisa la salute al malato, il consiglio seguendo del Signor Andrea, mi parve di non dovermi ad altro partito appigliare, che a quello dell' operazione del trapano. Dilatai perciò in un angolo e i tegumenti, e il perioftio, sì perchè più agevolmente avrei fatta l' operazione, sì perchè la corona del trapano toccar non potesse in parte veruna i lembi della cute. Applicai la corona munita di punteruolo, segnando bel bello l' osso, e fatta sufficiente strada, levai dalla corona il punteruolo, indi seguitai lentamente questa operazione, non già per la non comune spessezza dell' osso, ma per queste due ragioni; la prima per non cacciar troppo addentro o da una parte, o dall' altra i denti della corona; la seconda per poter diligentemente osservare, se nell' ammalato senso al-

cuno

cuno di dolore si eccitava. Con tali precauzioni, e avvertenze terminata la legatura dell' osso, e tolta via la parte segata, introdussi subitamente il coltello lenticolare, non solamente per levare ogni minima particella d' osso, ove per avventura ve ne fosse alcuna rimasta, ma per istaccare ancora tutto all' intorno la dura madre alquanto dall' osso; dopo di che coprii immediatamente il foro dell' osso, e tutta la ferita, per togliere, e impedire ogni contatto dell' aria, lasciando il malato in riposo per breve spazio di tempo. Indi il visitai nuovamente esaminando, se sopra la dura madre vi fosse umore raccolto, ma non ne potei vedere, siccome nemmeno m' accorsi esservene tra la pia madre, e la dura. Questa era del suo colore, e della sua consistenza naturale, nè punta, nè lacerata, nè in verun' altra guisa alterata, e ciò il dico per quel certo discernimento, che nasce da lunga esperienza nelle chirurgiche, e nelle anatomiche osservazioni. Sembrommi questa un' ottima occasione di esplorare, dottissimo Signor Haller, quanto da voi ci è stato insegnato colle esperienze della sensitività, e irritabilità di questa membrana, nè credetti, che il toccare con uno spillo la dura madre dell' ammalato ascriver mi si potesse o a indiscrezione, o a poca cura, o a crudeltà: onde preso uno spillo la toccai leggermente colla punta, e vedendo, che il malato non s' accorgeva nemmeno, che la toccassi, collo stesso lo lacerai leggermente, indi con un po' più di forza, e nulla affatto affatto egli si dolse, nè segno veruno d' irritabilità vidi nella dura madre. Non mi volli però interamente acquietare all' osservazion mia, sebbene molti ad essa fosser presenti, come ho accennato, ma diedi lo spillo al Signor Baldi, il quale anch' egli toccò, e lacerò la dura madre nella stessa guisa, senza che moto alcuno si facesse dall' ammalato, che io riguardava attentamente, nè senso alcuno nè di toccamento, nè di dolore in lui s' eccitasse, come con grande tranquillità rispose, essendone da me nell' atto medesimo interrogato. Vera cosa è, che l' operazione del trapano, dopo la quale il medicai secondo le regole dell' arte nostra, non produsse que' vantaggi, che, e dal cugino mio, e da me, e da qualunque cerusico, (s' io non m' inganno) aspettati si farebbero; perocchè vieppiù accrescendosi i sintomi, il di venti del mese morì (1). Il desiderio pertanto d' osservare, e di convincermi, se con fondamento di ragione pensato si era alla fatta operazione, mi mosse a sparare il capo del cadavere, e a cercare, qual fosse stata la cagion della morte, credendo di poterla in esso rinvenire. Levando via la dura madre, videsi i vasi della pia membrana sommamente rigonfi, e levando anche questa, comparve, gran quantità di marcia tra essa, e la sostanza corticale del cervello,

T 2

lo,

(1) Sopra questo fatto vedansi le eccezioni, nella seconda parte della Lettera del Sig. Verna.

lo, segnatamente lungo l' emisfero destro in quella parte, che appoggiasi al processo, o allungamento detto falciforme. Chi dunque negar potrà con tale osservazione, che, se l' umore sparso fosse stato tra la dura madre, e l' osso, non avesse l' ammalato ricevuto dall' operazione del trapano sollievo grandissimo, e, per dir così, novella vita?

In questo stesso Spedale il dì due del mese di Ottobre del 1755. fu fitirato Bernardo Bianchi di Sella per un ulcere sinuoso, che il pigliava sotto la sura della gamba destra, e penetrando sotto al tendine d' Achille arrivava sino alle ossa del talo, parte delle quali scoperte erano, e tarlate. Fu d' uopo il dilatare per medicarlo tale sinuosità, la qual cosa far non potei senza scoprire onninamente una gran porzione del detto tendine, il quale era sano, e in istato naturale. Per la qual cosa sì io, che il Signor Baldi più d' una volta nel tempo, che il medicavamo, gl' impiantammo nel tendine un' ago, senza che l' ammalato non solamente dato abbia verun segno di dolore, ma siasi nè meno accorto d' esser toccato. Questa osservazione fatta da noi in un' uomo la veggiamo fatta ancora in lepri vive, ed altri animali dal chiarissimo Signor Dottor Giambatista Bianchi, che così scrive, e confessa nella lettera sua al Signor Dottor Giambatista Bassani „ ho veduto qualche volta „ scoprir i tendini d' Achille delle gambe di dietro a lepri vive „ ed altri animali, e in niun modo far gemito, nè altra alterazione „ ne dimostrare, come se nulla vi fosse fatto (1).

La terza mia osservazione la feci in Giacomo Arnaud di Castelmagno, venuto allo Spedale il dì 18. Dicembre dell' anno scorso. Egli cadde dall' altezza di ventiquattro piedi circa, e percuotendo su duri sassi col capo, si fece una contusione sopra l' occipitale con lacerazione de' tegumenti sì propri, che comuni del cranio verso l' angolo posteriore superiore del parietale sinistro, senzache nel sito della ferita segno alcuno apparisse di rottura d' osso, febbene i sintomi, da cui era molestato, dassero sul bel principio segno di effusione d' umore, e pressione o sulla dura madre, o sul cervello. Pertanto dilatai la ferita esteriore, e il pericranio, per iscoprire se qualcosa si vedesse, che rottura d' osso indicasse; ma nulla vidi; onde coll' opportuno apparecchio applicai i convenienti rimedj, e gli feci varie cavate di sangue, passato essendo il quarto di a quella della vena jugulare, perchè niuna diminuzion di sintomi osservavasi. Questa per un poco il sollevò, ma non però in tal guisa, che costretto non fossi il dì seguente a trapanarlo nel sito della ferita, donde uscì non poca quantità di sangue, sparso tra la dura madre, e l' osso. Nettata perciò ben bene dal sangue la dura madre, m' imma-

(1) Per rilevare la verità di questo passo, leggasi la sua eccezione nel luogo citato.

immaginai, che il vedere, come nella prima osservazione avea fatto, se, toccata tal membrana colla punta d' un ago, senso alcuno nell' ammalato si eccitasse, chiamar non si potesse capriccio, indifferenza, poco riguardo, e poca cura al malato; sembrandomi anzi che non facendo, quallora le opportune occasioni ci si presentano, le osservazioni con tutte quelle cautele, e diligenze, che voi, dottissimo Signor Haller, accennate, e volete, che si usino, sia un volere non aprir gli occhi per arrivare a conoscere la verità. Adunque colla punta d' un ago toccai replicatamente, e punsi la dura madre, non accorgendosene nè meno il malato, il quale nel tempo stesso mi stava raccontando col miglior senno del mondo, in qual modo accaduta gli era la sua disgrazia. Nulla giovò al povero infermo l' operazione del trapano, a cui crebbero il dopo pranzo nuovamente i sintomi, a segno che il dì secondo dopo l' operazione morì. Sparai il cranio, e vidi le cose seguenti. Sopra la dura madre trovai in varj luoghi alcuni grumi di sangue: tra la dura, e pia madre, e sulla superficie orizzontale del cervello un' umore condensato di colore bianchiccio, e assai consistente, quale era pure sopra ambo gli emisferi del cervello, e più denso ancora vicino, e lungo il seno longitudinale superiore, e tra la pia madre, e il processo falciforme della dura fino al corpo calloso. Ne' ventricoli laterali, o superiori del cervello, eravi non poco umore assai denso. Rovesciati e il cervello, e il cervelletto colla midolla oblungata, vidi l' osso occipitale rotto, onde staccando dalla faccia interna del medesimo la dura madre, e dalla faccia esterna il pericranio, osservai un vero *ecpieisma*, in cui l' osso occipitale compariva rotto in sette pezzi. La rottura comunicava con quella incavatura, che fa parte del foro stracciato, e che seguendo la direzione della spina posteriore dell' osso occipitale divideva il cerchio del gran foro. I due pezzi maggiori di quest' osso erano dall' angolo superiore fino alla biforcatura del seno longitudinale; rotto essendo pure posteriormente dall' apofisi condiloidea fino al sito, dove sta unito all' osso temporale. Vidi finalmente quest' osso nel sito delle fosse superiori, ed inferiori fortille, quanto è sottile la parte squamosa dell' osso temporale.

Queste sono, dottissimo Signor Haller, schiette, e nette le osservazioni da me fatte, alle quali se alcune altre ne aggiungerò, comunicatemi da altri Cerusici, spero, che non debbano esservi disscare. La prima è del Signor Gioseffo Buzani membro del Real Collegio di Chirurgia, e Cerusico del Regio Spedale de' Santi Maurizio, e Lazaro. A Gioseffo Craverio d' anni sedici in circa, mentre serviva da garzon muratore, piombò dall' alto sul capo il dì 29. d' Ottobre dell' anno scorso, un mattone, che il fece cader a terra colla testa grondante di sangue. Preso da' suoi compagni, privo affatto di sentimento, fu portato nel Regio Spedale, e messo a letto. Fece segli subito una cavata di sangue dal braccio, per mezz-

zo di cui si rinvenne: indi esaminando la ferita, ch' era nella parte posteriore mezzana del parietale sinistro, per mezzo delle opportune dilatazioni, non si potè scoprire nè rottura, nè la minima lesura. La onde colla dieta, co' replicati salassi, e cogli altri convenevoli rimedj sì topici, che universali il buon ammalato se la passò per alcun tempo senz' altro sintoma, che un leggiero, ma continuato dolore al luogo della ferita. Quand' ecco il dodicesimo giorno tutt' a un tratto con qualche rigor di freddo fu assalito da febbre accompagnata da sonnolenza, la quale però non era tale che nol lasciasse rispondere aggiustatamente a tutte le interrogazioni, che gli venivano fatte. Gli si cavò sangue di bel nuovo, ma infruttuosamente, perchè non cedette nè la febbre, nè la sonnolenza. S' appigliò pertanto il valente Cerusico, che con ragione sospettava potesse esservi qualche umore sparso o sopra, o sotto la dura madre, all' operazione del trapano il giorno decimo quarto, e fatto un foro, coll' applicazione d' una delle più vaste corone, e tolto un pezzo osseo, ch' era denso, e spesso assai, e molto aderente alla dura madre, portò su questa il dito mignolo della mano destra, e premendo leggermente, la sentì aderentissima in tutta la circonferenza. Interrogò in tal tempo l' infermo, se sentiva alcun dolore, ed egli rispose di non sentir altro, che un pò di pressione al capo. Diede quindi di mano il Signor Buzani a una piccola lancetta, con cui punse il centro della dura madre, donde uscì subito sangue assai nero, e quasi spumoso. Interrogò di nuovo l' ammalato, se sentito aveva pungersegli il capo, e rispose di no (1). Pel foro fatto colla lancetta introdusse una tasta d' argento scannellata alquanto in sulla punta, che molto era ottusa, incurvata, e colla lancetta medesima proseguì l' incisione in croce della dura madre, interrogando ad ogni colpo di lancetta, che furono più di quattro, il malato, se soffriva alcun dolore, e replicatamente gli rispose non sentir nulla.

Alla diligente, ed accurata osservazione del nostro Signor Buzani alcune altre ne seguono del Signor Giovanni Domenico Robbiati Cerusico in Vercelli. Essendo stato ferito, il dì 15. di Novembre dell' anno scorso, un Cavaliere, collo scoprimento del tendine estensore del dito mignolo, più d' una volta colla sonda, e colla punta del bistorino il Signor Robbiati gli stimolò il tendine, non avendone il Cavaliere sentito alcun dolore. Il dì 16. dello stesso mese ferito Giovanni Krautvorts coll' ugnà d' una tigre nel pollice della mano destra pel tratto della metà della prima falange, fino alla metà della terza collo scoprimento del tendine estensore, e una porzione del medesimo tendine lacerata inugualmente, gli tagliò questa porzione di tendine, senza che il ferito s' accorgesse.

nem-

(1) Quanto a ciò che il Sig. Verna riporta del Sig. Buzani si osservino le eccezioni alla sua lettera nella parte seconda.

nemmeno del taglio. In quest' anno fu chiamato il Signor Robbiati a visitare uno, a cui per puntura fatta in una cavata di sangue all' aponeurosi del muscolo bicipite, o forse a qualche nervo, che sopra vi scorreva, dalla qual puntura nato n' era strangolamento, fu costretto fare due grandi incisioni, e scoprire il tendine. La vista del tendine lo mosse a sperimentarne la sensitività, e preso spirito di vino rettificato, fece alcune incisioni in esso, e il toccò replicatamente collo spirito di vino, senzache l' ammalato, il qual sapeva, e vedeva ogni cosa, provato abbia alcun dolore. Il giorno seguente scarificò di nuovo il tendine, e lo toccò con fila inzuppate nello spirito di vitriolo fumante, e nè pure da questo si eccitò nel malato senso alcuno di dolore. Dopo tre giorni fece nuove scarificazioni, e toccò di bel nuovo il tendine col butiro d' antimonio, e l' ammalato nè meno questa volta senti alcun dolore. Con queste osservazioni però non si tirò in lungo la guarigione, perciocchè, primache le incisioni fossero rimarginate, l' escare nate da corrosivi erano già separate, e l' ammalato a poco a poco si ristabilì egregiamente, niuna difficoltà provando nel muovere il braccio.

Venendo da Novara un' galant' uomo ebbe un colpo di piede ferrato da un cavallo, che gli fece una ferita alla metà della tibia sopra il dorso, larga mezzo traverso di dito, e lunga tre volte tanto, con iscoprimento del periostio. Lo scarificò il Signor Robbiati in diversi luoghi sino all' osso, e trovando alcuni ineguali attaccamenti dell' aponeurosi della fascia lata le tagliò colla punta della lancetta, e con questa ancora toccò più d' una volta il periostio, di nulla accorto essendosi l' ammalato, mentre il toccava e nell' aponeurosi, e nel periostio. E' tagliò ancora a una donna di cinquantacinqu' anni, per una ferita avuta nella testa, collo scoprimento del pericranio, il pericranio medesimo in figura di sette, senza che essa sentito abbia alcun dolore. Finalmente fece lo stesso taglio a un ragazzino full' osso frontale, e osservò la medesima insensività.

Se da queste osservazioni, dottissimo Signor Haller, fatte con esattezza massima dedur si possa qualche cosa circa l' insensività di queste parti, m' immagino, che non difficilmente veder si possa da chi che sia. Io per me certo a voi sono obbligatissimo, perchè aperta avete una strada a molte nuove ricerche, e m' avete mosso ad esaminare cose, alle quali seguendo la volgare opinione, non avrei pensato giammai. Questo sarebbe il fine della mia lettera, se non sapessi, quanto vi piacciono le osservazioni in ogni genere. La terminerò adunque con una, per quanto mi ricordo, assai rara. Nacquè quì una ragazza il dì dodici Febrajo, la quale poco dopo succhiato il latte lo rigettava. Niun caso fecero di ciò il primo giorno i genitori: ma osservando, che e il secondo, e il terzo giorno succedeva lo stesso vomito, e che v' era anzi mescolato col latte alcun poco di feccioso, mi chiamarono a visitarla. Osservai primieramente, che nulla usciva dagl' intestini, indi trovai l' addome un poco eleva-

elevato, e resistente. Introdussi una piccola sonda nell' uretra, per cui comincio ad uscìr l' orina, la qual seguitò, finchè visse: indi visitai l' ano, e a prima vista osservai la cute forata colla figura naturale dell' ano: ma introdotta in questo la sonda per conoscere, qual fosse l' ostacolo opposto all' uscita della fece, appena penetrai per la lunghezza d' un pollice traverso, che incontrai tal resistenza, che non mi fu possibile il cacciarla più avanti. Dubitando, che perciò la piccolezza dello strumento incontrasse qualche ruga dell' intestino retto, ne pressai un più grosso; ma nè men questo potè penetrare più addentro, sebbene tentassi ogni via, per vedere, se mi riuscisse, senza lacerar nulla, di farlo scorrere. Credetti per tanto, che l' intestino fosse del tutto chiuso, e il dissi a' suoi genitori, a' quali soggiunsi non parermi opportuno il fare veruna operazione, sì perchè non v' era certezza, che l' intestino venisse sino a combaciamento della cute, sì perchè, quando anche a tal segno fosse venuto, e tagliato si fosse l' intestino, l' esito dell' operazione era incertissimo. Si lasciò la ragazzina in questo stato, e dopo continui vomiti e di latte, e di fecce, il dì sette di Marzo morì. La sparai il giorno seguente, e nelle annesse figure vedrete, quanto in essa ho osservato, essendo tutte le altre parti in istato naturale. Gradite, dottissimo Signor Haller, questa piccola dimostrazione di sincerissima stima, e farò contentissimo, se nel numero de' vostri singolari estimatori, e servitori mi riporrete.

Torino li 15. Dicembre 1757.

Devotiss., ed Obblig. servitore
Giambatista Verna.

DEL

L E T T E R A

S C R I T T A

ALL'AUTORE DELLA RACCOLTA.

Tempo è la pregarai a farmi il piacere di provvedermi un esemplare dell'opera del P. Beccaria sopra la Elettricità, che in una di coteste stamperie Bolognesi doveva imprimersi, subito, che fosse da quella uscita. Non avendolo veduto sino ad ora comparire, le rinnovo la memoria, non perchè dubiti, che le sia sfuggito di mente; ma perchè vò sollecito di averlo quanto più presto si può, come cosa, che non vedo l'ora di leggere.

Troverà a questa mia uno scritto annesso, da altro amico mio a più breve lezione ridotto, sulla materia ch'ella raccoglie, e bramerei che facessegli avere un qualche luogo nel supplimento, che presentemente tiene per quanto sento sotto i torchj. Se vede aver luogo di farlo, faccialo, onde l'amico, che tanto mi preme, venga servito, e s'assicuri, che le ne saprò grado. Qui in Modena sentii leggere una dissertazione opposta all' Hallero, e se non m'inganno, pare, che gli esperimenti e le ragioni, che la fiancheggiavano quadrino a maraviglia. O che quistione intrigata! e a chi s'ha a credere? In questa Città poco più mi tratterò, perchè vò passare a Padova. So che il Signor Domenico Vandelli è tornato a Bologna, per ciò vedendolo, me lo saluti caramente. Stò in attenzione di sua grazia, e sono &c.

DELLE PARTI INSENSIBILI, ED IRRITABILI
DEGLI ANIMALI

DISCORSO TEORICO-PRATICO

DI ORAZIO MARIA PAGANI

D' Arzignano, Dottore in Medicina

E

DI CAMMILLO BONIOLI

Di Lonigo, Chirurgo

Ridotto a lezione più breve, e di alcune annotazioni illustrato

Da C. M. M.

S. I.

FRa le più industriose scoperte, che o si son fatte nell' età scorse, o da illustri osservatori presentemente si fanno, lodevoli in sommo grado son quelle, che riconoscono per loro oggetto il maggior bene dell' uomo, vale a dir la salute. Una sì fatta ce ne palesò nuovamente il celebre Signor Haller lume risplendentissimo, della teorica egualmente, che della pratica medicina, per cui debbono sapergli assai grado coloro tutti, ch' amano sì prezioso tesoro; e più d'ogni altro gliel dobbiamo noi Medici, e Chirurghi, i quali oltre al beneficio, a cui col restante degli uomini partecipiamo, si godiamo pur anche quello d' avere acquistata sì bella cognizione, e di poterfene con nostra riputazione, e diletto (1) valere, quantunque volte l' altrui bisogno l' esiga. Questa scoperta, di cui favellasi con tant' onore, si è l' insensibilità d' alcune parti dell' animale, alle quali fu sempre attribuito squisitissimo senso, comechè non ne abbian veruno (2). Da questo fallo universal pregiudizio si vuol pur trarre que' pochi, i quali con ammirabile sagacità ne scoprirono, e ne descrisser talune per intensibili, o almen per poco sensibili. Noi sappiamo però, che mal-

(1) Non so certamente quale specie di diletto, e riputazione acquisterano questi Signori Medici, e Chirurghi potendosi valere di così bella cognizione.

(2) Precipitar nel giudizio prima di maturare le cose, non è da uomo prudente.

malgrado la tanta evidenza, a cui fu portata questa scoperta dal Signor Haller e da altri dotti uomini, che gloriosamente il seguirono, regna pur anche nella mente di personaggi eccellenti una contraria opinione, cui stabiliscono con esperienze del tutto opposte, che daranno fra poco per quanto dicefi, pubblicamente alla luce (1). Fra i disparei d' uomini sì rispettabili, per accostarsi più al vero, che ci fosse permesso, pensato abbiamo di far anche noi le nostre sperienze; le quali fatte, abbiám giudicato di doverle esporre pubblicamente, e di corredarle via via con que' riflessi, che ci parvero più vantaggiosi nel caso nostro. Avanti però di far questo noi pensiamo ben di premettere quali sien quelle parti, che abbiám trovate insensibili, e che cosa da noi s' intenda per questo termine. Per sensibilità noi intendiamo quella speciale ingenita facoltà dell' anima, per cui rappresent' ella a se stessa l' idea del dolore, e del piacere, o d' altra qualunque sensazione; e ciò col mezzo degli organi, che son destinati a riportare in essa i cambiamenti, a' quali soggiacciono, mercè gli oggetti esteriori, che ve gl' inducono. Diremo dunque sensibili quelle parti, che in qualunque maniera toccate risveglian nell' anima le sensazioni, e chiameremo all' opposto insensibili l' altre, che non son atte a ciò fare. Il Signor Zimmerman dotto scolare del Signor Haller ci avvertisce sul bel principio, che egli prende talvolta la sensibilità per l' irritabilità, (§. XII.) e questa per quella; e di là nasce, che egli nel corso dell' opera confonde l' una coll' altra. Il Signor Haller all' incontro scevera scrupolosamente l' una dall' altra, mentre c' insegna (a) che alcune parti sensibili non sono irritabili, e per contrario alcun' altre sono irritabili senz' esser punto sensibili. Noi pure siam portati a pensare, che sien esse due qualità differenti del tutto, e crediamo, che la sola definizione, che daremo dell' irritabilità (§. XII.) basti a provar pienamente, e a confermare il nostro parere. Ma noi non prendiamo a esaminare di presente l' accennata quistione; conciossiachè nel corso di questo nostro trattato bastevolmente farem conoscere, che mal s' appone chi crede, che possano queste due facoltà prendersi scambievolmente a talento. Le parti, che noi troviamo

V 2

vammo

(1) Già era stampata, avanti che uscisse alla chiara luce del giorno questo Discorso Theorico-Pratico, la Lettera del Cel. Sig. Lagbi, quella del Cel. Sig. Bianchi di Torino, quella del Ch. Sig. Lamberti d' Alessandria, e la dissertazione del Cel. Mr. le Cat, ed altri opuscoli di diversi accreditati Autori contro questa bella cognizione Halleriana; le quali opere se i nostri Autori avessero lette, e seriamente esaminate, nè avessero avuta tanta premura di comparire in publico, forse forse si sarebbero mutati d' opinione, e del Cel. Sig. Hallero la cognizione della Insensibilità non avrebbero difesa (abbenche sia probabile, considerandola in astratto, come fanno alcuni Medici delle novità in Medicina troppo amanti.)

(a) Dissertaz. int. le part. irr. ecc. p. 88.

vammo insensibili son le seguenti. Aponeurosi. Capsule. Cellulari. Cornea. Fegato. Glandule. Iride. Legamenti. Mediastino. Meningi. Midolla. Milza. Ossa. Periostio. Pericardio. Peritoneo. Pleura. Polmoni. Reni. Tendini. Vene. Arterie.

§. I I.

Al solo nervo, e alle parti nervose tutte noi veggiam data la facoltà del sentire. Quelle, che abbiain testè noverate, sono dunque insensibili, e vuolsi anche aggiugnere non irritabili; cioè a dire, che sono tali, che quantunque irritate nè si contraggono, e si rilasciano vicendevolmente (1), nè inducono altrove o movimento, o convulsione, od altro somiglievol sintoma. Il gran Boerave, la cui giusta riputazione trasse molti a seguirlo, francamente ci disse (a), che tutte le parti del corpo son fabricate di nervi, di dove per conseguenza ne nasce, che ne siano composti anche i tendini. Ma è già buona pezza dacchè siamo usciti d'inganno, mentre ad evidenza si scopre, che il tendine è un prodotto delle fibre del muscolo diverse in tutto da' nervi (2). Il Microscopio, che usammo con tutta la diligenza, di cui fummo capaci, ci mostrò a vista, essere ciascuna di queste fibre visibili da molt' altre composta, e di queste ciascuna essere separata per una cellular tela, che per entro vi si frammette ben destramente, e molte di queste fra loro unite formar de' fascetti, cui separa, e distingue del tutto la cellulare medesima divenuta più densa, e di maggiore sodezza. Così avvien de' fascetti come delle fibre s'è già detto avvenire; poichè molti fra loro uniti insieme, e divisi per la lor cellulare formano un fascetto maggiore, cui 'nvolve la propria cellulare membrana, da buon numero de' quali vien poi composto il corpo tutto del muscolo. Questi fascetti lasciano in certi luoghi de' più larghi intervalli, che non li lasciano in altri, dentro de' quali racchiudesi della cellulare più fitta. Abbonda il muscolo d'ogni sorta di vasi, i quali nella cellulare accennata aggirandosi in mille guise, e serpeggiando, tutto il pervadono, sì veramente, che i più grossi sen vanno ne' maggiori fascetti, e con tal legge sempre con proporzion dividendosi scorrono lungheffo le mataffine minori, e le più gracili fibre. V' ha

(1) La qual cosa si è la contrazione, e distrazione della fibra da tutti i Fisiologi conosciuta col nome greco di sistole, e diastole.

(a) Instit. med. par. 301.

(2) Il Muscolo in qualunque punto s'irriti è sensibilissimo, e ciò accade, perchè in ogni punto del medesimo vi sono nervi, senza de' quali non vi è senso: dunque il muscolo è composto di nervi; ma dal muscolo essendo prodotto il tendine, ne siegue, che ancora il tendine sia di nervi formato; che se il tendine è men sensibile del muscolo, questo proviene e dalla sua tessitura più densa, non che da altre circostanze.

V' ha purè in esso quantità di nervi considerabile, i quali l' accompagnano per tutta la sua lunghezza, nè pria l' abbandonano, ch' egli non giunga a prolungarli nel tendine. Il Tendine non è altro, che un allungamento di tutte le dette fibre, che parallele fra loro, ed accoppiate più strettamente concorrono a formarlo nell' ordine medesimo, con cui producono il muscolo. Riceve il tendine molto minor quantità d' ogni sorta di vasi di quello, che 'l muscolo ne riceva, ed esclude del tutto i nervi, poichè non vi furono da Persona osservati, nè poté scoprirvene alcuno co' suoi vetri l' illustre Signor Leeuvvenhoeck (1). In questo dunque differisce dal muscolo, e ne differisce di più nell' esser egli di sostanza più dura, più compatta, ed assai bianca. La sua vagina è una pura produzione di quella del muscolo, la quale altro non è, se non se, quella medesima cellulare (2), che per entro vi si frappone, la quale al di fuori vestendolo dopo d' avere acquistata maggior sodezza, ed essersi fatta più forte, e più liscia, sembra mutar di natura, il perchè gli scrittori ne la colsero in cambio. In questa tendinosa vagina scopri il Leeuvvenhoeck alcune fila nervose (3).

S. I I I.

Le false osservazioni di quegli Autori, che attribuiscono all' offesa de' tendini tutti que' gravi malori, che seguivano ordinariamente la puntura e l' irritamento di qualche parte poco loro conosciuta, furono la sorgente dell' inganno quasi universale, nel quale rimasero ciecamente ravvolti tutti quelli, che credettero fermamente i tendini dotati di squisitissimo senso, quand' essi non ne hanno veruno. Così la notomia recente, e la osservazione costante c' insegna, dietro le cui scorte, ecco quel tanto, che in vivi animali noi osservammo.

Espe

(1) Se il Leeuvvenhoeck co' suoi microscopj poté vedere in una sola stilla d' acqua migliaja di vermetti, (cosa stupenda e da non crederfi così agevolmente) e nel tendine non vide i nervi, che importa? quando li anno osservati col coltello il Cel. Sig. Lagbi, ed il Ch. Sig. Vandelli, ed altri.

(2) La vagina del tendine essendo tela cellulare, deve essere insensibile secondo i principj di alcuni Halleriani, e pure l' istesso Sig. Hallero, ed altri la trovano sensibile.

(3) Le quali nel tendine s' inseriscono, e che col microscopio non si possono separare ed inseguire nella sostanza del tendine; ma bensì col coltello maneggiato da anatomico spogliato della prevenzione Halleriana, e che abbia perizia, e destrezza, ed insieme pazienza per separare cose intrigate e sottili diramazioni nervose.

Esperienza I.

Si denudò il tendine d' Achille ad un vegeto Cane di mediocre grandezza, e avanti di spogliarlo della vagina, gli s' irritò colla lancetta, e si toccò col butirro d' antimonio. Noi vedemmo il Cane a scuotersi un cotal poco, e a guajolare miseramente (1). Indi dopo d' averne tratta la vagina non diede mai 'l Cane segno alcun di dolore per quanto gli si sia stuzzicato, lacerato, punto, tagliato, tocco col caustico, e bruciato col foco in varj luoghi. Nel momento appresso gli si punse la pelle, e faceva il Canè capirci cogli urli il suo dolore. Tale successo ebbero pure gli esperimenti fatti sul tendine dell' altra gamba.

Esperienza II.

Si nudò il tendine del bicipite ad un' altro Cane, e dopo d' averlo tentato colle sperienze medesime, e trovato del tutto insensibile, passammo a tagliarlo attraverso per metà. Fu appena egli reciso, che una parte tagliata manifestamente si contrasse. Tagliammo del tutto per traverso l' Achille dell' altra gamba, e un degli estremi del tendine si scostò visibilmente dall' altro. Anzi in questo secondo cane, che facemmo morire con un colpo di martello sul capo, e che fu nell' istante preso da una forte convulsione del destro lato, e da una perfetta paralisi del sinistro, noi vedemmo manifestamente allontanarsi l' estremo de' tendini tagliati nell' una gamba, e nell' altra. Noi non ne volemmo di più per riconoscer ne' tendini non altro, che una forza di contrazione, (§. XII.) seppure anche questa non decisi dare piuttosto al muscolo, il quale restando dall' un de' capi senz' alcun punto d' attacco si contrae, e si tira il tendine visibilmente. Questa opinione piace al Signor Wansvieten, (a) ma non viene ammessa visibilmente a niun patto dall' esperto Signor Castelli, (b) il qual ne dice d' aver veduta la contrazione del tendine senza osservarla nel muscolo. Noi non abbi-

mo

(1) La vagina essendo di tela cellulare composta non deve sentire; sebbene a questa obbiezione so che risponderanno avere accidentalmente toccato con la lancetta, o butirro d' antimonio qualche piccol nervo, che sur essa serpeggiava, e quindi essere insorto il senso: ob pensar di bacco? Dunque in qualche punto che s' irriti la vagina vi sarà nervo; atteso che sempre il Sig. Hallero, e molti de' suoi seguaci la ritrovano sensibile, ed il dolore, che alcuna volta anno osservato nel tendine, a piccola porzione di vagina ad esso ancora restata unita lo attribuiscono: Circo- stanze tutte che fanno dire, che la vagina sia una membrana nervosa, non già una tela cellulare.

(a) par. 158.

(b) par. XLVIII.

mo tanto di nostro onde poterli dichiarare per questo piuttosto, che per quell' altro.

Esperienza III.

Giacomo Bertinato legnajuolo in Arzignano, Castello del Vicentino, tagliossi tutto attraverso il tendine estensore del secondo dito del piede. Il tendine si contrasse perfino a rivoltare all' insù l' un degli estremi recisi, il quale avanzando fuor della pelle vedeasi inaridito alcun tempo dopo l' intravenuta sciagura (1). Il dito restò privo affatto di moto. Noi provammo a stirare, e ad irritare quel tendine, che sportava tanto al di fuori, senza che l' uomo ne avesse alcun sentimento. Del resto nel corso tutto del male non altro sentì l' infermo, che un sensibil dolore alla cute.

Esperienza IV.

Il Sig. Giuseppe Bonioli Chirurgo di Lonigo, Castello del Vicentino fu nell' Aprile 1754. improvvisamente colpito nella destra mano da una archibufata di palletoni, i quali entrando per la parte anteriore del carpo uscironli per la posteriore del metacarpo vicino del dito minimo. Restarono semilaceri per tal colpo i tendini lungo e breve flessori delle falangi, il tendine radiale, e lo estensor del dito minimo. Fu la cura ben tosto intrapresa dal Fratello Camillo, il quale pensò non altro dover applicarsi alla ferita, che de' cataplasmi ammollienti, e delle fomentate anodine al braccio, che si era fatto un po gonfio. Per tal mezzo, si ottenne la suppurazione di quella parte validamente infiammata, per cui uscirono porzioni di tendini semilaceri e rotti, e cessarono interamente i dolori, che gli apportavan travaglio. In tale ragguardevole ferita de' tendini non mai successe convulsione veruna, come niuna non ne successe, quand' ei dovette replicatamente senza riguardo trattarli, esaminarli, e stirarli per istaccarne la porzione corrotta. Ma non vide suscitarsi nemeno dolore, da che si conchiude a ragione, che tutti que' gran dolori dal ferito sentiti, non gli erano da altrove cagionati, che dall' irritamento de' nervi sparsi per la parte infiammata, ed offesa. Egli si riebbe ben presto di tale ferita, ma gli rimase per ben tre mesi una tal rigidità in que' tendini, quanto bastava per render minore la facilità del chiudere, e dell' aprire la mano. E non abbiain noi veduto nello Spedale di Firenze il tendine radiale tagliato per metà medicato col vin generoso dal Sig. Beccherini, e perfettamente guarito senza che, o dolore, od alcun menomo incomodo sopravvenisse al malato?

§. IV.

(1) Un nervo che sia giunto ad auidità, ha perduto tutto quanto il suo senso, ed un tendine non ha soggiacere allo stesso? Ob che convincente osservazione!

S. I V.

Ora che abbiain prodotte le nostre sperienze sur una cosa di tanto rilievo, e che si trovano somiglianti cotanto alle già fatte da osservatori sì celebri; nostro pensiero si è d' attenersi all' opinione ben fondata, che i tendini sieno insensibili, checchè in contrario ne riferiscan gli autori. Molto meno noi lasceremo, che ci tolga dal proposito nostro (1) il Signor Domenico Vandelli figlio dell' illustre Signor Girolamo P. P. di Padova, il quale ci asserisce seriamente d' aver veduti de' ramuscelli nervosi andare alla sostanza del tendine, e penetrarla. Noi sappiamo assai bene, che la descrizione, che egli ne fa de' nervi, che vanno al tendine, conviene in qualche parte con quella, che già ne fece l' Illustre Signor Winslow (2), il quale c' insegna, che 'l ramo lungo della grossa branca del nervo sciatico crurale interno dà de' filetti al tendine d' achille. Egli però si contenta di dirci soltanto, che questi filetti, e non già ramuscelli (3), vanno al tendine, senza poi precisamente spiegarli se v' entrino a fondo, e ne penetrin la sostanza, siccome in una tavola fatta a tal fine il Signor Vandelli ci espresse. E questi faranno forse quegli stessi filetti, che rari, e superficiali sono chiamati dal famoso Leeuwenhoeck, che co' suoi vetri ve li scopersè (4) Alla vagina poi (che che ne dicono Platne-
ro,

(1) *Vi vuol altro a distogliere dal loro fermo proposito cotesti Signori, che tutto negano, e nulla provano.*

(2) *Trad. Ital. p. 350. 351.*

(3) *Essi fanno assai bene, che la descrizione de' nervi conviene con quella del Sig. Winslow; ma lo fanno perchè il Sig. Vandelli nella sua prima lettera stampata in Padoa nel 1756 pag. XLIII. del medesimo Winslow su tal proposito riferì tutto intiero il testo, altrimenti questi Signori ne sapevano assai poco.*

(4) *Non anno bene esaminata la tavola del Sig. Vandelli, nella quale veder potevano, che non sono solamente filetti, ma ancora ramuscelli patenti, che per vederli non han mestier di microscopio.*

(5) *Senz' altro sono i medesimi, che col coltello il Sig. Vandelli osservò inserirsi nel tendine di Achille. Che se nella tavola del sopra-detto Sig. Vandelli questi filetti, e ramuscelli sono un po' poco più grossi del naturale, ciò fu fatto ad arte, e per facilità dell' inesperto Incisore. Se poi vogliono negare i nervi del tendine per non averli essi ritrovati, per la medesima ragione li devono negare alla membrana investiente il meato interno dell' orecchia vicina alla membrana del timpano, ed alla membrana interna dell' aspera arteria, le quali abbenchè sian sensibilissime, pure niuno vi a per anche ritrovati i loro nervi. So che alcuni obiet-tano al Sig. Vandelli essere troppo copioso il numero de' nervi da lui ri-trova-*

ro, Ildano, Eistero, Garengot, ed il Wansvieten il quale crede che il tendine sia sensibilissimo e la sua vagina nò, dicendo, che toccando il tendine guarnito della medesima non nascono que' sintomi, che nascer si vedono, se si tocca nudo, dottrina che noi confessiam di non intendere), alla vagina dissi debbonfi riferir que' dolori, de' quali il tendine sembra capace, poichè in essa si scoprono delle filacciche nervose. Quanto mai cade in acconcio quel tanto, che dice il P. Tosetti su tal materia; (a) *Sul principio si procedeva con estrema diligenza nello spogliamento de' tendini, per esplorare, e conoscere se in essi eravi senso: ma appresso colla certezza che non eravi senso, si procedeva a roverscio, vale a dire si tentava colla punta, se l' animale si risentiva, per inferire dal risentimento, che il tendine non era per anche a sufficienza nudato* (1). Il tendine ha la sua forza di contrazione, siasi ella propria del tendine, ovvero prodotta dal muscolo. S' egli dunque del tutto si rompa, se ne scosteranno l' estremità per tal segno, che abbisogneranno d' una forza esteriore, che le accosti, e le mantenga accostate. Si fa lor dunque violenza quando a tal fine si stirano, si cuciono, e per tal mezzo si ritengono in un mutuo combaciamento. Ora questa violenza, e questo continuo stracchiamento fatto ne' tendini, non dovrebb' egli esser seguito da dolori, da convulsioni, e da quegli altri malori tutti; de' quali si fa menzione nelle offese de' tendini? La sperienza ci mostra il contrario, e ce lo avvertisce l' Eistero (b) e l' Wansvieten medesimo. (c) E qui può notarsi contro gli autori pratici, che le ferite de' muscoli sono peggiori di quelle de' tendini, perchè riceve il muscolo quantità grande (2) di nervi, e perchè ammette quantità maggiore di vasi sanguigni.

Suppl. Part. I.

X

§. V.

trovati; ma tale obbiezione se non che poco pratici anatomici (che credono d' essere Barbassori in anatomia per sapere i nomi delle questioni anatomiche, dal Cel. Sig. Hallero nelle sue opere raccolti) anno ardire di produrre in campo; mentre non avranno mai considerata la grande varietà del numero, e distribuzione de' vasi sanguigni, e nervi non solo minimi, ma ancora de' medesimi tronchi ne' cadaveri umani, e sopra ciò, tralasciando moltissimi esempj, loro può servire di regola la tavola del Sig. Lagbi del tendine d' Achille, nella quale si vede, che in un cadavere maggiore, in un' altro minore quantità di nervi s' inseriscono nel tendine di Achille.

(a) Nella Lettera annessa al Zim. c. 297. 298.

(1) E così talmente si stuzzicava, e si tormentava l' animale, finchè del tutto rimanesse oppresso ed insensibile.

(b) t. 2. p. 80.

(c) t. 1. par. 195.

(2) Ciò è falso imperciocchè a proporzione della grandezza del muscolo i nervi, che appariscono, sono pochi.

S. V.

Trovate dunque le nostre sperienze provanti l' insensibilità de' tendini corrispondere appuntino alle fatte e riferite dal Signor Haller, siamo stati d' avviso, che delli tendini si potessero non solo tagliare per metà e attraversarlo, ma cucire ancora troncati che sieno; nè ci siamo ingannati in ciò credere, se questa nostra verace opinione viene appoggiata con osservazioni non poche, che per entro i più recenti Autori si possono leggere. Di fatti, io almeno (Bonioli) affidato sulle mie sperienze, e sulla sincerità, ed ingenuità di quegli scrittori, i quali con tanto applauso, e con tanta schiettezza ne parteciparono le sue scoperte, trattai coraggiosamente in varj incontri col ferro il tendine di Achille già guasto nel Nobile Signor Conte Giulio Volpe Borselli uno de' primarj Cavalieri di questa nostra Città di Vicenza, rispettabile e per la Nobiltà, e per l' Onestà de costumi, e per la profonda dottrina, ch' eccellentemente l' adorna, ed osservai non essergliene mai provenuto nessun danno, e nessun accidente, e molto meno di quelli, che tanto gravosi vengon descritti da' pratici. I dolori, ch' egli soffrì allora quando gli si guastava il tendine, e quando io lo stirava colle pinzette, io li ho sempre a ragion ripetuti dai ramuscelli nervosi della grossa branca del nervo sciatico crurale interno, che vanno alla guaina tendinosa, alla cellulare, e alla cute, le quali si guastavan anch' elle a misura che 'l male progrediva nel tendine (1).

Da ciò che abbiain detto, ogn' uno vede, che puossi fare intorno al tendine qualunque operazione, che che ne dica in contrario il Platner, il quale se vivesse in questi felici tempi, muterebbe non ha dubbio di parere, e leverebbe da suoi scritti ciò che ha in essi insegnato riguardo al tendine; nè potrebbe diversamente fare se ciò che tanti e tanti, e noi pure abbiamo stabilito, viene mirabilmente comprovato dalle osservazioni ed autorità del chiarissimo Signor Montagnana anatomico di merito ed eccellente Medico chirurgo di Vicenza, ottimo conoscitore ed estimator delle cose quant' altri esser lo possa; il quale dice di aver più volte tagliati tendini in

Uomi-

(1) Osservazione che se vera ancor fosse, poco provarebbe, imperciocchè il tendine era guasto. Ma è falsa, atteso che l' istesso Cavaliere confessò aver sofferti veementi, ed atroci dolori: Che se non gli sopravvennero quegli altri sintomi, nulla prova, mentre Alessandro Camerario A&A Nat. Cur. Vol. III. ann. 1733. obs. CXVIII. pag. 371. De extremo pollicis articulo una cum tendine flexore ac nervo violenter avulsis in rustica ancilla. Dice Mutilli pollicis curatio, quantumvis ob extractam geminam chordam valde suspecta, non male tamen successit, nec difficulter absolvi potuit, carens omnino symptomatibus gravibus, ut cito &c.

Uomini, dopo averli a bella posta stirati, (1) irritati, e punti, senza che niuna di queste cose cagionasse dolore ne' suoi malati.

S. VI.

Dopo i tendini, ci pare ragionevolissima cosa di passare alle aponeurosi; le quali tutte, secondo quello che abbiain letto ne' libri de' primi scopritori di sì bella verità sono anch'esse insensibili al par de' tendini, ned irritate cagionano dolori, e convulsioni. Per assicurarsi di ciò siamo ricorsi alla speranza come segue.

Esperienza.

Prendemmo un giovane, e vegeto cane, e dopo averlo legato supino tagliatagli la pelle, ne scoprimmo l'aponeurosi de' muscoli obliqui. Provammo a pungerla, a lacerarla, a toccarla coll' olio di vitriuolo, e ad abbruciarla perfino col fuoco, senza che mai si turbasse il cane, e perdesse punto di quella tranquillità, in cui si era posto qualche tempo dopo l' incision della cute. Anzi, fin che uno degli assistenti faceva le accennate esperienze, il cane mangiava pacificamente un pezzo di pane, che gli fu porto, e mostrava d' accarezzare il padrone. Noi provammo di più ad irritare, a pungere, e ad abbruciare la *linea alba*, il che tutto facevasi senz' alcun senso dell' animale. Simili sperienze fatte sur altri cani, e ch' ebbero sempre l' esito medesimo, ci portarono ad ammirare sempre più l' ingenuità del Sig. Haller così in questa materia, come nelle altre. Quindi si siamo accorti quanto poco a proposito abbia attribuito a queste parti un acutissimo senso il Signor Vansvieten, (a) e Plat-nero; (b) e quanto siasi ingannato Pareo riferendoci la storia di Carlo IX. (2), e Cardano il caso della moglie. La cognizione, che queste parti non sieno nè sensibili, nè irritabili, potrà esserne molto proficua ne' bisogni. Imperocchè quantunque volte soggiacciono esse a que' mali, a' quali van soggette l' altre parti del corpo, potranno essere arditamente tagliate, cucite, corrose, o in qualunque altra maniera trattate.

X 2

S. VII.

(1) Dovevano essere morti queglii Uomini ne' quali stirava i tendini imperocchè non v' ha cosa che più faccia a favore della sensitività de' tendini quanto lo stirarli, a cagione che vengono tirati con esso i nervi distribuentisi al muscolo, e più la vagina, la quale secondo il Signor Haller è sensibile: Anzi dà esso per cautela, sperimentando sul tendine, di non stirarlo, perchè ben conosceva, che avrebbe mostrato senso.

(a) par. 165.

(b) par. 658. Chir. rat.

(2) Che importava quì di nuovo trascrivere quello, che già disse il Sig. Hallero, se ormai è più noto, che non è Agosto nell' anno.

§. VII.

I legamenti sono certamente insensibili, e punto non hanno d'irritabilità. Si refrigniam però a dir di que' soli, che si attaccano alle ossa, e alle loro cartilagini, nè fanno le loro mobili articolazioni, ne impediscon l'uscita delle lor nicchie, e vi custodiscono quell'umore mucilaginoso, che i medici chiaman *Sinovia*, che lubrica perennemente ed irrorà le articolazioni.

Esperienza I.

Pigliammo un cagnolino, al qual nudammo la capsula, e vi facemmo un taglio senza che l'animale ne mostrasse dolore. Lo lasciammo di poi in libertà per attenderne l'esito. Il cane se ne fuggì velocemente in tre zampe, e vedemmo in progresso uscir dal taglio della *sinovia*. Dopo la quiete d'alcuni giorni il cane camminò francamente con tutte quattro le zampe, nè vi restò segno alcuno d'infermità, a riserva della cute non bene ancora cicatrizzata.

Esperienza II.

Scoprimmo a un' altro cane il legamento capsulare, e per entro introdottavi una lesina pungemmo replicatamente la glandula mucosa arvesiana senza che il cane perdesse nulla di quella tranquillità, in cui s'era messo dopo l'incision della cute. Indi slegatolo, e tenutolo in serbo per appararne il successo, lo vedemmo in pochi giorni perfettamente guarire, e camminar francamente. I nostri pratici hanno tenute per ben malvagie le ferite de' legamenti, le loro piaghe, e tutte le altre loro malattie. Ma il contrario c'è insegna il celebre Sig. Haller, (a) e le nostre sperienze cel persuadono.

§. VIII.

La dura madre che involge il cervello, con tutto ciò che ad esso appartiene, e che non ha nè nervi, nè fibre muscolari, ne porterebbe dirittamente a pensare secondo la sua fabbrica ch'ella non sia nè sensibile, nè irritabile, quand'anche questa sua insensibilità non ci venisse posta sott'occhi dalla sperienza, e dalle testimonianze de' Signori la Motte, Zinn, e Mekel; Tutta volta volemmo colle nostre sperienze assicurarcene.

Espe-

(a) *Dissert. int. le part. ec. c. 67.*

Esperienza I.

Noi prendemmo un fortissimo mastino, e legatolo ben strettamente gl' incidemmo la cute, e tutte l' altre parti ad essa soggette perfino che arrivammo al cranio, il quale cautamente levato collo scalpello denudammo la dura madre. Ciò fatto lasciammo ricuperare gli spiriti, e la tranquillità all' animale, il quale non molto stette, che gli uni ugualmente che l' altra perfettamente riebbe. Provammo quindi a toccarla leggiermente col dito, indi a pungerla colla lancetta, a stuzzicarla con de' corpi scabrosi (1), a toccarla col butirro d' antimonio, e coll' olio di vetriuolo. Il cane non diede mai verun segno di dolore; urlava, ed anche si convellava ben tosto, che sopra vi si faceva qualche forte pressione. Vi facemmo poscia de' tagli, e la membrana non mai si contrasse.

Esperienza II.

Si scoprì pure la dura madre ad un' altro cane, e diligentemente osservammo s' ella aveva nessun moto. Noi non ne potemmo notare veruno (2). Fatta indi aprire l' arteria crurale ne lasciammo spillare il sangue, il qual salivasi a una notabile altezza. Provammo in questo stato di cose a pungere, ed irritare la dura madre, nè mai si vide il sangue salirsi o con più impeto, o ad altezza maggiore. Il lodato Signor Vandelli ne asserisce d' aver ne' suoi sperimenti trovato del senso in questa membrana. Si fatte contraddizioni danno pur del fastidio agli osservatori! Noi sappiamo per altro, che non tutte l' esperienze vanno del pari, e che sovente nasce il contrario a quello che s' attendeva, e crediamo ciò addivenire per mancanza della dovuta cautela. Il Signor Vandelli avrà forse nello scoprire la dura madre fatta pressione sul cervello (3), o v' avrà fatto penetrare 'l trapano alcun poco, ed il simile avrà fatto il chirurgo, di cui egli ci parla.

S. I X.

Il Perioftio come ogn' un sa, è una sottil membrana proveniente dal pericranio, la quale veste tutte le Ossà, trattene le articolazioni, e tutti que' luoghi, a' quali s' attaccano i tendini, i muscoli,

(1) Ma non l' anno solleticata, come fecero altri Halleriani, i quali la conobbero molto sensibile con loro dispiacere. (2) Cosa particolare!

(3) Eb! che non sapevano l' esperienza del Cel. Sig. Lagbi, il quale dimostra, che si può comprimere il cervello fino alle sei linee senza indicio di dolore, e senza che l' animale urli, e si convella come dicono questi Signori.

li, e i legamenti, à quali passa sopra, e vestendoli forma il perinefmo. Ella è attaccatissima all' osso, lo penetra per ogni punto, e ne veste gli interstizj, e le cellette. Ella non ha nervi, che ne formin la tessitura, ma ne riceve ben molti dalle parti vicine, i quali scorrono sulla esterna sua superficie, e sen vanno alla cute. Da tutto ciò è dunque ragionevole, che il periofstio sia insensibile, e in fatti le osservazioni, che su vi facemmo, abbastanza cel comprovarono.

Esperienza.

Tagliammo ad un cane gli integumenti d' una gamba, e gli snudammo il periofstio. Rimesso ch' e' si fu in calma noi gli pungeammo, gli lacerammo, e gli bruciammo il periofstio, e l' animale si mostrò insensibil del tutto a queste sperienze. Abbiamo più volte veduto il medesimo in altre molte osservazioni che si son fatte, e che tralasciamo di scrivere per essere affatto simili. Anche qui noi discordiamo dal Signor Vandelli. Egli vuole, che 'l periofstio sia sensitivo, e noi gli neghiamo questa sensibilità (1). In conferma della sua opinione egli cita, e trascrive una lettera del tanto rinomato Signore Stella chirurgo in Vicenza, che prova la sensibilità del medesimo. Esaminiamola in grazia, e vediamo, se l' istoria, che in essa si contiene, può essere per niun conto favorevole al suo parere. Gli scrive questo degno chirurgo, che l' applicazione del caustico del Vesalio sul periofstio riuscì molto dolorosa al nobil paziente, di cui trattava la cura. Ma presso chi trovar potrà piena fede osservazione sì fatta, a cui mancano le dovute cautele, perchè su vi si possa far fondamento (2)? E non è egli probabile, per non dire di più, che questo sì attivo caustico siasi anche sparso sulle vicine parti, vogliam dir sulla cute, su' nervi, e su' muscoli, ed abbia cagionato per la qual dolore, che fù sì molesto al dignissimo cavaliere (3)? L' autor della lettera potrebb' e' con certezza asserire, che non v' erano nervi sul periofstio, su quali essercitasse

(1) Il negare è facile; ma il provare difficile. E se negano al Sig. Vandelli questa sensibilità, perchè non la contrastano ancora al Sig. Zimmerman, che prima di lui lo mostrò sensibile?

(2) Forse era necessario separare i nervi dal periofstio.

(3) La cute era tagliata, e divisa per dar spazio alla susseguente operazione. Muscoli sopra la faccia anteriore della Tibia sotto il tubercolo della medesima, dove si fece il taglio, non si vedevano. I nervi poi, che sono propri del periofstio al certo vi saranno stati, atteso che senza nervi non vi è senso, come l'anno sempre conosciuto tutti i Fisiologi: Infine il caustico non viene posto ad oncie, onde dispergere si possa su le parti circonvicine, le quali vengono ben difese dalle filaccie.

rasse la sua gran forza quel caustico (1)? Dove si tratta di stabilire una verità, a cui sia di base l'osservazione, deesi usare tutta la diligenza, onde non resti verun sospetto, che 'l fenomeno di cui si cerca, da un'altra causa venga piuttosto, che da quella, da cui si crede, prodotto. Tutta questa cautela è senza dubbio contenuta nel caso, che ci è narrato dal famoso Signor Castelli; della donna a cui riuscì insensibile l'incision del perioestio (2). Fu ella avvertita a ben badare se sentiva dolore allora quando il puro perioestio veniva tagliato, e confessò di non sentirvene alcuno, malgrado la contraria opinione, e 'l forte pregiudizio in cui era, avanti che l'operazione si amministrasse. E non dee farsi già conto di ciò che ne dice il Signor Vandelli, che 'l dolore, che veniva causato alla donna dall' incision del perioestio, fosse ricoperto da quello, che le veniva dal taglio dell' altre parti; poichè per non affirire si fatta cosa contraria in tutto all' evidenza, bastava solo ch' egli si riducesse in memoria quanto gli scrisse nella sua lettera il Signor Stella: *il caustico del Vesalio riuscì molto doloroso, e più di qualunque altra, susseguente operazione dolorosa fatta in esso cavaliere* (3). Non è dunque il dolore, che dalla lesione del perioestio proviene, sì piccolo, che possa essere ricoperto affatto da quello, che dalla lesione degli integumenti ne viene (4). E molto meno dovressi dirlo a ragione nel

(1) Quì consiste la gran forza della questione Halleriana, che viene alla fin fine a provare, che niuna parte dell' uman corpo è sensibile fuorchè i nervi: Perciò alcuni Metafisici la discorrono così. Il tendine per se è insensibile, essendo privo di nervi propri; che se dopo una puntura di tendine si sente dolore, ciò proviene dai nervi della vagina del medesimo tendine; e così van discorrendo delle altre parti da loro credute insensibili, alle quali benchè sopra serpeggi grande quantità di nervi, basta, che questi non s' insinuino nella sostanza delle medesime per determinarle prive di senso; per la qual cosa ne siegue, che il Chirurgo, che senza tema alcuna da qui avanti vogli operare sopra le parti dette insensibili, prima separar deve i nervi tutti, che sur le medesime sono sparsi, ed indi tagliare, lacerare, bruciare senza arrecare niun tormento all' infermo: E questa si è l' utilità della celebre questione.

(2) Il Cb. Sig. Castelli nella sua dissertazione sulle parti insensibili degli animali Trad. Scholio II. pag. 153. e p. 154. esp. X; dice: Nel tagliar dunque la cute colla carne, e allontanarla dall' osso, volle la donna tener gli occhi fissi all' operazione, sebbene gli astanti la dissuadessero. In questo tempo non lasciò di altamente lagnarsi pel dolor che provava. Lo che non dice il Cb. Sig. Stella di essere accaduto nel taglio di quella gamba.

(3) Il Sig. Vandelli disse, che il dolore antecedente al taglio assopisce, e quasi anichila quello del perioestio, non già il susseguente; onde niente a che fare questa citazione.

(4) Non solamente dagli integumenti; ma ancora da muscoli, e nervi, i quali sono più sensibili del perioestio.

nel caso nostro, dovè la donna, su di cui s' operava, metteva ogni attenzione per sentire il dolore, che da quel taglio gliene farebbe venuto. E poi non ne dicono tutti i pratici, che 'l dolore nelle amputazioni si fa sentire acerbissimo, quando si separa il perioftio dall' ossa? E non attendeasi il medesimo la donna del Signor Castelli (a), la quale aveva inteso da altre persone, che nel taglio di qualche membro si provava dolore acerbissimo quando giunge il cchirurgo a staccare dall' osso una sottile membrana? Ma per lasciare ogni cosa da parte il Signor Stella a tutt' altro pensando gli aveva tolto nella sua lettera sì debile rifugio. Dolorosa è riescita, dic' egli, la separazione del perioftio in occasione di fare l' amputazione d' una gamba. (1) Se 'l dolore nel perioftio si fa in tali incontri sentire agli altri, perchè vuol egli farci credere, che 'l medesimo non farebbe avvenuto alla donna, di cui si tratta, quando ella ve l' avesse avuto in effetto (2). Dovrem noi credere all' autorità sua piuttosto, che all' asserzioni di chi doveva necessariamente sentire? Su qual fondamento, o ragione appoggia la sua opinione. Noi ben sappiamo, che Ippocrate (b) ne avvertisce, che *duobus doloribus simul obortis in eodem loco vehementior obscurat alterum*: ma non ne dic' egli già che 'l maggior dolore abolisca del tutto la molesta sensazione del minore. Il suo famoso comentatore De-Gorter su questo aforismo così la discorre. *Unus dolor obscurat alterum, quod denotat dolorem mitiorem non curari, vel tolli, sed minus sentiri si levior dolor aliam partem infestat*. Si posson leggere gli esempj che in conferma ne adduce, da' quali assai bene s' intenderà, che 'l dolore più grande può ben minorare la sensazione, che 'l più piccolo apporta, ma non levarla del tutto (3). Il medesimo

(a) par. 81.

(1) E' riescita dolorosa; ma non dice, che il paziente abbia sofferti atroci dolori nel taglio d' altre parti più sensibili, le quali si possono rendere quasi insensibili con la maggiore compressione fatta sopra le medesime dal torchietto.

(2) Ma la Donna, come avverte il Sig. Castelli, sentì grandissimo dolore nel taglio delle indicate parti.

(b) afor. 46. sez. 2.

(3) Sopra tale proposito devono leggere l' esperienza, ed osservazioni del Sig. Vandelli sì nella prima sua lettera, come nella seconda, e terza intorno alla Sensibilità, e vedranno se un maggior dolore può sopire un minore, ed una sensazione gagliarda del tutto abolire la minore, come scrisse Francesco Glissonio *Tract. de natura substantiæ energetica &c.* Lendini 1672. ad Lectorem S. II. Qui uni obiecto valde intentus est, idque præsertim quasi acstaticè contemplatur, alia simul externis organis obvia non sentit. Ed il Brinio de spirit. animal. inquis. n. 136. dice. Qui ira, furore detenti, ictus tormentorum

fimo noi stimiamo avvenir del dolore, che delle altre sensazion addivene. Tutte le grida d' una pubblica piazza, dice l' autore dello spettacolo della natura, pervengono a tutte l' orecchie del vicinato: tutte le voci d' un concerto forti, e deboli feriscono tutti gli uditori. Ma la voce più dominante si distingue, e l' arcata più appoggiata è più forte è la meglio intesa. Parci pertanto di poter conchiudere con ragione, che non abbia sentito la donna dolor nel Perioftio perchè n' è questa membrana incapace del tutto: e ci appar troppo chiaro, che da quel, che gli dice il Signor Stella, e' non può tirar cos' alcuna in suo favore, essendo la prima osservazione insufficiente, ed essendo avvenuto nella seconda ciò, che avviene in quelle degli altri, per servirmi delle parole del Signor Zimmerman (a) che avranno i suoi strumenti nell' attraversare regioni incognite, incontrato per via qualche nervo. Il dolore da cui era cotanto afflitto il celebre Signor Bellini per quel tumore, ch' egli chiama *Corniculum*, proveniva direttamente da' nervi, che van rasente al perioftio (1), i quali avendo un certo grado di tensione allora quando si disperdono sur una piana superficie, vengon distratti sì tosto e tesi diversamente da che in essa una qualche altura si forma, e cagionano de' dolori atrocissimi. Fuor di proposito dunque gli attribuisce il Signor Vandelli al perioftio; siccome fuor di proposito il Bellini ne dice: *Frangitur dolor est sensus divulsionis in membranis interius, atque exterius ossium cavitates, & superficies quasdam succingentibus.*

Suppl. Part. I.

Y

§. X.

torum bellicorum, & excruciantes alias & sensibiles minime impressiones non percipiunt interdum, hoc ideo fit, non quia vellicatio a glande totmentaria, gladio, vel sono, & reliquis, in sensus organo, & nervis facta, non sit doloris causa, sed quin nervi &c. Ed il Ch. Sig. Filippo di Violante in una lettera, che è la 70. nella Raccolta dei diplomi &c. del Cel. Sig. Conte Francesco Roncalli Patolini pag. 121. in data di Dresda an. 1746. §. 7. dice. Guttula illa sudoris, quæ per frontem, & nasi dorsum ad extremam illis partem lambendo in reis, qui torquentur fluit, potentissima causa est, ut hi suum fateantur crimen: & licet per torturam maximo affligantur dolore, tolerant tamen isti torturam, torturæ molestiam non amplius sentiunt, unam tantum sudoris guttulam per nasi dorsum ad ipsius septum prolabantem ferre minime valentes; quæ vellicazione, ac titillatione ita ipsos molestat, atque affligit, ut nulla habita ratione mortis per carnificis manum, & infamiæ, qua deturpantur, omnia deponunt, & fatentur, dummodo ab afflictione illa, a sudoris guttula illata liberari se possint &c.

(a) par. VIII.

(1) Dunque in tutte le parti del perioftio vi fanno nascere i nervi; quando loro fa a proposito.

S. X.

Il Perioftio interno è della natura medefima dell' efterno, nè vi potemmo mai per qualunque diligenza v' abbiamo pofta, offer-
vare de' nervi. Di là ne viene, che dev' anch' egli effere infen-
fibile ficcome l' altro.

E in fatti full' efempio de' grandi Uomini, che per tale ce lo defcrifero, noi lo irritammo più volte ne' vivi animali, lo pungemmo, ne lo ftaccammo, ne lo bruciammo fenza mai cagionare dolore alcuno nell' animale, per quanto almeno appariva. E non è già da fofpettarfi; che ciò avveniffe per un tal quale ftupor cagionato dal troppo vivo dolore della crudele operazione; imperocchè, fe non ci dava fegno di fenfo, quando gli fi pungeva o ftuzzicava il perioftio, lo dava bene allora, quando gli fi toccavano i nervi (a) o la cute vicina. Niente più fenfibile del perioftio è la midolla, e la membrana che la involve. Nè qui vuolfi aver difcorfo della prima, la quale altro non effendo, che un olio, deve neceffariamente effere infenfibile, come lo è il graffo, e la bile. Pur tutta volta reftar può qualche fofpetto, che il fenfo, che viene ancora pregiudicatamente attribuito alla midolla, nafca da nervi, che vanno alla mentovata membrana. E certamente il Du-verney attelta di aver veduto il nervo andar alla midolla attraverso dell' offò in compagnia dell' arteria e della vena ed effere tutte tre nella ftelfa vagina, che lor veniva dal perioftio. Di più ci dice aver trovato fquiffiffimo fenfo nella midolla, qualunque volta, dopo l' eftirpazione di qualche membro la faceva ftuzzicare. E quefto dimoftrollo più volte nell' Accademia pubblicamente; ficchè pare che debba averfi per fermo, che la midolla ha fenfo: Tutto all' oppofito moftrano le offervazioni del Sig. Haller, e l' autorità di sì grand' Uomo potrebbe ben con ragione sbilanciare il sentimento contrario. Il perchè per trovarne la verità ci mettemmo ad efaminare da foli la cofa, e fenza prevenzione per alcuno. A quefto fine adunque.

Esperienza I.

Noi pigliammo un cane, e fndatogli l' offò lo fegammo tutto trasverfalmente, indi lo lafciammo in quiete per lo fpazio d' una mezz' ora. Provammo poi calmato ch' egli fi fu a pungere, e a ftuzzicare la midolla, e non vedemmo mai verun turbamento, nell' animale. Ma e come dovevamo attenderfi di trovarvi del fenfo, quando ben fapevamo per le afferzioni del Signor Haller, che non v' erano nervi?

Espe-

(a) Convien dire che quefti nervi foffero molto feraci e patenti.

Esperienza II.

Nell' osso d' un' altro cane , a cui 'l segammo a tal fine , mettemmo più volte un ferro infuocato , e dentro ve l' aggirammo senza che ne avessimo indizio alcun di dolore .

Queste osservazioni ci mostrarono veri gl' insegnamenti del Signor Haller , e ci ridussero a mente un' esperienza , che avevamo veduta nello Spedal di Firenze , dove il Signor Giampiero Chefer maestro nel detto Spedale irritò la midolla ad un Religioso , al quale segato aveva una gamba . Il malato non diede alcun segno di senso , quando pure il chirurgo se l' aspettava .

§. XI.

Le membrane sono tante tele lisce , più o meno dense , pieghevoli e capaci d' estensione , e sono guarnite al di fuori di una tela cellulosa per cui scorre ogni sorte di vasi , e di filamenti nervosi , i quali però non ne penetrano la sostanza , e la loro natura sembra cellulare come quella de' periostrj . Tali sono la pleura , i periostrj , il peritoneo &c. Ma prima della pleura .

La pleura , è più dura del peritoneo specialmente verso il dorso ; ha le arterie e le vene dalle intercostali , ed i nervi , che dagli Autori le sono dati , non fanno che strisciarsi sulla sua superficie . Per provarne la sua insensibilità ;

Esperienza I.

Noi legammo un cane , e separati colla cute gl' integumenti , gli nudammo con gran pazienza la pleura , il che non potè farsi senza che 'l cane ci desse continui segni di gran dolore . Lo lasciammo riprendere la perduta sua calma , e rifarsi tranquillo , e puntagli in questo stato la pleura , lo vedemmo immobile affatto . Versammo nel taglio dell' olio di vitriuolo , e 'l cane nulla si commosse , e non ci diede verun segnale di senso . Niente più di turbamento non gli cagionarono nè la lacerazione di questa membrana , nè l' irritazione , nè la combustione .

Il mediastino , essendo una produzione della pleura , è insensibil com' essa . Del pericardio non diremo niente più di quello abbiam detto del mediastino , perchè è della stessa natura , e lo trovammo insensibile . Anch' esso il peritoneo è della stessa indole della pleura ; ha però minore quantità di vasi , e quantunque non sia mai stato da niuno attribuito senso a questa membrana , v' abbiamo voluto far sopra i nostri sperimenti .

Esperienza II.

Toccammo a un cane il peritoneo col butirro d'antimonio, e coll' olio di vitriuolo, e dopo con un ferro ben infuocato, nè mai l' animale mostrò di sentirne dolore; ma bensì urlava, e si divincolava quanto il poteva, quando qualche simile operazione gli si faceva nella cute, o ne' muscoli incisi. L' osservazioni fatte sur altri cani ebbero sempre il successo medesimo.

Per ciò, che riguarda la cornea, di cui prendiamo in primo luogo a parlare, noi la consideriamo una produzione della dura madre, chechè in contrario molti autori ne dicano, e però insensibile. Alcuni notomisti, e de' più accreditati, dicono d' averla veduta ben corredata di nervi, e il Sig. Haller si protesta di non avervene mai potuto ritrovare. (a) L' averla noi trovata insensibile affatto nelle nostre replicate esperienze determina ad abbracciar l' opinione di questo grand' uomo, chechè ne dica in contrario il Sig. Vandelli. (1)

L' iride noi la trovammo insensibile ne' nostri esperimenti. Il contrario asserisce il Signor Haller, (b) il quale le dà del senso. Noi notiamo qui di passaggio, che su questo proposito egli mostra di confondere la sensibilità coll' irritabilità, di cui parleremo a suo luogo, le quali due qualità nel principio della sua dissertazione scervera, scrupolosamente, e distingue.

S. XII.

Della Irritabilità delle parti.

Eccoci pervenuti alla fine di quanto avevamo divisato di dire intorno alla insensibilità delle parti tralle quali voglion si porre anche i visceri, di cui non abbiamo fatto parole, perchè son' essi già stato per lo passato ancora conosciuti comunemente di niuno, o di poco senso. Venghiamo ora alla irritabilità.

Per irritabilità noi intendiamo quella particolar facoltà, che hanno alcune parti del corpo animale di contraersi, e di rilasciarsi vicendevolmente, e di fare un moto d' ondeggiamento, il quale vien suscitato, od anche accresciuto da qualunque stimolo, che vi si accosti (2). Questa facoltà è distinta da ogni altra, ed è, come dice il Sig. Haller (c). *Vis ab omni alia distincta cognita proprietate*

(a) Diff. c. 86. (1) Non è solo il Sig. Vandelli, che l' abbia trovata sensibile; ci sono stati altri Professori come possono leggere; e poi gli Signori Tagani, e Bonioli si faccian soffiare un po di polve negli occhi, e mi sapran dire, se la cornea è insensibile. (b) Diff. c. 86.

(2) Questa non è mai l' irritabilità Halleriana, anzi più tosto sembra la fistole, e diastole irregolare. (c) pr. lin. phis. par. 408.

de corporum diversa, & nova. (1) Non si riporterà quindi la serie degli Autori, che sembrano aver parlato di questa nova forza come fanno gli Autori della dissertazione per mostrare, che non è stato il primo il Sig. Hallero a parlarne, perchè appo i dotti sono cogniti; neppure si è curato di trascrivere come essi hanno fatto le loro dottrine, con ciò sia che nella fisiologia sono note abbastanza; solo vuolsi intatto riportare il seguente passo, che gli stessi Signori come nota pongono.

Per dimostrare, che l'irritabilità è stata conosciuta da altri Scrittori, avanti che il Sig. Haller ne facesse parole, si sono addotti alcuni passi d' Autori, ne' quali non si fa menzione di niuna altra forza, che di quella di contrazione; locche potrebbe per avventura far credere, che noi confondiamo due facoltà, che sollecitamente separiamo nel seguente capitolo. Ma noi facciam questo, perchè il Sig. Haller non troppo si cura di distinguere l'una dall' altra, ed abbiain perciò creduto, che mostrando ch' era nota la forza di contrazione, verremmo a provare per là, ch' era del pari l' irritabilità conosciuta. Un nostro amico eccellente Medico, e de' primarj della Città, al cui penetrante giudizio volemmo assoggettare questa nostra dissertazione prima di pubblicarla, ci disse, ch' egli credeva di non dover riconoscere ne' muscoli altra forza, che quella di contrazione. L' ondeggiamento, che noi ripetiamo dalla irritabilità, proviene per quant' ei pensa dalla varia od anche opposta direzione delle fibre muscolari coneggiate in maniera, che quando l' une si contraggono, tirano l' altre, e le obbligano ad allungarsi, e vicendevolmente quest' altre reagiscono, e producono il medesimo effetto, che prima dell' azione dell' altre aveano sofferto. Noi abbiain voluto palesare questo suo sentimento, sperando che debba piacere, e che possa eccitare taluno a riflettervi sopra.

S. X I I I.

Oltre all' irritabilità, di cui data abbiain la definizione nel precedente paragrafo, avvi nelle parti medesime un' altra facoltà, che è l' elasticità. Nè questa sola è la forza, cui sia bisogno di scervare dall' irritabilità. Un' altra ve n' ha, ed è quella, che noi chiameremo di contrazione (2), la quale si osserva particolarmente in alcune di quelle parti nelle quali non apparisce alcun vestigio d' irritabilità, e delle quali parlano indistintamente, que' dotti scrittori, che

(1) Il Sig. Hallero parla della sua irritabilità, la quale così definisce nella sua dissertazione sopra le parti irritab. e sensib. degli animali. Raccolta di Bologna pag. 34. Chiamo dunque parte irritabile del corpo umano quella, che si contrae quando un qualunque corpo straniero un po' violentemente la tocca.

(2) E' la convulsione sotto questo mistero ascosa.

che hanno di questa lodevolmente trattato. E in fatti, ben' altra si è l'idea della semplice corrugazione, altra quella, che suscita alla mente, e vi presenta quel reciproco ondeggiamento, che chiamano col termine di tremore: E siccome alcune parti si rilasciano mutuamente e si stringono e ondeggiando apertamente, di dove si deduce una particolare facoltà, che a ciò fare le reca; così si contraggono altre perfettamente, e s'increpano, dal che è pur necessario il dedurre, ch' altra siasi la facoltà, che a ciò fare le induce. Queste due proprietà affini fra loro, ma pur diverse, noi crediamo che possano con qualche ragione situarsi nella varia struttura di quelle fibre, che compongono l'une e l'altre; e crediamo di più, che quelle parti, che poste ed accozzate in una maniera, eran atte ad oscillare, diventino sol tanto contrattili, tosto ch' esse diversamente accoppiate fra loro, e strettamente incappate formano un corpo più compatto. Certamente le fibre muscolari, che ondeggian tanto nel muscolo, diventano solamente contrattili nel tendine, se si dee credere alle sperienze dello elatissimo Sig. Castelli (a) sopra le quali noi abbiamo fatto sufficiente numero d'osservazioni, per cui stabilire si fatta verità. Almeno gli è vero, che le fibre muscolari perdono l'irritabilità dacché diventano tendinose. Ma perchè queste fibre conservano in apparenza la loro natura nelle arterie, nella vescica, ne' sfinteri, e in molte parti senza avere alcun segno d'irritabilità, non si dee credere con ragione, che ciò avvenga dall'intima impercettibile varietà della lor fabbrica? Il vedere, che molti corpi col cambiar solo la struttura dell'intime particelle, o acquistano una forza, che non avevano prima, o la perdono, o l'aumentano, ci fa sospettare, che il medesimo avvenga ancora alle parti di cui trattiamo. Che che però ne sia di queste due facoltà, e qualunque sia la differenza della struttura, o d'altra qualunque tal cosa, noi poniamo solamente per certo la di loro differente natura, la quale abbiamo cogli occhi proprj osservata. Le reciproche convulsioni, o sia i moti spasmodici, e i tetani, ci rappresentano l'idea di queste due dissimiglievoli facoltà; poichè nella prima viene ad accreiscersi quella specie d'ondeggiamento in cui si mettono le parti animali in grazia dell'irritabilità; e ne' secondi s' eccita e s' aumenta la contrazione, per cui le parti divengono rigide, e somamente contratte. Questa medesima forza di contrazione oltre il porre a valido corrugamento le parti non irritabili, sospende ed arresta l'irritabilità nell'altre e le assoggetta a se stessa. Nelle forti convulsioni toniche noi veggiamo i muscoli irrigiditi, il cuore contratto, gl'intestini a metà, o interamente strozzati, e tutti i moti delle parti irritabili su cui opera la forza di contrazione torpidi ed impediti. E se questa forza si facesse maggiore, non potrebb' ella toglier del tutto, e distruggerne interamente l'azione?

§. XIV.

(a) *Part. 14, 25, 11, 15, 20, 48.*

S. XIV.

Il Signor Haller, di cui deesi con gran rispetto parlare, pensa, che l'irritabilità sia (a) una proprietà del glutine animale nell'istesso modo come si riconosce l'attrazione, e la gravità per proprietà della materia in generale senza poterne determinar le cagioni. Ch'ella sia una proprietà da non potersi assolutamente ad evidenza spiegare e da non determinarne le cause, noi glielo accordiamo ben facilmente; ma non crediamo già di mancare alla venerazione a sì grand' uomo dovuta, se non ammettiam per sua fede la parte gelatinosa, in cui egli la pone. E vero, che la mucosità gelatinosa inchina naturalmente, com' egli ben mostra, ad abbreviarsi allora quando si tocca; ma è ben anche probabile, che questo provenga dalle organiche particelle, di cui or ora diremo, che cercan di mettersi in moto sì tosto, che vengon toccate. A noi dunque par ragionevole di supporre, ch' ella stiasi nelle particelle organiche, di cui siamo principalmente composti. Queste sono quelle particole mobilissime, che contenute nel seme degli animali, e vedute col microscopio dal celebre Leeuwenhoeckio furono da lui credute de' vermi. Fu egli ciò riprovato dal dottissimo Signor Vallisnieri nell' opera della generazione dell' uomo, e quindi trassero il loro sistema que' due gran letterati Buffon, e Needam, i quali col porre il seme nell' acqua calda per via di diligenti, ed accurate osservazioni scopriron essi, che questi pretesi vermetti, altro non erano in effetto, se non particole attive, che si movevano per una lor forza propria, che avevano vario grado di attività, e di moto, e che affettavano sul principio una figura vermicolare, ma che a poco a poco si facevano rotonde, ed acquistavano la forma di tante piccole pallotolette. In queste particelle, in cui si scopre manifestamente tanta mobilità, crediamo doverci porre a ragione l'irritabilità. E perchè questa è varia siccome in ogni sorta d' animali, così in ciascuna parte dell' animale medesimo; perchè differisce secondo il di lui tempo, e perchè s' eccita a qualche stimolo, e punto non si risveglia ad un altro; queste sue varietà crediamo provenire del vario grado d' attività, di cui quelle particole son dotate; dal maggiore e minor numero, che nelle parti sen trova; dalla varia loro disposizione; dalla differente combinazione, tessitura e situazione con cui si son poste, accozzate, e più o meno strette, incrociellate, e mutuamente intrecciate; e finalmente dalla maggiore, o minore quantità dei sali, con cui sono accoppiate, e dalla più grande, o più piccola tenacità della sostanza gelatinosa, in cui s' annidano, e in cui dopo l' infusione nell' acqua calda trovò il Signor Needam per via di reiterate sperienze tutti i possibili gradi di tenacità e di resistenza capace d' essere superata dalla forza vegetativa. S. XV.

(a) Diff. c. 130.

S. X V.

Per dimostrare quanto abbiam testè detto intorno alla necessità della irritabilità, prenderemo qui a brevemente esaminarne gli effetti. Il cuore è l'organo principale da cui dipende la vita. Egli per quella sua propria facoltà per cui continuamente si muove scaccia da sé e strigne il sangue ad entrare nell' aorta, la quale per una mutua reazione urtandolo, lo distribuisce a tutte le arterie, e lo fa correre per ogni punto del corpo. La forza particolare con cui il ventricolo agisce sovra de' cibi, da niun' altra cosa tragge il suo principio, se non che dalla irritabilità, la quale se è sì necessaria al mantenimento della vita, ella non l'è niente meno al mantenimento della salute. Un esempio, onde bastantemente chiarirsene ci somministrano i muscoli irritabili anch' essi. Il loro moto è di una prodigiosa utilità alla perenne circolazione degli Umori. Ajutan con esso le arterie a dar sangue alle vene, e le vene a scaricarsi nel cuore. Scotendo le celette del grasso, conservano alla pinguedine una sufficiente fluidità. Accrescono mirabilmente la forza agli organi delle secrezioni, ed escrezioni; in somma tanta è l' utilità de' suoi moti dalla irritabilità dipendenti, che senza la loro azione le funzioni nell' animale si guasterebbono, e così verrebbe sconcertata la salute. Ciò, che abbiam detto de' muscoli, intender deesi solamente di quelli, che sono men necessari all' assoluto mantenimento della vita; essendo che, ve n' ha ancora di tali, a' quali, se viene per poco interdetta l' azione, l' animale sen muore. Che direm poi di questa irritabilità, e di quanto non le sarei debitori, quando si faremo a riflettere, ch' ella può tanto sul nostro spirito, quanto vaglia a dirigerne le inclinazioni, a produrne gli affetti, a regular le passioni! Noi riconosciamo da lei il moto vegeto e vivido de' solidi; da questa la buon indole e la perfetta qualità degli umori; da questa la vivacità de' sensi, da quali vien poi fedelmente ogni impressione riportata all' anima, la cui stretta unione col corpo l' obbliga a sentirne gli affetti. A norma dunque della maggiore o minore irritabilità, più o meno si esercitan vivamente le funzioni nell' Uomo, e più o meno di brio viene all' anima comunicato. Tale è il parere de' dotti e vero ce lo dimostra la quotidiana esperienza. Imperocchè, il copioso vino, il veleno, il differente cibo, il vario clima, la diversa struttura delle parti, quanta differenza non pongono tra gli Uomini, e spesso spesso nell' Uomo stesso? Il seme della canape produce grati sogni; eccita il solano particolari deliri, ed una tale spezial azione produrranno forse que' filtri, de' quali si parla cotanto ne' libri de' nostri antichi scrittori. A quanto maggiori passioni non vanno soggette le Donne isteriche, e gli Uomini ipocondriaci a cagione della mobilità degli organi loro?

S. XVI.

§. XVI.

Per parti irritabili no^a intendiam quelle, che si contraggono, e si rilasciano successivamente (1).

Parti Irritabili.

Cuore, Muscoli, Stomaco, Intestini.

Le parti nelle quali noi non abbiamo osservato giammai se non la sola forza di contrazione, e che per questo chiamiamo contrattili, benchè sieno dagli autori comprese sotto il titolo di parti irritabili, sono le seguenti.

Parti Contrattili.

Arterie, Condotti escretorj, Esofago, Vene, Vescica fellea, Urinaria, Ureteri, Utero.

Il cuore, e ne convengon gl' autori, è l' organo più irritabile fra tutte le parti degli animali. E in fatti è sempre l' ultimo a perdere l' irritabilità. Oltre le asserzioni de' medesimi, che nel descrivono irritabilissimo, noi volemmo chiarirfene colle nostre esperienze.

Esperienza I.

Si nudò il cuore ad un cane, il quale pulsò per ben lungo tempo, anzi che l' animal sen morisse. Dopo la morte del cane ne lo staccammo, e lo ponemmo sur una tavola, di dove saltellando s'alzò più volte all' aria, tant' era la forza, con cui pulsava. Andava questa a poco a poco sminuendosi, e si svenne, che finì affatto da che furon passati quindici minuti d' ora. Provammo a pungerlo per risvegliarne il moto, e ci riuscì di farlo battere per altri quattro minuti. Dopo di questi fu vano ogni tentativo, che su vi facemmo per porlo nuovamente in azione. Ad altri cani tagliammo in varj pezzetti il cuore, li lavammo con dell' aceto, e li osservammo pulsare per qualche tempo.

Suppl. Part. I.

Z

Espe-

(1) Cioè la sistole, e la diastole.

Esperienza II.

Irritammo il cuore nudato ad un cane collo schizzarvi dell' acqua ben salata, e l' osservammo contrarsi con somma celerità, e rilassarsi. In quest' azione egli diveniva più grosso, più breve, più duro, e impallidiva visibilmente (1). Noi lo staccammo, e introducemmo un dito in un de' ventricoli, il quale ce lo strinse validamente. Così sentimmo le colonne d' esso, e l' eminenze ad ingrossarsi, e indurirsi. Tagliammo a mezzo questo cuore nell' atto della sua contrazione colle cesoje, e non trovammo punto di sangue ne' ventricoli. Così com' eran divisi questi due pezzi continuarono per 23. minuti la loro oscillazione.

Esperienza III.

Si cavò il cuore a una Ranocchia all' ore 15. m. 45., e si lasciò bell' e 'ntero. Continuò egli i suoi battimenti colla violenza medesima, che v' osservammo sì tosto, che lo nudammo. Andò in seguito rallentandosi perfino che all' ore 16. m. 29. s' indebolì a segno di non più muoversi nè men irritato. La contrazione cominciava nell' orecchie, e molto più nella destra, e ordinariamente si diffondeva per tutto il cuore. Poc' anzi di finir le sue palpitazioni arrestò per mezzo m. il suo movimento, che poi riprese da se medesimo.

Esperienza IV.

All' ore 16. m. 6. tagliammo il cuor d' una Rana attraverso, e parte vel lasciammo di dentro attaccato, e parte ne lo cavammo. Tagliammo la parte cavata in due porzioni pel lungo, e queste seguitarono a battere debolmente sino alle ore 16. m. 15. passato il qual tempo se ne restaron del tutto, e rimasero contratte. Questa Rana morì alle ore 16. m. 44. ma la metà trasversale del cuore, ch' era rimasto, continuò a pulsare perfino alle ore 21.

Esperienza V.

S' aperse pel lungo una Rana all' ore 15. m. 40; e nudatole il cuore, n' osservammo attentamente le pulsazioni. Egli diveniva assai bianco nell' atto di costringersi, e si taceva ben rosso nel rilassarsi. Visse la rana in questo stato sino all' ore 16. m. 47. Il cuore seguitò a pulsare sino all' ore 18. m. 5. Provammo fin che la rana viveva a pungerle il cervello. Ella s' agitò validamente, e l' cuore

(1) Ciò nega il Sig. Haller nella sua memoria del moto del sangue.

cuore arrestò per un poco il suo movimento. Produssero sempre il medesimo effetto le replicate punture, che facemmo nel cervello della rana medesima. Provammo poi a pungerle, e a tagliarle le carni delle coscie, e notammo, che allora batteva il cuore più spesso, e più validamente, e molto si dibattè ancora, quando mettemmo del sale in un di que' tagli, che vi s' erano fatti. E' da notarsi ancora, che il moto del cuore si faceva maggiore quando s' irritavano le zampe dinanzi, che quando si stuzzicavan quelle di dietro. E dunque anche per le nostre osservazioni irritabilissimo il cuore. Oltre le già sposte sperienze questa sua grande irritabilità per noi si raccoglie, senza sospetto di errare, dalla sua facilissima mobilità, e dalla lunghezza del tempo con cui mantiene il moto, che vi fu una volta da qualche stimolo impresso.

X V I I.

E' pur mirabile la fabbrica del cuore ! e ben fece Lovvero a dire (a) che è privilegio del solo Dio l' intenderne la cagione del suo movimento. E molti di quelli, i quali non contenti di vedere, e d' ammirare gli effetti si sono forzati di spiegare la causa di questa irritabilità, furono solidamente confutati dal Sig. Zimmermann (b), il quale, siccome si conviene ad un Filosofo, ingenuamente confessò di non intendere quello, che non intende di fatto, e dice di credere, che l' irritabilità debba annoverarsi tra le proprietà primarie de' corpi; che contenga in se stessa la cagion del suo moto, e che come ultimo principio di tutti i movimenti non possa meccanicamente spiegarsi. Fin tanto che l' animale vive, conosciamo assai bene, che questa irritabilità viene eccitata dallo stimolo, il quale vi apportan le vene collo scaricare il loro sangue dentro del cuore: Ma chi ve l' eccita, e per qual cagione direm noi, che batta il cuore quand' e' buona pezza che è già morto? Che il cuore nel corpo vivente seguiti a battere regolarmente, perchè regolarmente vi si portano le cagioni, che ve lo inducono, non è poi gran maraviglia, quallor, se gli accordi la proprietà d' oscillare; ma che levati del tutto gli stimoli, e toltane per ciò la causa che tenea sempre viva l' irritabilità egli seguiti a pulsare tuttavia, e a moverli gagliardamente, questo è quello, che intendere noi non sappiamo, come neppure arriviamo a comprendere, per qual maniera riprenda egli il suo moto dopo di averlo per alcun poco arrestato, come vedemmo nella Sperienza I., e lo vide pure il Sig. Zimmermann (c). Nè finiscono quindi le ricerche, che su ciò si fanno: si va più in là, e vuolsi sapere, perchè mai abbia il cuore maggiore irritabilità, che l' altre parti non hanno. Questa ricerca, ci ri-

Z 2

duce

(a) De Corde cap. 89.

(b) Part. 50, 51, 52, 53.

(c) Part. 46. Esper. IV.

duce alla mente la falsità d' una proposizione, che fa il Sig. Zimmermann (a), cioè, che l' irritabilità è proporzionata alla quantità de' nervi. Si fa che i nervi, che vanno al cuore sono assai pochi relativamente alla sua mole medesima; e però se l' irritabilità corrispondesse proporzionatamente al numero de' nervi; altre parti della stessa mole del cuore dovrebbero essere più irritabili d' esso, perchè più feraci di nervi; non lo sono; dunque deesi riputare anche per falsa l' avanzata proposizione di questo Autore, il quale in altro luogo (b) c' insegna, che *presiedono i nervi al sentimento*; quando se ne trovano pochi in una parte grande; e al moto, quando ve ne sono molti in una parte piccola. Imperocchè il Sig. Haller ci ha dimostrato, che vi sono più nervi in un pollice del dito, che in tutto il polmone; dimostrazione, la quale se vera fosse, il cuore sarebbe sensibilissimo e poco irritabile, ed il polmone dovrebbe acutamente sentire, e poco il dito. Ora, e chi non sa, che tutto il contrario addiuviene? Il Sig. Whytt congettura che la grande irritabilità del cuore provenga dall' aver egli i suoi nervi più sensibili. Il Sig. Haller domanda di dove lor venga questa eccedente sensibilità, e dice: (c) forse dall' essere più scoperti nel cuore, e perciò più esposti alla forza dello stimolo? indi soggiunge: *quello che m' indurrebbe ad ammettere questa spiegazione è la grande irritabilità, che si osserva negli intestini, benché abbiano pochi nervi, ma molto scoperti*. Noi non ci persuadiamo che il Sig. Haller convenga, che dalla maggior sensibilità de' nervi nasca la maggior irritabilità delle parti. Non ha quella da fare con questa; poichè per sua confessione (1) le più irritabili parti sono insensibili, e le più sensibili non sono irritabili. Pare dunque ch' egli ci voglia dire, che siccome i nervi, che sono irritati producono il tremore, e l' oscillazione (2) delle parti alle quali appartengono, così i nervi del cuore più scoperti e tocchi dal sangue, che loro serve di stimolo producono e risvegliano con maggior facilità, più vivamente l' irritabilità ed il moto del cuore. Abbiamo già detto al §. XIV. che l' irritabilità consiste nelle mobilissime particelle da cui vien formato in gran parte ogni corpo sì vegetabile quanto è l' animale, e che dalla varia combinazione ed accozzamento di dette parti, e da altre annoverate lor circostanze ne risulta il maggiore o minore grado d' irritabilità, che si vede nelle differenti parti degli animali. E questo è quello, che pensiamo ancor di presente.

§. XVIII.

(a) Part. I. 49. (b) Part. 38. (c) Dissert. cant. 124.

(1) Dunque le fibre muscolari, che sono irritabili, saranno insensibili.

(2) Per osservazione del Sig. Haller il nervo irritato non concepisce niun tremore; e perciò incapace esser deono di produr moto.

§. XVIII.

Venghiamo ora ad esaminare altre parti quasi egualmente considerabili che quelle, delle quali abbiamo parlato; vogliam dire l' esofago, gl' intestini, e 'l ventricolo. Dell' esofago basterà dire, che noi lo trovammo sempre dotato della sola forza di contrazione, senza notarvi il moto peristaltico, il quale per avventura gli farebbe soverchio, od anche dannevole, sendo che il cibo, che v' entra, dee sempre andare allo ingiù, e non mai tornartene addietro. Quanto al ventricolo noteremo, che quantunque, per ciò che riguarda la fabbrica, differisca ben poco da quella degli intestini, e sia qualche cosa più sensitivo di questa, non ostante è meno irritabile. E siccome le sperienze che ne tentammo lo mostrarono quasi della stessa natura; così avendo fatto le nostre sperienze su gl' intestini per vedere il loro peristaltico moto, e per provarne la loro irritabilità, riporteremo qui fedelmente quanto abbiamo osservato.

Esperienza I.

Preso un cane, e tagliatolo nell' addomine gli cavammo tutti affatto gl' intestini, i quali posti sur una tavola apparvero del tutto immobili per qualche tempo. Cominciarono poi a muoversi da se medesimi, e continuarono lungo tempo questo lor movimento senza che vi fosse d' uopo d' irritarli, e d' obbligarli per là a riprenderlo, e a mantenerlo.

Esperienza II.

A un' altro cane aprimmo tutto interamente il basso ventre, scoprimmo gl' intestini senza cavarneli, e lasciammo vivere l' animale. Noi notammo evidentissimamente il moto vermicolare, ond' erano le materie, che dentro si contenevano, spinte all' ingiù, e vicendevolmente all' insù; osservando però, che 'l moto diretto al basso era maggiore dell' altro, che facevasi inverso all' alto. In questo cane o fosse mala disposizione degli intestini, o fosse pure, che 'l dolore cagionasse degli spasmi, e delle irritazioni, notammo, che con frequenza gli gorgogliavano le budella, e le vedemmo più volte stringersi oltre 'l dovere in un luogo, e rilassarsi 'n un' altro a vicenda, e scorrere mormorando un gran nodo per buon tratto di quel canale; il qual nodo altro non era, che parte dell' intestino dall' intern' aria soverchiamente allargato.

Esperienza III.

Si cavarono gl' intestini ad una rana, e si videro mantenere il loro

loro moto per lungo spazio di tempo. Le materie verdastre ch' eran di dentro, scendevano lentamente allo 'ngiù, ed ascendevano con incredibile prestezza.

Esperienza IV.

Negl' intestini d' una rana notammo il moto peristaltico molto più vegeato, ed attivo, e gli elecrementi scendevano vicendevolmente, e salivano. Formavano essi de' grossi bernoccoli, i quali erano fatti dallo strozzamento, che pativano gl' intestini ad ambo i lati delle materie. Questo stringimento delle pareti del tubo intestinale andavasi successivamente allentando, e que' bernoccoluti tumori, moveansi pel verso, pel quale rilasciavasi l' intestino, spinti, come vedeasi, dalla contrazione, che andavasi avanzando, ed occupando quel luogo, in cui 'l rilasciamento nasceva. Con gran facilità risuscitavasi il loro moto, quando già illanguidiva, e stuzzicando il ventricolo passava gradatamente negl' intestini. Si vid' egli sì vegeato tosto che si cavarono, che sollevarono un de' suoi lati dalla tavola, su cui giacevano, e seguitarono l' ondeggiamento nell' aria. Tutti gl' intestini, che vedemmo, rimasero in contrazione dacchè finiron di muoversi, e in un cane erano raggrinzati talmente, che sembravan de' nodi con ordinata successione collocati.

Esperienza V.

Cavati gl' intestini ad un cane e ad una rana, dopo d' averli per lungo tempo osservati a muoversi vermicolarmente, noi ne tagliammo de' varj pezzi, e li lavammo esattamente nell' acqua tepida. Li raschiugammo, e li ponemmo sur una tavola. Continuarono essi a muoversi per alcuni minuti, mantenendo sempre con ordine la lor naturale oscillazione. Per queste sperienze noi non sappiam figurarsi qual cosa abbia indotto il Signor Haller (a) a dire, ch' egli è difficile il poter osservare il peristaltico lor movimento.

§. XIX.

Da questo così utile, anzi sì necessario vermicolar moto, noi ne dobbiam la cagione alla irritabilità. Ella è sempre presente agli intestini, ed agisce continuamente; ed i cibi che vanno ogni giorno ne' medesimi sono di stimolo ben sufficiente ad alzarre per così dire questa facoltà, e a farle crescere la sua vivezza. Fatta indi più vegeata, e più briosa l' azione degli intestini, richiamasi ne' luoghi irritati maggior copia d' umori, la quale serve di nuovo stimolo, onde

(a) Diff. cart. 117.

onde accrescere il moto, per cui si fanno negli alimenti le mutazioni; che sono lor necessarie per assomigliarli a' nostri umori, e passare a nutrirci. Non è da dubitare, che l'azione de' vasi chiliferi, che suggono l'umor-latteo, e la espulsion delle fecce che vengono determinate a poco a poco fuori del corpo non dipendano dalla irritabilità; siccome non è da porre in dubbio, che dalla maggiore o minor forza della medesima, di cui son dotati gli intestini di cadauno di noi, non dipenda esattamente il tempo, che a sì fatta escrezion si ricerca; quantunque Boberavve, Haller, Zimmermann sieno di avviso, che bastino solo 24. ore; e Cheyne all' incontro dica, che vi vogliano tre giorni; e questa irritabilità è varia, siccome è vario il temperamento di ciascheduno, e varj i cibi i quali differentemente irritando gl' intestini, più o meno fanno agir questa forza. Uno stimolo mite e blando eccita in essi un' uguale e placido moto; un più acre vi risveglia una contrazion passeggera; un' altro che sia oltremodo attivo, fa corrugare l' intestino e lo strozza in maniera, che nega il passaggio ad ogni corpo che il tenti. Ci sono però altri corpi mordaci, i quali non eccitano gagliardi moti negli intestini. Da ciò si vede, che negli intestini la forza di contrazione formonta bene spesso l' irritabilità, e l' arresta, quand' ella agisce. Si tocchino gl' intestini con qualche rodente forte, e si vedrà. Wepfero negli uomini morti di colica violenta, e negli animali, a' quali avea fatto prendere corrosivi, o purganti forti, vide gl' intestini stretti a tale segno, che quasi del tutto chiudevano il passaggio alle contenute materie, non che all' aria medesima. Questa è quella forza che il Sig. Zimmerman chiama *forza di stringimento*, il quale nella speriienza V. part. 41. mostra di distinguere dalla irritabilità. Del meccanismo della intossificazione, che viene dalla poca anzi accennata forza di stringimento, già n' abbiamo una chiara idea nel Sig. Haller, e Zimmerman. Peiero la vide chiarissimamente negli intestini di una rana; e i due mentovati scrittori l' osservarono negli intestini d' animali ancor vivi. Noi non la potemmo per qualunque fatto tentativo mai osservare. Ruischio (a) la dimostrò due volte pubblicamente; e Willisio la vide in un cadavere di una fanciulla (b). Le osservazioni fatte su' corpi morti c' ingannan sovente quando vogliamo intendere la cagione (1) de' mali, e però non deesi aggiustar loro gran fede da chi non vuole vergognosamente ingannarsi.

§. X X.

Dell' irritabilità de' muscoli, non v' ha ragione alcuna di dubitare. Gli autori ce la insegnano, e noi la notammo.

Espe-

(a) Off. anat. chir. c. 85.

(b) Patbol. cereb. cap. 8. c. 607.

(1) Ogni qual volta fossero fatte da nostri Autori.

Esperienza I.

Tagliammo tutto intero il muscolo masseterè ad un cane, e postolo sur una tavola ne osservammo con diligenza i movimenti. Era un piacere il vederlo leggermente incresparsi, e oscillare a guisa d'onda, cui placido e molle zeffiro soavemente combatte. Durò per poco in questa sorta di moto, e postosi del tutto in quiete fù da noi colla lancetta irritato, e fatto entrare per là nelle oscillazioni sue naturali.

Esperienza II.

In una rana noi vedemmo apertamente l'irritabilità delle fibre muscolari. Tremavano i muscoli d' amendue le coscie, e si tremavano, che eccedeva di gran lunga ogni credenza la celerità di quel tremolio. Il medesimo notammo ne' muscoli del ventre della stessa rana, e ne' psoi d' un cane.

Esperienza III.

Scoperti i muscoli del basso ventre ad un cane li vedemmo rigidi tutti, e somamente contratti per l'azione, in cui erano, a cagione del lamentarsi del cane. Ma si tosto, ch' egli cessava, riprendevan essi la loro irritabilità, ed oscillavano velocemente. Noi gl' irritammo con un' ago, ed essi si posero in un molto più celere tremolio. Toccati coll' olio di vitriuolo si contrassero fortemente per qualche spazio, sopra del quale, e sotto seguivan essi a ondeggiar come prima. I muscoli dunque sono irritabili; ma questa loro irritabilità non è in tutti uguale. Avvi ancor di que' muscoli, che per l'ordinario agiscono senza il consenso della volontà dell' animale; può non di meno questa loro azione essere ad arbitrio di quello, quando accresciuta, quando minorata, ed anche abolita, ogni qual volta ei lo voglia. In questi muscoli a cagione della loro vivace irritabilità ben di rado la contrazione v' ha luogo. E da notarsi ancora, che la facoltà irritabile in detti organi, s' accresce sensibilmente, e fa, che le loro fibre si contraggano o distraggano velocemente, quando s' irriti il nervo, il quale niente importa s' abbia col cervello commercio, o no.

S. X X I.

Discendiamo ora a' nervi, la dottrina de' quali è sì involupata, che per tutto vi si trovan de' dubbj. Prima però di dirne parola, e di ravolgerci co' nostri ragionamenti fra le difficili intricate questioni, che sur essi si fanno, noi vogliamo rapportare le nostre sperien-

sperienze, sulle quali noi verremo cautamente appoggiando ciò, che faremo per dirne.

Esperienza I.

Tagliammo a due Rane la testa pel lungo, esse morirono tostante convulse. Una di queste restò in una quasi natural positura, e per lungo tempo tremò; si contrasse l'altra validamente, s'appallottolò, e si restrinse in un gruppo. Ad altre la tagliammo tutta attraverso, e ne vedemmo alcune palpitare, altre contrarsi, ma morir tutte sul fatto. Alcune si rimasero colle zampe di dietro distese, ed allungate quanto il poteano, ma sempre con quelle davanti rattappate, e incrociate di tanto insieme, che si durava fatica a slungarle.

Esperienza II.

A una Rana decapitata afferrammo più volte i nervi colle mollette, e notammo sempre de' tremori considerabili in quelle parti, nelle quali essi si diffondevano. Pareva, che i muscoli aggomitolati a foggia di tanti piccoli bernoccoli andassero sù, e giù.

Esperienza III.

Molte di quelle Rane, alle quali decapitate ficcavasi un' ago nella spinale midolla si convellavano fortemente rannicchiandosi tutte a segno di saltellar per la tavola: tremavan altre di continuo rimanendo nella loro situazione di prima. Quando si tagliava ad alcune tutta attraverso la spina, perdevan esse ben tosto l'uso delle parti di dietro, che più non si movevano, salvo l'ondeggiamento, che n'esse si suscitava collo stuzzicare de' nervi.

Esperienza IV.

Il nervo frenico tagliato del tutto, e poi pizzicato, punto, ed irritato in un cane indusse de' velocissimi movimenti in tutto il diaframma. A questo medesimo, anzi la morte, si punse il cervello, e appena morto la spinal midolla, e lo vedemmo irrigidirsi tutto, ed allungarsi per ogni parte del corpo, come se stato fosse validamente stirato da una violentissima esterna forza.

Si può vedere per queste nostre esperienze, che i nervi hanno gran parte nel movimento de' muscoli; ma i fenomeni, che dalla irritazione ne nascono ci fan dubitare qual sia la forza, che ad essi debba assegnarsi. Il Sig. Haller pretende assolutamente, (a) ch'

Suppl. Part. I.

A a

essi

(a) Diff. c. 89.

essi non sieno punto irritabili, ma il Signor Zimmerman (a) ne assicura all' incontro, che sono irritabilissimi. Del medesimo parere si è ancora il Signor Castelli (b), il quale ne dice di più, che 'l Signor Giorgio Remo ha ingegnolamente proposto come una delle primarie cagioni dell' infiammazione l' indole irritabile de' nervi. Noi non sappiamo per certo se ammetter si debba questa irritabilità, mentre per quanto gli abbiamo punti, tagliati, o in qualunque maniera stimolati, non potemmo notar mai 'n essi quel moto d' ondeggiamento, che solo è il segno caratteristico della irritabilità (1). Noi ne tagliamo interamente attraverso, e ne vedemmo alcuni (2) contrarsi alcun poco, degli altri poi ne osservammo restarsi del tutto immobili, e ciondolare languidamente senza punto abbreviare l' estremità già recise.

§. XXXI.

Il muscolo ondeggia maggiormente, ed oscilla ad ogni irritazione del nervo; il nervo dunque accresce l' irritabilità del muscolo. Ma perchè egli non può ciò fare, che per la via del moto, bisogna necessariamente supporre, che anche il nervo si muova. Nel moto d' esso non si ravvisa nè ondeggiamento, nè contrazione, nè vibrazione; s' induce dunque il moto nelle invisibili sue particelle, il quale si diffonde per tutto il nervo dallo stimolo in giù, e il quale si comunica al muscolo.

All' irritarsi la midolla del cerebro, e quella della spinale, noi vedemmo ne' nostri sperimenti gran varietà di fenomeni. Alcune volte s' aggomitolavan le rane, su cui facevasi le osservazioni, si contraevan con violenza, e divenivano più corte; alcun' altra si distendevano, e s' allungavano; tremavano qualche volta, ed aveano ne' loro muscoli un considerabilissimo ondeggiamento; ma più frequentemente osservavasi, che si distendevano, ed allungavano le gambe; si rattrapavan le braccia, e si faceano più brevi. Noi vegliamo però, che per quanto sien varj questi fenomeni, da non altro son cagionati, che, o dall' accresciuta irritabilità, o dalla forza di contrazione fatta maggiore. Non altro dunque può il nervo nel muscolo, che con una forza, ed un moto a noi incognito destare, od accrescere le due menzionate facoltà.

Potrà forse essere con ragione persuaso, che i nervi sien tanti tubi, pe' quali scorre un fluido spiritoso, sottile, chi avrà letto con qualche attenzione le istituzioni del rinomato Boerhave, e i commenti

(a) par. XXIV.

(b) par. XIV.

(1) Il segno proprio della irritabilità Halleriana è la contrazione della parte quando venga toccata da qualunque corpo straniero.

(2) E questo basterebbe per dimostrare l' irritabilità de' nervi se l' esperienza fosse esatta.

menti del celebre Sig. Haller su tale proposito; e forse sareffi recato a credere, che allo accennato fluido debbasi totalmente l'azione di essi. I suoi argomenti sono speziiosi, e molto probabili quelle ragioni, che per conferma del suo parere ne adduce; ma non già tali, che ne mostrino ad evidenza l'affare. I forti e vegeti movimenti, che vediamo accadere ne' corpi morti allorchè si stuzzica la midolla del cervello, o quella della spina ne smentiscono gli argomenti, i quali son pur contrarij in parte anche al sistema di quelli, che ammetton gli spiriti, e ci fanno a ragion sospettar del contrario. La forza che ha il nervo, siccome non gli è data dalla tonaca cellulare, a cui ogni facoltà vien negata: nè tampoco dalla corteccia che si ferisce impunemente; così resta, ch' ella sia tutta propria della midolla, e che questa sia l'organo immediato del movimento. Noi non li mettiamo, che cosa siasi questa facoltà, che nel nervo risiede, nè in qual maniera egli operi: Non per tanto farebb' ella la forza di vibrazione? o farebb' ella peravventura l'irritabilità? Noi non sappiamo determinarlo. Crediamo bensì fermamente, che alla tenera polpa midollare debbanfi ascrivere, e non già agli spiriti i movimenti di qualunque sorta si sieno. Nè ci dee recare maraviglia, che una sostanza così floscia, e sì molle abbiassi da noi per cagione di que' violenti moti, e di quelle gagliarde forze da cui vengono superate tante valide resistenze, che vediamo superarsi ogni giorno. Nè nuoce punto al nostro parere, il non intendere, come da un moto non osservabil de' nervi nasca una forza sì sorprendente nel muscolo. Forse la convenienza che ha il moto de' nervi con quello de' muscoli fa sì, che quello per piccolo e leggero che siasi, ecciti ed accresca questo fuor di misura. Sembra dunque ragionevol di molto il credere, che non vi sia d' uopo di spiriti alla formazione del moto; e noi pensiamo di più, che non sien essi neppure la cagione del senso (1).

§. XXIII.

Noi siamo resi abbastanza sicuri per l'esperienze fatte dall'immortale Malpighi, (a) che nella formazione del pollo scopresi manifestamente il cervello, e la spinal midolla, anzi che v' apparisca vestigio alcuno di vasi. E' dunque ragionevole il dire, che le carotidi, e le vertebrali non son esse le parti, che ne lo formano; ma ch' egli è composto di parti organiche primitive riconoscanti un' indole propria, e una propria natura, e indipendenti da ogn'

A a 2

altra

(1) Il Willis, il Boerave, l'Hambergero, e M. Senac provano esser gli spiriti animali, ed altri li negano, come il Lister in *diff. de humoribus*. Il Bidloo in *diff. anat.* il Baglivi, ed il Glissonio in *tract. de hepate*.

(a) *Epist. I. de ovo incub.*

altra parte del corpo. E non concorrono a farlo credere tale le sue qualità a uiun' altra parte comuni? e la troppa picciolezza di quelle arterie, da cui si deriva? e quella tanto sproporzionata grandezza, che ha il cervello nel feto in paragone dell' altre parti? Non rendesi per tutto questo quasi evidente, che l' arterie vanno a nutrirlo, e non già a separarvi gli spiriti che debbon correr pe' nervi? Quando apparisce il cervello non v' han sicuramente gli spiriti, mentre non v' han l' arterie, che vi portino il sangue ond' essi son separati; ma non vi dee essere neppure un progressivo regolato moto d' umori, poichè tal movimento vien a questi dal cuore, il quale non ha allora veruna comunione col cervello. Essendo dunque il cervello fabbricato d' una sua propria particolare sostanza; non auend' egli arterie che vi portino il sangue, e per conseguenza materia atta a produrre gl' spiriti, e non essendovi in esso il regular moto d' umori, a noi poi non sembra fuor di ragione il credere, che sieno i nervi non già de' vuoti cannelli, ma de' cilindri perfettamente ripieni (1). Si dovrà dunque pensare, che la midolla

re

(1) Cotesi Signori credono di essere in un secolo, che si stimino le Ipotesi fantastiche, e poetiche senza essere appoggiate alle sperienze. Eh! non è più il tempo. Leggano un poco sopra la struttura de' nervi nel terzo Tomo dei Comentarj dell' Accademia di Bologna pag. 281. quello, che il Dottissimo e Cel. Sig. Mollinelli osservò dopo la legatura del nervo dell' ottavo pajo in un cane. dice. *Detractis nervi involucribus, structura apparuit pulchra, & mirabilis. Videbatur ibi ergo nervus cellulis constare quamplurimis, quæ substantia inter se discriminabantur nitida, consistente, subflava. Cellulæ ipsæ quasi in rectos ordines distributæ erant, figurâ ad rectangularem accedente, latiores secundum nervi latitudinem, quam secundum longitudinem. Tenuissimum quodam liquore, eoque nonnihil albicante replebantur, secto transversim nervo liquoris guttulæ erumpebant citissime evanescentes. Il Covvpero già col microscopio vide queste cellule del nervo; ed il Boerave, come riferisce il Sig. Hallero, osservò questo liquore de' nervi; dice così il suddetto Sig. Hallero: Sæpe expertus est Boerhavius si medulla oblongata recentissima discindatur per acuta novacula, & statim inspicitur armato oculo, apparere undique exsurgentem rorem, qui protinus exhalando dissipatur. Dalle quali osservazioni, Ipotesi più probabile si può ricavare, ed è la seguente.*

Essendo il nervo tutto composto d' innumerabili cellule, le quali un' umore spiritoso, e quasi una rugiada contengono separata dalla sostanza corticale del cervello, cerebello, e da quella della spinale midolla, si può congetturare, che questo liquore o rugiada sia quella che fa il senso; imperciocchè essendo tutte queste cellule ripiene di tal' umore, e tra loro unite in una maniera, che un continuo formano, ad ogni minima irritazione, o pressione fatta sul nervo si comunicherà questa pressione, o moto

re sostanza del cerebro, che tutta perfettamente apparisce la stessa agli occhi di chi l' esamina attentamente, non sia già da per tutto l' istessa, ma ch' ella sia d' indole differente siccome son differenti i fenomeni, che vengon prodotti dall' una, e non mai possono generarsi (1) dall' altra. Due sono gli effetti, che riconoscono per loro origine la midolla del cerebro; l' uno si è il movimento, di cui pur ora abbiamo detto, l' altro si è il senso, di cui dobbiam ragionar di presente. E questo, secondo noi, solamente prodotto da una parte della midollare sostanza diversa totalmente da quella, che genera il movimento (2) de' muscoli. E' non v' ha alcuno, che neghi, che alla formazione del senso necessario non siasi un cotal cambiamento della midolla, il quale vi vien indotto dal nervo in grazia degli oggetti esteriori, che mutandone l' estremità, vi fanno nascere un certo moto, che propagasi successivamente sino al cervello. Noi sappiamo per prova, che questo tremore, o movimento qualunque siasi s' imprime nel nervo da' soli oggetti esteriori, e 'n vano si studia l' anima, e s' argomenta d' indurvelo, siccome in van cercherebbe d' accrescere, o di minorare quel movimento, che involontario si chiama. Queste due differenti sostanze ora si veggon solitarie, ed ora accoppiate del pari. Nell' occhio, per modo di esempio, e nell' orecchio questa sostanza da cui si forma la sensazione, si fa veder sola; ne' nervi all' incontro del cuore, si scopre sol tanto quella, che genera il movimento: poichè non v' ha in essi alcun senso; o se pur ve n' ha alcuno, deesi riputare accoppiata con una ben piccola porzione dell' altra. Ma v' hanno parti, a cui in guisa di sottilissime si fa sen van del pari le due già dette sostanze chiuse ed incolte in una stessa vag'na; e queste sono quelle, in cui v' ha senso ugualmente e v' ha moto; con ciò sia che dall' azione dell' una vien questo, e nasce quello dall' azione dell' altra. Noi comprendiam ben chiaramente, che questi due moti si opposti fra loro posson trovarsi ad un tratto nel medesimo nervo, perchè diverse

o moto di cellula in cellula per mezzo dell' umore contenuto perfino al cervello sede dell' anima; ed in questa maniera si formeranno le sensazioni tutte tra loro diverse per altre circostanze, che qui non è uopo annoverare. Il moto poi de' muscoli si fa per mezzo dell' Etere elasticissimo (come pensa il Sig. Dottore B. Robinson di Dublino nel suo trattato inglese dell' economia animale) collocato fra i nervi, e nelle membrane, che involgono le più minute fibre dei muscoli, le quali vibrazioni vengono esercitate dalla potenza dell' anima, dal calore, dalle ferite, dalle parti attive e sottili de' corpi, e da altre cagioni: Il quale Etere, alcuni credono, essere la materia elettrica, ed altri la materia sottile di Cartesio. Con queste due Ipotesi si può spiegare come in una paralisi rimanga il senso, e non il moto, o solamente il moto e non il senso.

(1) Lo penseranno solamente i nostri Autori.

(2) Che bella Ipotesi da sperienze corredata!

se son le sostanze, che si movono nel tempo stesso. Per la troppa lor vicinanza, noi non possiamo dar moto ad una parte senza che la forza motrice passi più o meno ad eccitar quella, per cui si sente, o si risvegli un senso al movimento proporzionato. Che se il movimento della sostanza onde si sente non porta moto alle parti quando si fanno regolarmente le sensazioni, ciò viene, perchè non v' ha proporzione veruna tra il moto di questa, e la disposizione della parte in cui deve passare, come negli esempi riferiti di sopra può chiaramente vederli. Noi non diciamo però, che non vi sieno de' casi, ne' quali il moto della sostanza sensitiva di lunga mano accresciuto non possa indurre nel cervello un qualche notabile cangiamento, e un cotale sconcerto nella sostanza che genera il moto onde venga destata l' azion de' muscoli. Le valide convulsioni che vengono cagionate da una luce troppo vivida, da un odor troppo acuto ec. si imentirebbon del tutto. Gli è vero però, che se distruggesi, o legasi il nervo perisce del tutto il senso nella parte soggetta alla legatura, mantenendosi del tutto in quella, che sta al di sopra; lo che potrebbe far dubitare, che il senso almeno dee riconoscersi dalla presenza del fluido nerveo. Ma potrebbe anche rispondere, che la parte di sotto alla legatura per ciò resta priva di senso, perchè si guasta l' organo, la cui integrità si ricerca alla produzione di questo.

Da quanto abbiam sopra detto, e riferito ne' nostri sperimenti, crediamo potersi asserire con quella certezza, che trovasi in cose sì difficili e involte fra tante tenebre, che non v' ha duopo di spiriti animali per fare il moto ne' muscoli; ma che la facoltà che hanno questi di muoversi, ed hanno i nervi di accrescerla, bastano per farci nettamente intendere la cagione del moto. Quindi si facciam passo passo ad agevolmente capire donde mai venga, che in alcune paralisi resti intero il moto, perduto ch' è il senso, e viceversa quello abolito, rimangavi questo. Imperocchè se intatta si mantenga nel nervo la facoltà del sentire, e distruggasi quella del moto, e con seco l' irritabilità de' muscoli, od aboliscasi l' una, e l' altra, noi riteremo il senso perfettamente, ma non potremo mai mover la parte. Che se mantengasi intera la forza de' nervi e l' irritabilità, e resti annichilata la sostanza del senso, la parte paralitica mantenendo il suo moto, farà priva di senso.

Su questa verisimil teoria potremo spiegare ancora quella paralisi, in cui una parte del corpo rimane senza moto, e ritiene il senso, l' altra perde il sentimento, e ritenesi il moto. Noi la potremo considerare come due differenti paralisi esistenti nel tempo medesimo in un sol corpo. Una fu osservata dal celebre Sig. Senac, (a) e fu da me (Pagani) veduta in un Soldato nel famoso Hotel Dieu di Parigi, nel qual Soldato osservai con stupore, che il senso, che rimaneva nella parte, in cui il moto mancava, erasi reso molto più acuto, che per lo innanzi non era.

§. XXIV.

§. X X I V.

L' arterie non son sensibili se non dove han de' nervi, e non son punto irritabili. Son esse semplicemente contrattili; per ciò ecco le osservazioni fatte sovr' esse.

Esperienza I.

Pungemmo in un Can vivo l' aorta nella sua curvatura, e questa si contrasse fortemente (1). Facemmo indi il medesimo nella Iliaca destra, e la vedemmo manifestamente contrarsi, ma non già sì, che uguagliasse la contrazion dell' aorta. Stillammo nelle ferite dell' olio di vitriuolo, e l' arteria si contrasse sì fortemente, che minorò notabilmente la cavità, per la quale non potendo scorrere il sangue colla dovuta celerità, gonfiossi ella al di sopra, e pulsò validamente.

Esperienza II.

Introducemmo nell' aorta d' un castrone ammazato di fresco un dito, il quale sentimmo stringerci costantemente, e con forza; toccammo poi collo spirito di nitro fumante l' arterie pareti d' essa, e allora ne lo sentimmo stringere maggiormente, e la vedemmo corrugarfi, e farsi più piccola. Lo stesso effetto notammo ancora nell' aorta d' un vitello, su cui facemmo l' esperimento medesimo.

Esperienza III.

Tagliammo interamente ad un cane un pezzo d' aorta della lunghezza di quattro dita trasverse, e lo lasciammo sur una tavola, attentamente guardandolo. Noi non lo toccammo cogl' irritanti per vederne gli effetti i più semplici, e i più naturali. Noi lo vedemmo stringersi, e minorare notabilmente il suo diametro, e farsi più corto. Ne tagliammo un' altro pezzo, ed apertolo pel lungo lo spiegammo accanto dell' altro su la medesima tavola, e toccatolo con dell' olio di vitriuolo, lo facemmo contrarre mirabilmente, acciociocciarsi, ed unire interamente l' estremità.

§. X X V.

Le vene hanno una particolar forza di contrazione impercettibile ne' lor principj, ed acquistanla maggiormente a misura, che s' avvicinano al cuore, ed ingrossan le sue pareti, attalchè apparisce a' sen-

(1) E secondo la definizione del Sig. Hallero, questo è il segno proprio dell' irritabilità.

a' sensi, e può farsi nella vena cava notabilmente vedere; il medesimo succede nelle vene meseraiche, quando sono vicine ad entrare nella vena porta.

Esperienza I.

Tagliammo la vena cava ad un cane, e la ponemmo sur una tavola, e v' osservammo una debolissima contrazione. La toccammo indi coll' olio di vitriuolo, e la vedemmo restringersi sensibilmente.

Esperienza II.

Maggior contrazione naturale vedemmo nascere nella medesima vena d' un cane ancor vivo, e molto maggior di quella si fece in essa vedere dacchè la toccammo collo spirito di nitro fumante. Alcuni' altra vena delle grandette, su cui facemmo le nostre osservazioni, ci mostrò qualche contrazione, ma sempre proporzionata alla sua grandezza.

S. X X V I.

I vasi lattei, la cisterna del chilo, e 'l condotto toracico, sono contrattili, e ben vi notammo visibilmente la forza di contrazione.

Esperienza I.

Uccidemmo un cane alcun tempo dopo di averlo copiosamente pasciuto, ed osservammo i vasi lattei, e 'l condotto toracico pieni zeppi di chilo, e separata con diligenza la vena succlaveale, lo vedemmo scaricarvisi dentro, e lasciar vuoti i suoi vasi, i quali s' erano ristretti in guisa, che appena appena vi si conosceva vestigio alcuno di cavità. Il condotto toracico erasi rannicchiato di tanto, che veniva ricoperto quasi del tutto dalla cellulare.

Esperienza II.

Scoperta ad un cane, ed irritata col butirro d' antimonio la cisterna Pecqueziana, incominciò ella a contrarsi ben tosto, a corrugarsi, ad indurirsi, nè mai ci fece vedere ondeggiamento veruno, quantunque posta v' abbiamo la diligenza più esatta nell' osservarla.

I condotti escretorj hanno pure la loro forza di contrazione, benchè minore di quella de' vasi chiliferi. Le varie pruove, che sopra noi vi facemmo, ci hanno fatto vedere, che questa forza non è in tutti la medesima, ma che in altri è maggiore, ed in altri minore, a proporzione della maggiore, o minor densità, che riscon-

trasi

trasi nelle loro pareti. Anzi ve n' ha di quelli, ne' quali è sì piccola questa forza, che a mala pena si scopre.

Si dee riconoscere una valida forza di contrazione negli ureteri; poichè noi l' osservammo tale in quelli di un cane, ma particolarmente in quelli di un toppo poco fa morto, al quale pigliammo l' uretere destro, e ne lo separammo dalla cellulare, e lo stirammo fortemente, e lasciandolo indi cadere su' lombi, lo vedemmo contrarsi violentemente, ed abbreviarsi al naturale suo stato; sebbene l' avessimo allungato, e distratto notabilmente. Il medesimo, comechè ogni volta più leggiermente, avvenne per quattro fiate, che ne tentammo l' esperimento. Il sinistro, che abbiamo pure esaminato, appariva duro, ed increpato; e punto, ed irritato coll' olio di vitriuolo diede a vedere una fortissima contrazione.

La borsetta del fiele fu da noi ne' nostri esperimenti osservata sempre contrattile, e tali furono veduti essere i condotti cistico, epatico, e coledoco.

Esperienza III.

Pungemmo ad un cane vegeto, e forte morto d' un' ora il fondo di questa borsetta, e vi vedemmo dell' increpamento notabile, che diffondevasi per tutto il corpo di quella. Non si vide però sortirne la bile, com' ella fece, quando s' introdusse nella borsetta, contrazione maggiore dal butirro d' antimonio, che si lasciò cadere nelle punture. Tentammo lo stesso esperimento in un cane appena morto dopo avergli aperto il coledoco, e ne vedemmo per la forte contrazion della borsetta uscire la bile. Facemmo le nostre prove su gli escretorj bilarj, ed osservammo costantemente, che si contraevano con forza.

§. XXVII.

La Vescica urinaria è pur dotata della forza di contrazione, la quale è propria delle fibre muscolari, che le formano una tonaca particolare. Ecco intanto ciò, che noi osservammo intorno alla contrazione della medesima.

Esperienza I.

Pungemmo in varj luoghi la vescica di un cane vivo, la quale si contrasse ben tosto a segno d' espellere l' urina tutta, e si restringe perfettamente in un grumo. La corrugazione, che le si fece nel collo era sì forte, che appena cedeva a qualunque pressione le si facesse. Le parti divise dalla puntura si scostaron del pari, e lasciaron fra loro un' intervallo ben grande.

Esperienza II.

Tagliammo del tutto vicino al collo la vescica d' un cane ancor vivo, la quale posta sur una tavola, la vedemmo contrarsi tosto sì fortemente, che si potea conoscere appena l' orificio del taglio. La dividemmo indi a poco pel lungo, e fattene due metà, ciascheduna di questa tendeva a riunire i suoi orli, i quali s' accostarono maggiormente, dacchè li toccammo coll' olio di vitriuolo.

Eccoci un muscolo senza irritabilità; e qui il Signor Haller riprende il Signor Whyt d' avergli attribuita l' oscillazione; egli che dice chiaramente di non conoscere alcun muscolo, che dopo morte non palpiti.

Non può negarsi in niun modo la forza di contrazione nell' utero. Egli è superfluo l' addurre dell' esperienze per provare una cosa sì chiara, e che viene ad evidenza mostrata da ciò, che in esso accade dopo del parto, quando da un' eccedente dilatazione ritorna per una particolare sua forza nello stato di prima. Nell' assistenza, ch' io (Bonioli) dovetti prestare ad alcune donne di parto toccommi di fare una ben giusta idea della forza, per cui l' utero si contrae; imperocchè introducendovi la mano per estrarne o porzioni di placenta, o per nettarlo da qualche pregiudiziale sozzura, io me la sentii stringer sempre con del vigore, e con particolarità mi sentii stretto il carpo dall' orificio, che violentemente si contraeva. Si può facilmente vedere quanto questa sua forza gli sia necessaria, poichè per essa principalmente e' si libera dal parto, dalla placenta, da falsi germi, da grumi di sangue, che ben sovente vi si generano dentro, e da ogni altra cosa, che gli dia impaccio, e che lo stimoli all' espulsione. E' questa sua forza proveniente, per quanto noi pensiamo dalla mutua azione de' nervi, e delle fibre muscolari, che nel fondo d' esso si veggono collocate in forma di piccioli cerchi, e che si spandono verso gli orifizj delle tube.

§. XXVIII.

A noi parve ben fatto di distinguere in questo nostro discorso la forza di contrazione dalla irritabilità, non solo per supplire a quello, che non han fatto gli autori, nè perchè varj sien que' rimedj, che debbono usarsi per le parti irritabili, e per quelle che sono semplicemente contrattili; ma perchè stimiam cosa ben fatta lo esporre con esattezza la varietà de' fenomeni anche i meno importanti della natura. Consiste la sanità in un proporzionato equilibrio de' solidi, e de' fluidi, dalla cui scompostezza ed alterazione vengono prodotte le malattie. Può pervertirsi questo giusto equilibrio, qualora accada, che l' irritabilità, e la forza di contrazione s' indeboliscan di troppo, o di troppo s' invigoriscano. Il cuore come di-

cemmo è quella parte, nella quale più d'ogni altra risiede l'irritabilità, e alla quale è più necessaria. Merita dunque che noi passiamo ad indagare que' mali, che vengono dall'alterazione di questa forza prodotti, e cerchiamo que' mezzi, che possono, nati che sieno, porre ad essi riparo. E' il sangue un degli stimoli per cui agisce incessantemente il cuore. Se fosse sempre la medesima la quantità, e la qualità dello stimolo, sarebbono sempre le medesime e l'irritabilità del cuore, e la sua azione. Ma perchè avvien che il sangue può peccare tanto in quantità, quanto in qualità; quindi è, che la forza del cuore anch'essa può cambiarsi, e produrre perciò varj effetti nel corpo dell'animale. Il nuovo chilo, la qualità piccante degli umori, e le copiose bevande, ce ne fanno testimonianza. Si può dunque facilmente comprendere, che le diverse cause, che agiscono sul cuore, fanno nascere effetti ben differenti tra loro. Di fatti venendo da un qualunque stimolo irritato il cuore, ecco l'accresciuta sua irritabilità produrre gagliarda circolazione d'umori, diventar essi più densi, farsi i polsi più celeri, più grande il calore del corpo, e più colorita la faccia. All'opposito succederà, e diversi faranno gli effetti provegnenti dalla diminuita irritabilità. E quindi gli è, che si viene a comprendere, che s'abbia a fare ne' mali, ne' quali pecca l'irritabilità del cuore, ed in quelli in cui troppo debole essere si trova. Vuolsi però avvertito, che nel suddetto caso non tutti gli stimolanti aumentan del pari quest'irritabilità, ed alcuni non l'accrescan punto. E siccome dunque tutti indistintamente i rimedj non sono atti a risvegliare, o ad accrescere cotest'irritabilità; quindi è, che è necessaria prudenza nel medico per traseglier quelli, che più sembrano opportuni al bisogno. Notisi in oltre, che siccome le fibre de' vecchj sono meno irritabili di quelle de' giovani; così avranno mestieri di maggior stimolo per ricuperare l'irritabilità se trovansi in esse diminuita. Notisi di più, e lo notò pure il Zimmerman, che l'irritabilità è diversa in qualsivoglia parte dell'animale (a). Così ragionevolmente possiam credere, che que' stimoli, che servono ad eccitarla in un luogo, non la risvegliino, che poco o nulla nell'altro. Tale verità la conobbe pur egli il chiaro Andry, il quale s'ingegnò di render ragione, perchè alcuni rimedj faccian del bene a una parte più tosto, che all'altra. Tocca dunque al medico l'osservare da se medesimo, e leggere attentamente le osservazioni fatte da' valenti medici, per imparare a prò de' malati, quai rimedj giovino a risvegliare, o a moderare quest'irritabilità, e il sapere, se quegli stimoli, che l'eccitano nelle altre parti, sono capaci di risvegliarla nel cuore; oppure, se possano eccitarla in esso, quantunque non la risvegliino nell'altre parti.

B b 2

S. XXV.

(a) Dunque non la sola fibra muscolare, ma qualsivoglia altra parte dell'animale è irritabile.

§. XXIX.

Ancorchè noi non abbiamo potuto discoprir mai, come dicemmo alcuna sorte d'irritabilità nell'arterie, ed abbiamo loro attribuita la sola forza di contrazione, pure noi ne trattiam qui come se elle fossero dotate d'irritabilità (1) al par del cuore. Questa lor contrazione, che dal principio d'esse vassi successivamente con estrema velocità fino al fin propagando, fa il medesimo effetto rispetto al sangue, che il moto peristaltico degl'intestini riguardo alle materie, ch'essi contengono; e però possono considerarsi come irritabili, che si contraggono, e vicendevolmente si rilassano. Siccome l'irritabilità divien maggiore nelle parti irritabili per qualche stimolo, così cresce la forza di contrazion nelle arterie per la cagione medesima, e talvolta questa si fa in esse minore, come si fa quella nell'altre, di dove nascono in buona parte que' mali, che ci riescono di sovente sì tormentosi (2).

Dalla molto accresciuta lor forza ne vengono presso poco quegli sconcerti, che dalla accresciuta irritabilità del core dicemmo venire; imperocchè posta una maggiore contrazion nelle arterie, viene il lor diametro a minorarsi proporzionatamente alla corrugazione e a rendersi per conseguenza incapace di più ricevere la medesima quantità del fluido che riceveva prima. Ciò posto, è dunque bisogno, che la forza che le dilata nel naturale lor stato, s'aumentì per dilatarle quanto bisogna nello stato fuor di natura per poterle cacciar quell'umore, a cui ella dà impulso. Se poi sia ch'ella sia tale e tanta, che non possa venir superata dalla forza del cuore, il cuore sovrachiamamente irritato, non potendo superare la resistenza, che gli si para innanzi, in van si dibatte, viene dalla troppa piena oppresso, arrestasi interamente la circolazion degli umori, e quindi ne segue la morte. Posto questo intendesi, ragionando in contrario, in qual maniera nascan que' mali, che vengono cagionati dalla minore contrazione delle arterie, e che accennammo trattando della irritabilità del cuore. Fra tutti i segni, che concorrono a caratterizzare la troppa contrazion delle arterie, il primo si è certamente la durezza de' polsi provegnente da un qualche stimolo, che le fa raggrinzare, e non già come crede l'eruditissimo Freund dalla elasticità delle membrane, le quali sappiamo non averne veruna. Che gli stimoli più o meno gagliardi facciano incresparsi le arterie può essere chiaro abbastanza per gli esperimenti che sovr'esse si fanno, e perciò che ne asserisce il de Gorter, cui deve cotanto la medicina pratica. Essi le irritano secondo lui per sì fatta maniera quan-

(1) Confessano che le arterie non sono irritabili, e poi le suppongono irritabili, per crearè Ipotesi a loro capriccio.

(2) E qui senza avvedersene, provano che le arterie sono irritabili.

quanto basta, perchè s' induca la febbre (a). Dica pur tutto ciò che vuole il Signor Tissot chiaro autore del discorso preliminare alla memoria del Signor Haller, che quanto noi, le crederemo sempre capaci di contrazioni, ed atte ad indurre la febbre una volta che sieno irritate. Se il sangue divenuto più nero, e per ciò secondo il suo parere più irritante, è atto ad accrescere colla contratta sua acrimonia l' irritabilità del cuore, perchè non potrà suscitarla coll' indurre maggior contrazione nelle arterie, le quali si contraggono assai facilmente per l' azione dello stimolo? Ma non più delle arterie, imperocchè, que' fenomeni, che nascono dalla loro accresciuta, o minorata forza in qualunque parte d' esse, agevolmente s' intendono dopo le accennate cose, e noi fin da principio si siamo divisi di usare brevità.

§. XXX.

Nel trattare della irritabilità degli intestini, a che far si accingiamo, noi vogliamo escludere del tutto gli effetti, i quali si reputano provenire da ben altre cagioni, comeche riconoscan da questa il loro cominciamento. Noi prenderemo sol tanto a dir di quelli, che veggonsi in essi accadere, e che provengono dall' accresciuta di troppo, o minorata loro irritabilità, debbono chiamarsi suoi propri; poichè hanno in essi l' origin loro, e la loro terminazione.

Dall' accresciuta irritabilità dunque degli intestini, si fan per lo più le diarree, e le disenterie, nelle quali, il peristaltico lor movimento urta e caccia abbasso le materie con maggior prestezza di quello dovrebbe, e che all' uso naturale non si elige. Abbiam detto che si forman per lo più da questa causa le accennate indisposizioni; poichè sappiamo bene che provengono talvolta dall' ostruzione de' lattei, o dalla soverchia lor debolezza, per cui non traggono il chilo, il quale scappa per gl' intestini, che conservano intieramente il lor moto, e si ne forma i mentovati malori. Questa maggiore irritabilità viene in essi cagionata da un qualche stimolo, che li punge, e li morde, e il quale, tolto via o rintuzzato, diventa ella placida, e si calma, e poco a poco riducesi al suo stato di prima. Per questa ragione, inutili si rendono in tali casi i purganti, ed utili solo que' rimedj che vagliono a minorare la forza dello stimolo, a lubrificare, non che ad intonacare le pareti degli intestini. Arriviam quindi a intendere, perchè l' oppio sia un singolare rimedio contro l' uscite. Si sa quant' egli minori l' irritabilità degli intestini; il perchè dovrà il lor moto diminuirsi, e cessare la viziosa disposizion delle parti, da cui provengono direttamente tali mali. Ne son queste, che abbiam pur ora accennate le sole malattie, cui s' affoggettino gl' intestini. Ci sono i volvuli, genia di mali

(a) *Compend. Med. Tr.* §2. p. 9. pag. 141.

mali sì formidabili, che nulla più. Anche questi noi dobbiamo riconoscere dalla medesima irritabilità degl' intestini accresciuta; con questo però, che resta annullato, o grandemente affievolito il peristaltico moto, e agisce con forza molto maggiore del solito l' antiperistaltico; onde avviene, che le contenute materie mutano direzione ed escon per bocca; rinvocazione, che per lo passato non è stata da alcuni Uomini illustri creduta, attesoche non si potevano persuadere, come le materie contenute ne' grossi intestini potessero rincular ne' sottili, e che la materia de' clisteri superando la valvola del Bavino potessero salir tant' alto, ch' entrassero nello stomaco, e fossero cacciati per vomito. Oltre l' asserzione di tanti Uomini degni di fede, che ciò videro accadere, lo vedemmo pur noi allor che facemmo dare replicati lavativi ad un Cane, cui aperto l' addomine, osservammo passare agevolmente ne tenui intestini, e nello stomaco ancora. Negli intestini, facilmente più che altrove, l' irritabilità si accresce di tanto, che passa a contrazione pertinace, per cui in qualche luogo si abolisce talora il diametro loro perfettamente, o quasi del tutto. Quindi noi crediamo doversi dedurre le coliche statuenti, le infiammazioni intestinali, le soverchie stitichezze di corpo, i volvoli &c. In tali casi, come ogn' un vede, son da lodarsi que' rimedj, ne' quali è virtù di ammolliare e di rallentare. Ippocrate (a) in somiglievoli casi servivsi alcuna volta de' tolli, onde spignere a forza aria negl' intestini, affine di dilatare così, e di procacciare il passaggio a ciò che di dentro si conteneva. A noi però, che tal cosa provammo, non riuscì di vedere andar felicemente quanto ei dice. Imperocchè bagnato coll' olio di vitriuolo l' intestin di una Rana, e provato di dilatare così a forza di fiato il suo diametro contratto, vedemmo l' aria, che spinta dentro vi s' era violentemente, non poter mai passare al di là del luogo, soverchiamente ristretto; ed anzi affievolire per tal maniera tutto il tratto del tubo intestinale, che stava innanzi d' essa, che rimase notabilmente allargato, senza più ritenere alcun vestigio d' irritabilità e di contrazione. Ed ecco esposto ciò, che intorno all' accresciuta irritabilità credemmo di dover dire. Resta che esaminiam brevemente quel tanto che segue, quallora siasi ella diminuita, e infiacchita. E' destinato il moto degli intestini a mescolare esattamente i cibi co' nostri umori, a sritolarli, a sminuzzarli, a ridurli in una molle poltiglia, onde sieno dalle boccucce de' vasi lattei imbevuti. Saranno dunque effetti sì necessarj alterati, qualora avvenga, che s' indebolisca la loro attività, e la lor forza, di modo che si depraverà la cozione degli alimenti, si minorerà la confezione del chilo &c. e tutti questi gravosi effetti faranno proporzionati alla causa, che produrrà. Nel quale caso sono indicati que' rimedj, che vagliono a riordinare questa minorata irritabilità.

De'

De' vomiti, delle colere, e delle lenterie nulla abbiain detto; perchè nel primo di questi mali resta in colpa il ventricolo, e ne' secondi, questo ugualmente che gl' intestini. Per ben intender li quali, dovrassi trasferire allo stomaco ciò, che s' è detto intorno all' accresciuta, o diminuita irritabilità di questi, e intorno a' mezzi che debbonfi nell' uno e nell' altro caso adoperare.

§. XXXI.

I piccoli faggi, che abbiamo dati intorno alla irritabilità potranno bastevolmente provare, quanto di bene da questa facoltà ne ridondi negli Uomini. Gli innumerabili mali, che tutto di vengono ad assalirci, e tormentarci, riconoscono peravventura la loro origine dalla accresciuta, o diminuita irritabilità; ed oh noi felici se fatto ci venisse di trovar sicuri mezzi, onde accrescere questa forza minorata, o minorarla accresciuta. Fu pure bella provvidenza il ritrovato dell' oppio, senza cui, secondo il Sydenamio scarfa n' andrebbe e troppo mancante la medicina. Noi già sappiamo, che la forza motrice de' nervi accresciuta di molto, è la cagione da cui provengono le convulsioni, e questa forza viene in loro accresciuta da qualche stimolo, che pungendoli, sforzali ad agire. Se noi potessimo levare del tutto sì fatto stimolo, verremmo con ciò ad assettar questa forza, e a riordinare qualunque violento involontario moto. Ma perchè non è sempre dato il farlo, siam costretti ad usare di quel tanto, che può calmare questa commossa irritabilità, comechè non arrivi a levarne la causa, voglio dire dell' oppio, il quale tanto nell' inasprita irritabilità del cuore, non che ne' forti strignimenti delle parti contrattili, veggiamo quanto n' adoperi. Aggiungasi, che utilmente si usa nell' espulsione de' calcoli e del Feto, perchè rilascia alquanto le parti contratte, e non già come pensa il Signor Freind, perchè ristori le forze, e rimetta il vigore. Se così fosse lo adopraremmo vantaggiosamente in que' casi, ne' quali v' ha prostrazione di forze, dove però egli nuoce estinguendo quel poco d' irritabilità che rimane. Due debbon essere que' modi per sottrarre i malati a' tristi effetti prodotti dalla maggiore irritabilità per lo stimolo, che morde i nervi, e li punge. Il primo è quello con cui cerchiamo di involvere ed invescare il sottilissimo umor piccante; il secondo quello col quale cerchiam di espellerlo. S' ottiene il primo fine co' rimedj, che abbian del viscido; il secondo co' gl' incidenti, e diaforetici. Ma, ciò che stimola i nervi, non potrebbe egli forse esser prodotto da un qualche ristagno o lentore, cui non convenisse un dato sciogliente, il quale avesse in cambio la forza di maggiormente irritarli? De' due modi accennati crediamo doverci preferire al primo il secondo; imperocchè per questo viensi a torre del tutto la causa del male, e per quello, ella si viene ad impianare soltanto, e ad essere lasciata ancora nel corpo, sep-

seppure tant' oltre giungono tali rimedj. Aggiungasi, che i viscidj accrescono i ristagni e i lentori, e aumentano quella disposizione delle parti, per cui si rendono soggette a somiglievoli mali. Per questa disposizione vuolsi intesa una certa debolezza di fibre, ed una poca unione de' loro elementi, che per lo più si trova in coloro, che vanno soggetti a tali incomodi, e per la quale vien fatto, che ad ogni piccola causa si risvegliino in essi gravosi accidenti. Nel qual caso, le cose asstringenti, e i marziali sovvr' ogni altro rimedio, possono ragionevolmente essere usati per riparare a sì fatta disposizione, e guarire i sopradetti malori. Possono essi indurre sul principio notabili sconcerti; ma a poco a poco unendo più strettamente i principj onde son fatte le fibre, vengono a corroborarle, e a sì disporle, che n' emendano bene spesso in gran parte, e qualche volta del tutto la troppa delicatezza. Egli farebbe da desiderar caldamente, che i mentovati rimedj, corrispondessero sempre ed in ogni occasione a' nostri desiderj, e che, siccome è stabilita perfettamente e rischiarata pel mezzo d' osservazioni fedeli l' irritabilità, dal cui accrescimento o diminuzione dipendon le malattie; così si trovasse un giorno que' stabili rimedj che valessero a interamente riordinarla scomposta che fosse, fin a tanto che per le mutazioni, che a grado a grado succedono nella macchina animale, fossimo inevitabilmente al nostro fine condotti.

F I N E.

INDL

I N D I C E

201

Delle cose notabili.

A

- A** *Mfishi* non hanno corpo calloso. pag. 102.
Anguilla ha molta acqua nel pericardio. 75. Ha il cuore d'una struttura particolare. 75.
Anima ove risiede. 97 seg. 107, 122.
Animali freddi sono più irritabili. 128 seg.
Aorta è contrattile. 191 seg.
 Minuzzata seguita a contrarsi. 191.
Apice nel cuore contratto si accosta alla base. 63, 65, 71, 80.
Aponevrosi sono insensitive. 151, 156, 163. Non sono irritabili. 163.
Apoplezia, sue istorie: 100.
Araenoide non esce dal cranio. 84.
Argomenti contro la fede dell'anima nel corpo calloso. 98 seg. 101 seg.
Aria soffiata nella cava eccita il moto del cuore. 71 seg. 78, 178 seg.
Arterie sono irritabili. 41. Non sono irritabili. 191. Tentate cogl' esperimenti non mostrano l'irritabilità. 41. Negl' animali calti sono irritabili. 41. Sono solamente contrattili. 177, 191, 196. Sono insensitive. 156. Coronarie si riempiono come le altre arterie. 66, 77 seg.
Suppl. Part. I.

B

- B** *Alsamina* se sia irritabile. pag. 133.
Borsetta del fiele se sia irritabile. 45 seg. E' solamente contrattile. 177, 193.

C

- C** *Ani* hanno una porzione di cervello particolare. 20. seg. Non hanno la glandola pineale. 21.
Capsole delle articolazioni. 8, 156.
Carne è irritabile. 128.
Cautela adoprata negl' esperimenti. 2, 24 seg.
Cellulare è insensitiva. 156.
Cervelletto se abbia moto anologo alla respirazione. 13. Quale uso abbia. 22. Ferito siegue la morte. 100. Viziato non siegue la morte. 111 seg.
Cervello si muove a seconda della respirazione. 12 seg. D' onde abbia questo moto. 14 seg. In quali animali non si muove. 17. E' sensitivo. 19 seg. 91, 112, 121. Non è sensitivo. 94 seg. 109. Levato vive l'animale. 104. Infiammato è la causa della frenesia. 120. Ferito si fa paralitica la parte opposta. 123. Non è dato per la separazione de' spiriti. 188.
Circolazione del sangue nel feto. 140 seg.
C c *Cister-*

Cisterna del ctilo è contrattile. 192.
Colera da che provenga. 199.
Condotta toracica è irritabile. 44 seg. E' contrattile. 192.
Condotti escretorj sono solamente contrattili. 177, 192.
Contrattilità è diversa dall' irritabilità. 173 seg. 194. Da che proviene. 174. De' muscoli dura dopo morte. 34 seg.
Convulsioni succedono irritato il cervello, spinal midolla, e nervi. 19 seg. 23, 29 seg. 70, 96, 109 seg. 121, 185.
Cornea è insensitiva. 156, 172, E' produzione della dura madre. 172. Non ha nervi. 172.
Corpo calloso non è sensitivo. 95 seg. Perchè s'è creduto sede dell' anima. 98 seg. Non riceve tutti i nervi. 101 seg. Non è in tutti gl' animali. 102. Viziato dura la vita. 104. Che uso abbia. 106.
Cuore è irritabile. 64, 66 seg. 128, 137, 177. E' irritabile più d' ogn' altra parte, e perchè. 177, 180 seg. 195. E' in tutte le sue parti egualmente irritabile. 64 seg. Dura a muoversi lacerato il cervello, cervelloletto, e spinal midolla. 20 seg. 23, 70. Dura a muoversi anche dopo gl' intestini. 56, 63, 72. Non impallidisce nella contrazione. 64, 66, 69. Impallidisce. 178. Quanto conservi il moto. 64. E' posto in azione dal sangue. 64 seg. 179. In diastole è in stato naturale. 66. In sistole si stringe per tutte le dimensioni. 75 seg. 80. Nelle ranocchie impallidisce nella con-

trazione. 70. Per qual meccanismo si mova. 137 seg. Ha la sua forza dall' irritabilità. 176. Dura a muoversi anche separato. 36, 56, 64, 177 seg. Cute è sensitiva. 4, 8, 109, 172.

D

Diapramma come comprime la dura madre. 15. Si contrae irritato il frenico. 32 seg. 109, 114 seg. 129, 185.
Diarree, e dissenterie dalla viziata irritabilità. 197.
Diastole è lo stato naturale del cuore. 66.
Dolore maggiore oscura il minore. 168.
Dura madre, sua struttura. 122. Non ha fibre muscolari. 164. Non ha nervi. 144, 164. Ha nervi. 117 seg. E' incerto se abbia nervi. 119 seg. Si muove, e perchè. 11 seg. 109. Non ha moto. 165. Non è irritabile. 164 seg. E' insensitiva. 9 seg. 18, 20 seg. 91, 96, 109 seg. 118 seg. 122, 147, seg. 150, 165. Non accompagna i nervi. 18, 82 seg. In qual guisa accompagna i nervi. 82 seg. Accompagna il nervo ottico. 84.

E

Elasticità è diversa dall' irritabilità. 173.
Elettricità quali malattie nervose guarisca. 88 seg. Come operi nelle guarigioni. 89.
Esofago è contrattile. 54. E' solamente contrattile. 177, 181. Ha due moti. 54. Non ha moto peristaltico. 181.

Espe-

Esperimenti su la contrattilità delle
 arterie. 191. Delle vene. 192.
 De' vasi lattei. 44 seg. 192.
 Del condotto toracico. 44 seg.
 192. De' condotti escretori.
 192. Degl' ureteri. 48, 193.
 Dell' uretra. 48. Della vesi-
 ca orinaria. 46 seg. 193. Del-
 la borsetta del fiele. 45, 193.
 Della cisterna del chilo. 192.
Su l' insensibilità de tendini. 3,
 seg. 8, 158. Del pericranio.
 7 seg. Del periostio. 7 seg.
 166 seg. De' legamenti. 7 seg.
 164. Delle capsule delle arti-
 colazioni. 8, 164. Della du-
 ra madre. 9 seg. 96, 109 seg.
 Della pia madre. 18. Del
 corpo calloso. 94 seg. 96. Del-
 la pleura. 24, 171. Del pe-
 ritoneo. 24 seg. 171 seg. De'
 visceri. 25 seg. Delle apo-
 nevrosi. 163. Delle ghiando-
 le. 164. Della midolla delle
 ossa. 170 seg.
Su la sensibilità della midolla
 del cervello. 18 seg. Del
 cervelletto. 21 seg. 109 seg.
 112. Della spinal midolla. 23.
 De' nervi. 26 seg. 29, 31, 185
 seg. Del nervo frenico. 32
 seg.

Su l' irritabilità dell' iride. 38
 seg. Dell' arterie. 40 seg. Del-
 le vene. 43, 129. Della bor-
 settina del fiele. 45 seg. Delle
 carni. 128. Del cuore. 64 seg.
 66 seg. fino al 80, 128 seg.
 177 seg.

Sul moto della dura madre, e
 del cervello. 11 seg. 15, 165.
 Delle vene, e loro sangue.
 14 seg. Del ventricolo 50 seg.
 52 seg. Dell' esofago. 54 seg.
 Degl' intestini 56 seg. 181 seg.
Su la forza di contrazione, e ir-

ritabilità de' muscoli. 34 seg.
 36 seg. 184 seg.

F

F *Alce messoria* non ha pulsa-
 zione. 12 seg.
Febre come si spieghi dal Sauva-
 ges. 131.
Feci sono espulse dal moto peri-
 staltico. 55 seg.
Fegato è insensitivo. 25, 156.
Ferito il Cervello si fa paralitica
 la parte opposta. 123.
Ferite de' tendini non pericolose.
 3, 6, 161. Delle capsule
 delle articolazioni guariscono
 facilmente. 9. Del cervellet-
 to. 21 seg. 100, 108, 110 seg.
 Della spinale midolla. 23,
 100 seg. De' visceri. 25. Del
 feno longitudinale. 107 seg.
 De' muscoli peggiori di quelle
 del tendine. 161. De' lega-
 menti non sono pericolose. 164.
Forza movente si ha egualmente
 dal cervello, cervelletto, e
 spinal midolla. 23.
Frenesia sua causa. 120 seg.

G

G *Angli*, loro natura, ed
 uso. 87.
Ghiandole sono insensitive. 25,
 156. Sono irritabili anche se-
 parate. 36. Dell' Havers so-
 no insensitive. 164.

H

H *Aller* confonde irritabilità,
 e sensitività. 172. Non
 distingue contrazione, e irri-
 tabilità. 173. Non è stato il
 primo conoscitore dell' irrita-
 bilità. 173.

C c 2

Inte-

Intestini sono irritabili anche separati. 36, 56 seg. 181. Sono irritabili. 55 seg. 177, 181 seg. Grossi hanno il moto peristaltico. 55 seg. Minuzzati seguitano a muoversi. 182. Sono ancora contrattili. 183. *Introsuffezione* degl' intestini. 55, 183. *Inviluppo* de' nervi, e sua natura. 85 seg. *Iride* è irritabile. 38 seg. Se sij muscolare. 38 seg. E' insensitiva. 156, 172. *Irritabilità* cosa sia. 127 seg. 130, 172. E' forza nova. 172 seg. E' tra li principj della Fisiologia. 131. E' uno de principj degl' animali. 121 seg. E' ne' vegetabili. 115, 132. E' diversa dall' elasticità. 173. E' diversa della sensitività. 35, 56, 155. E' diversa dalla contrattilità. 173 seg. 194. E' qualità primordiale de corpi. 179. E' in quasi tutte le parti animali. 115. E' necessaria alla vita, e alla salute. 176. E' regolatrice delle passioni. 176. E' cagione del moto peristaltico. 182. seg. Quanto duri. 35, 51. Dura più negl' animali freddi. 128 seg. Tanto dura ne' muscoli, quanto durano i spiriti. 130. E' maggiore ne' giovani, minore ne' vecchi. 195. Viziata è cagione delle malattie. 194 seg. 200. Perchè dia ondeggiamen- ti. 173. De' muscoli. 34 seg. E' posta in azione dal sangue. 179. Dipende dai nervi. 132 seg. Non è proporzionata alla quantità de' nervi. 180. Non

risiede nel mucò. 175. Risiede nelle particelle organiche. 175.

Irritazione è il determinante dell' irritabilità. 74, 179.

L

Legamenti sono insensitivi. 7. seg. 156, 164. Delle articolazioni soli, sono insensitivi. 164.

Lienterie da che provengono. 199.

M

Malattie da che provengono. 194 seg. 199. seg. Nervose, loro sede. 88.

Mediafino è insensitivo. 156, 177. *Membrane* non sono tutte produzione della dura madre. 120.

Meningi accompagnono i nervi. 81. Infiammate non sono causa della frenesia. 121. Non danno l' origine alle membrane. 120. Sono insensitive. 156.

Midolla del cervello è sensitiva. 18 seg. 91, 121. Del cervello irritata, succedono convulsioni. 19 seg. Spinale irritata succedono convulsioni. 23. De' nervi, porta le sensazioni al cervello. 91. Delle ossa, è insensitiva. 156, 170 seg. Delle ossa, non ha nervi. 170.

Milza è insensitiva. 25, 156. *Mimosa* se sij irritabile. 133.

Morte come succedi. 135. 196.

Moti vitali come si spieghino. 135 seg.

Moro come si facci. 189 seg. Peristaltico. 50 seg. 55 seg. 181. seg. Peristaltico non proviene dall' aria. 55. Peristaltico è effet-

effetto dell' irritabilità. 182.
Muscolare come si facci. 134,
186 seg. Del ventricolo dura
dopo la morte. 51.

Mucosità gelatinosa non è sede
dell' irritabilità. 175.

Muscoli loro struttura. 156. Nella
contrazione non impallidiscono. 34 seg. 66. Hanno tre
forze contrattive. 35. Hanno
nervi. 157. Hanno la forza
movente dai nervi. 29 seg. Sono
sempre pieni di spiriti. 130,
133. Non si muovono per la
sola azione de' nervi. 65. Hanno
contrattilità, e irritabilità.
34 seg. 65. Sono irritabili.
176 seg. 184 seg. Non hanno
tutti egual grado d' irritabilità.
184. Hanno l' irritabilità
dai nervi. 130. Sono sensitivi.
157. Dell' addomine non
sono causa del vomito. 50.
Non concorrono all' espulsion
delle feci. 55.

N

N *Ervo ottico* perchè si spogli
della pia madre. 18.
Nervi loro struttura. 82. Sono
investiti da una cellulare. 82,
85. Onde abbiano la durezza.
86. Non compongono tutte
le parti. 156. Danno la
forza movente ai muscoli. 29,
185. Irritati si contraggono i
muscoli rispettivi. 32, 109,
114 seg. 128, 130, 132, 180.
Compressi, e irritati sopra la
compressione si move il muscolo.
32, 109. Non vanno tutti
al corpo calloso. 101 seg.
De' moti vitali non vengono
dal solo cervello. 711.
Hanno l' irritabilità. 115, 186.

Sono sensitivi. 7 seg. 26 seg.
Soli sono sensitivi. 156. Della
dura madre. 117 seg. Della
dura madre sono dubj. 119
seg. Non vanno al tendine d' Achille.
144, 160 seg. Frenici irritati si
contrae il diaframma. 32 seg. 109,
114 seg. 129, 185.

O

O *Ppio* snerva l' irritabilità.
28, 51, 53, 55, 61, 76,
197 seg.

Orrecchiella destra è l' ultima a
muoversi. 63, 67 seg. 70, 136.
Contraendosi, respigne il sangue
nelle vene. 16 seg.

Orrecchielle del cuore si contraggono
ad un medesimo tempo. 63, 65
seg. Precedono la contrazione
de' ventricoli. 65, 67.

Organi vitali seguitano a muoversi
ferito il cervello. 111 seg.

Ossa non hanno senso. 7, 156.

Osservazioni pratiche su l' insensibilità
del tendine. 3 seg. 148,
150 seg. 159, 162. Delle aponevro-
si. 151. Del peritio. 8 seg. 151,
167. Della dura madre. 10, 92,
118 seg. 147 seg. 149.

Su la contrattilità dell' utero.
194.

P

P *Aralisa* da che provenga. 88.
Con moto senza senso, e
viceversa come si spieghi. 190.
Parietaria se sij irritabile. 133.
Paronicechia perchè dolorosa. 89.
seg.

Parti irritabili quali sieno. 64,
177. Non irritabili. 156. Solamente.

lamente contrattili. 177. *Sensitive*. 135.
Pericardio contiene acqua. 69, 78. E' insensitivo. 136, 171.
Pericranio è insensitivo. 7, 151.
Periosio è insensitivo. 7, 151, 156, 166 seg. Interno dell' ossa, non ha senso. 170. Proviene dal pericranio. 165. Delle vertebre, procede dal pericranio. 84.
Peritoneo è insensitivo. 24 seg. 156, 171 seg.
Pesci non hanno corpo calloso. 102.
Pia Madre è insensitiva. 18, 93, 156. Accompagna i nervi della spina. 84. Accompagna il nervo ottico. 85. Non forma la coroide. 85. Fuori del cranio diventa cellulosa. 93. Non è la sede del senso. 92 seg.
Pleura è insensitiva. 24, 156, 171. E' sensitiva. 140.
Polmoni sono insensitivi. 25, 156. Sono sempre aderenti alla pleura. 139 seg.
Purganti come operino. 55.

R

Reni sono insensitivi. 25, 156.
Respirazione che moto sia. 115 seg. Suo meccanismo, e cause. 115 seg. 139. Sue utilità. 141. Dipende dall' irritabilità. 138 seg. Come concorri al moto del cervello. 15 seg. Che proporzione abbia col moto del cuore. 138. Come faciliti il circolo ne' polmoni. 16.
Risusso del sangue per quali cause si faccia. 11.
Rimedi della viziata irritabilità. 195, 199.

S

Sangue per quali cause torni al cuore. 11. Corre ne' vasi de' muscoli anche nella contrazione. 35. Mette in azione l' irritabilità del cuore. 64 seg. 195.
Sanità in che consista. 194.
Sclerotica è una membrana propria. 84 seg.
Sede dell' anima qual sia. 97, 101.
Sensazioni come si facciano. 189. Non si portano all' anima dalle membrane de' nervi. 90 seg. 120. Si fanno per mezzo de' spiriti. 120.
Sensitività cosa sia. 155. E' differente dall' irritabilità. 35, 155. Del pericranio difficile da scoprirsi, e perchè. 7.
Spiriti non sono necessari al moto, e al senso. 187. Messi in dubbio. 188 seg.
Stimolo chiama i spiriti. 135.
Stomaco è irritabile. 177.

T

Teca del tendine è sensitiva. 3, 5, 157 seg. 160 seg. Ha nervi. 157, 160 seg. E' insensitiva. 157.
Tendine è insensitivo. 3 seg. 148, 150, 156 seg. 159 seg. 162 seg. Denudato non sente. 3, 5. Vestito della teca sente. 3, 5, 158. Non ha nervi. 157. Ha nervi. 157. Non è irritabile. 6, 174. Non ha moto. 6. Non si contrae in se stesso. 34, 158. Sua struttura. 157. Punto perchè induce sintomi letali. 89 seg. Si può cucire senza dolore. 161 seg.
Tendine d' Achille tagliato cammi-

mina l' Animale. 3. Non ha
nervi. 144, 160 seg.

V

V *Alvole* non chiudono perfettamente gl'aditi al cuore. 66.

Vasi lattei sono irritabili. 44 seg. Lattei sono contrattili. 192. Del cervello hanno anastomosi. 114.

Vegetabili alcuni hanno l'irritabilità. 115.

Veleni sono sospetti in questi esperimenti. 2. Accrescono il moto peristaltico. 55.

Vene cave si muovono. 14, 67 seg. 76, 129. Legate non cessa il moto del cuore. 64, 70.

Vene quali abbiano moto, e quali no. 14. Ne' quadrupedi profime al cuore hanno moto. 14. D'onde abbiano questo moto. 15. Sono irritabili. 43. Sono insensitive. 156. Sono solamente contrattili. 177, 191. seg.

Ventricolo ha moto, 50 seg. Ha

207

due moti. 51 seg. Non ha moto dai muscoli dell'addomine. 50. Ha fibre carnee. 50. Seguita a muoversi dopo morte. 51. Come si contragga nel vomito. 51. E' poco sensitivo. 51. Ha la sua forza dall'irritabilità. 176.

Ventricoli del cuore si contraggono al medesimo tempo. 63 seg. 65, 67 seg.

Vesica urinaria è contrattile. 46 seg. Non è irritabile. 194. E fellea sono solamente contrattili. 177, 193.

Visceri sono insensitivi. 172.

Volatili non hanno corpo calloso. 102.

Volvo dalla viziata irritabilità. 198.

Vomito non dipende dai muscoli dell'addomine. 50. Si fa nella espirazione. 54. Da che provenga. 199.

Ureteri hanno poca contrattilità. 48. Sono solamente contrattili. 177, 193.

Uretra è poco contrattile. 48.

Utero è contrattile. 49, 177, 194.

F I N E.

SULLA SENSITIVITÀ
E D
IRRITABILITÀ
DI CERTE PARTI DEL CORPO UMANO.
SECONDA DISSERTAZIONE
DEL SIGNOR
CLAUDIO NICCOLA LE CAT.

All' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore

TOMMASO LAGHI

Pubblico Professore di Medicina e Notomia nella celebre
Università di Bologna, Dottor Collegiato, ed
Accademico Benedettino nello Istituto
delle Scienze.



*Contentatevi, o Illustrissimo Signore, che
in istampa io vi rechi la nuova Dissertazione del chia-
rissimo Signor Le Cat, la quale in iscritto tante volte
mi avete richiesta, sapendo che andava io sollecito del-
la medesima. L'avervela in simil maniera indirizza-
ta, ad altro non dee vi servire, che a dimostrarvi
quanto vi estimi, e in quale considerazione vi tenga.
So che tra le altre vostre pregevoli doti, quella posse-
dete di avere cuor grato per accoglier volentieri quello,*

A 2

che

che offerto vi viene; e che perciò, non vorrete privar
 me del contento di accettare quest'atto di mia rimostanza,
 il quale, quanto è sincero, altrettanto è pieno di
 rispetto. Mi è giunto come sapete questo ragguardevole
 scritto in tempo, che non ha potuto aver luogo nel
 Tomo Anti-balleriano, e mi è giunto mercè la instancabil
 opera del rinomatissimo Signor Bianchi di Torino
 vostro, e mio rispettabile amico; ed io per mandare ad
 effetto l'intenzion del suo perspicace Autore, lo fo pre-
 venire il supplimento, mandandoglielo innanzi stampato,
 onde chiunque se ne volesse provvedere, far lo possa
 anche prima dell'uscire di quello, nel quale, tra le
 molte altre varie cose, terrà pur esso il suo luogo. Io
 non istarò quindi ad usare arte e studio per disporre l'
 animo vostro gratissimo ad accogliere questa stampa
 volante, troppo persuaso essendo, come ho poco sopra
 detto, del vostro bel cuore: solo mi estenderò a pregarvi
 a tenermi tra i vostri veri e leali amici, e particolar-
 mente tra il novero di coloro, i quali desiderano vostri
 comandamenti, per poter vi, sempre che me ne vogliate
 far degno, mostrare, che io veramente sono
 Di V. S. Illustrissima, ed Eccellentissima.

Bologna li 9. Agosto 1757.

Devotissimo, ed Obbligatissimo Servidor vero
 Giacinto Fabri.

L E T T E R A

DEL CELEBRE SIGNOR LE CAT

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

GIOVAMBATISTA BIANCHI

DI TORINO.

ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

A Vendo io saputo da uno de' miei Amici di Parigi per lettera, che Voi gli avete scritto stamparsi in Bologna una Raccolta, la quale deve contenere tutte le cose, fatte contro l' opinione del Chiaro Signor Haller sulla sensitività, ed irritabilità di certe parti; non tardai più, perchè su queste vostre certezze, mi determinassi di far avere pel vostro mezzo a' Signori impegnati in questa stampa le mie osservazioni, e riflessioni sopra quello, che pensa il Signor Haller. Scelsi con sommo mio piacere quest' occasione, per darvi un saggio de' sentimenti pieni di rispetto, e di estimazione, non che della venerazione, che da lungo tempo io
con-

conservo pel vostro gran sapere. Di fatto, chi è l'Anatomico, e il Medico dell' Europa, il quale non abbia letta ed ammirata la storia del Fegato del famoso Signor Bianchi? Non sarebbe poco per me, che queste mie controversie col Signor Haller mi avessero procurata la preziosa corrispondenza di un sì grand' Uomo, qual voi vi siete. A questa mia brama primiera, un' altra ancora, se non temessi di avvanzarmi di troppo, mi farei lecito di aggiungere, che è di avervi in Protettore appresso l' Accademia di Bologna, il cui celebre grido mi ha fatto da gran tempo bramare l' onore di esserle associato: A dir vero, mi è sempre paruto, che tra li titoli onorifici, de' quali m' hanno decorato le Accademie di Francia, d' Inghilterra, di Spagna, di Germania &c. quello mi mancasse di essere confermato da un' Accademia, la quale ha dato mossa a tante altre Società, e che è come la Patria delle Accademie. E con ciò mi dò l' onore di essere colla maggiore estimazione, e la venerazione la più rispettosamente

Di V. S. ILLUSTRISSIMA

Roven li 15. Giugno 1757.

Umilissimo, ed Obbligatissimo Servidore
Le Cat Secretario perpetuo dell' Accad. delle Scienze di Roven.

DISSERTAZIONE II.

intorno la *sensitività* della dura, e pia madre, delle membrane, de' legamenti, delli tendini &c. e intorno l'*insensitività* del cervello, e l'irritabilità Halleriana. Estratto del piano di una nuova edizione della memoria, che forma il seguito di quella sul moto muscolare, premiata dall'Accademia di Berlino nell'anno 1753.

DEL SIGNOR LE CAT.

Dottor Medico, e capo Chirurgo dell'Hôtel-Dieu di Roüen, Professore-dimostratore Reale di Notomia, e Chirurgia, Socio delle Accademie Reali di Parigi, Londra, Madrid, Berlino, Imperiale de curiosi della natura, e Segretario perpetuo di quella di Roüen.



Rovavami io unito in letteraria corrispondenza col celebre Sig. Haller quando composi la memoria intorno al moto muscolare premiata dall'Accademia di Berlino nel 1753, e quella intorno la sensitività della dura, e della pia madre, che è una continuazione della precedente. Essendo ben persuaso, come significai fin d'allora al Sig. Haller, che la diversità d'opinione non dee porre ostacolo né alla stima, e molto meno all'amicizia fra persone assennate; non feci difficoltà di confessare ad esso, che le mie opinioni erano opposte alle sue, e di mandargli ancora la mia memoria, in contraccambio della quale, ne ricevetti le sue, e quelle de' suoi allievi, le quali difendevano la tesi contraria. Ho lette tutte quest'opere, ho ripetuto, e fatto ripetere da miei allievi i più capaci le esperienze de' suoi discepoli, e le sue. Mi sono sollecitato a prender tutte le occasioni di farne sopra i feriti, che da tre anni in quà mi ha somministrato il mio Spedale. Ho impegnati nelle stesse osservazioni tutti li miei corrispondenti di Francia, di Germania, d'Italia, d'Inghilterra &c. L'edizione a cui mi dispongo, è prodotta da tutte queste fatiche assieme unite, e dalle riflessioni, che le hanno originate. La presente dissertazione è un semplice estratto di quest'opera, nella quale più di tutto ho preferite le osservazioni, contro le quali 'l Sig. Haller ha pubblicato le sue obiezioni, la soluzione delle quali riconosco da lui medesimo,

fimo, dall' Accadèmia di Berlino, che ha fatto pubblicar colle stampe la memoria contraddetta, e dal Pubblico interessato in questa tale quistione.

ARTICOLO I.

Sensività della dura madre.

GLi accidenti, che occorrono di giorno in giorno nelle ferite di testa, ci danno a conoscere, che la dura, o la pia madre offese, ed irritate che sieno da scheggie, o dal sangue, o dal marciume, che vi si spande sopra, cagionano al ferito la febbre, il sopore, ed il delirio.

„ Mons. Poupart ha veduto una donna, a cui fu necessario staccare la metà del cranio, del quale servivasi a ricercar l' elemosina; „ e siccome aveva la metà della dura madre scoperta, venendole questa un giorno toccata colla estremità del dito, gettò un' orribil „ grido, e disse, che se l' erano fatte vedere mille candele. (1)

Il Sig. Haller crede di confutar questa osservazione, e alcun' altre che seguono, coll' attribuire gli effetti di questo toccamento alla compression del cervello, ma questo grand' uomo, non ha fatto attenzione alle seguenti circostanze. In primo luogo questa dura madre non fu toccata, che *leggiamente colla estremità del dito*, e perciò il cervello non ha potuto ricevere compressione alcuna da simile toccamento, e una scossa così leggiera non ha potuto passare la dura madre, ne ha prodotto tanto effetto, che col mezzo della grande sensitività di questa membrana. II. Non posso passarla ad un sì celebre Fisiologo qual' è il Sig. Haller, credendo com' egli fa, che la compression del cervello produca del dolore. Vedesi tutto di appoggiare assai gravemente sul cervello de' fanciulli, ne quali la fontanella è ancor molle, senza che loro ne costi alcuna fastidiosa sensazione; le scosse, che a quest' organo si danno per cagione de' salti d' un ballerino, vi fanno delle compressioni ancor più violenti, senza produrre in esso il menomo dolore. M' è accaduto di vedere assaiissime commozioni del cervello derivate da cadute, gli ammalati erano sopiti, non potevano reggersi in piedi, almeno per certo tempo, ma non soffrivano dolore. Ho veduto un cervello compresso all' ultimo segno da una grandissima quantità d' acqua in un idrocefalo, senza che l' ammalato se ne dolesse punto, ne poco. In fatti si concepisce, che la compressione, o la pressione di quest' organo fatta a un certo grado, può interrompere il corso de' spiriti, rendere il soggetto letargico, paralitico, ma non sofferente. Imperochè gli effetti precedenti, sono precisamente il contrario di questa sensitività accresciuta, o eccitata, che il Sig. Haller pretende, che debbasi attribuire alla compression del cervello.

Se

(1) Giorn. de letter. dell' 3. Luglio 1684.

Se si danno commozioni di quest' organo con fintomi dolorosi, la ragione è, perchè le di lui membrane partecipano della commozione, e sono state stirate, e forzate dalle medesime scosse. Per cotale guisa, le grida degli animali a' quali il Sig. Haller ha staccata la dura madre, venivano prodotte dalla lacerazion delle fibre di questa membrana, e non già dalla compression del cervello, che fa il dito dell' operatore, come lo crede questo celebre Medico. Ecco come formasi una illusione, quando s'è abbracciato un sistema, e perciò ricusasi di aderire alla verità nelle circostanze, in cui sembra essere evidentissima. Già è dimostrato e in fatti, e in teorica, che la compression del cervello non può essere dolorosa, non solamente nella opinione di quelli, che giudicano insensibile quest' organo, essendo una tal conseguenza per se medesima troppo chiara, ma col supporre parimenti un tal viscere dotato di senso, giacchè li nervi unanimemente riconosciuti forniti della più squisita sensitività, vengono tutto di compressi, senza riceverne il menomo dolore, benchè la compressione giunga bene spesso a segno d' interrompere in esso loro il corso de' spiriti, ed a gettar le parti, alle quali si diramano in una totale stupidità. Lo che scorgesi allora quando si stà per lungo tempo, e gravemente appoggiato o sul braccio, o sopra una coscia &c.

Leggiam nella storia dell' Accademia dell' anno 1711. alla pagina 27. che degli offetti angolosi formatisi nella dura madre, pungevano questa, e insieme la pia, hanno cagionati dolori di capo, vomiti, perdita di cognizione, ed il totale anientamento delle idee, la distruzione intera della memoria, l'epilessia, e per fino la morte. E' impossibile lo attribuire ad ossa angolose una compression del cervello capace di produr somiglianti accidenti, e di pensare, che questi stessi accidenti nascer possano da una semplice compression del cervello.

Questa osservazione scorgesi confermata da altre due della medesima natura riferite nella medesima storia degl' anni 1713, e 1739. alle pag. 21, e 99. E Mons. Helie Decano della Comunità de' Signori Chirurghi di Rouen donommi un pezzo di cranio, che in sequela d' una frattura guarita già molto tempo avanti, avea lasciato verso la parte interna una cavità, ed una punta la quale pungeva la dura madre, avea cagionato alla persona, dalla quale erasi tratto, un perpetuo dolor di capo.

Saviard nell' osserv. 6. alla pag. 16. aperse nel Maggio 1692. il corpo del sù Mons. Moreau Uditor della Camera de Conti, che era stato fieramente tormentato più d' un' anno prima della sua morte da un sì violento dolor di capo, che bene spesso perdeva l'uso della ragione, e un tal dolore era spesso accompagnato da una febbre più o men considerabile. Avea soli 35. anni, era di buona costituzione, e stette sempre molto bene di sua salute fino, che fu forprecio da questo incomodissimo male.

„ Saviard scopersè fra la dura, e pia madre sotto la giuntura „ della sutura sagittale colla lamdoidea, là dove la falce è più alta.
Suppl. Part. II. B „ lar-

„ largata un osso triangolare, li cui angoli erano assai acuti, e in
 „ istato di pungere queste membrane dolorosissimamente in cadauna
 „ scossa, ch' egli potesse ricevere. Quest' ossetto era del volume d' un
 „ grosso pisello con angoli un po' risaltanti, e appianati. La dura ma-
 „ dre scorgevasi tutta livida ne luoghi, ove le punte di quest' osso
 „ l' avevano punzecchiata, e ne uscì qualche poco di marciume.

Ho trovato io medesimo li 28. Maggio 1753. nella duplicatura della falce medesima di Guglielmo le Sueur Selciatore d' Oüessel in vicinanza di Roüen due pezzi ossosi, che aveano cagionato 2 costui dolori atroci di capo, inoltre, peripneumonie, sputi di sangue, vomiti, e per fine la morte. Lamine d' osso, ed ossi grossi quanto un pisello, possono eglino produrre compressioni così fatali alla sostanza del cervello?

Monf. Du Verney, ed un Medico mio amico, hanno trovato vermi nel seno longitudinale superiore di certi giovani, ai quali quest' insetto avea cagionati dolori di capo, convulsioni, una febbre lenta, e la morte. Non si può in caso simile supporre niuna compression del cervello.

Nel 1696. (1) un Contadino di Brettagna oppresso da mali di capo li più violenti per lo spazio d' anni tredici, venne all' Hôtel-Dieu di Parigi a ricercarne sollievo, e ne ottenne la morte. Monf. Duprey che n' era in quel tempo Chirurgo, trovò le due tavole del di lui cranio cibrate in più luoghi, e la dura madre cancerenata di rincontro a quest' aperture, senza che il cervello avesse per verun modo sofferto. Monf. Duprey diede questo cranio a Monf. Du Verney per valersene ne suoi pubblici esercizi, e questi due uomini insigni, testificarono il fatto a tutti li loro ascoltanti (2).

Il dì 30. Dicembre 1751. fu portato al nostro Spedale Eustachio Fleury Artigiano in una delle nostre manifatture di majolica a cui la ruota, che adoprafi a macinare lo smalto avea portati via tutti gli integumenti della tempia destra coll' orecchio, e avea infranta tutta la parte scagliosa dell' osso temporale, che avea inoltre abbassata nella cavità del cranio per mezzo della sua parte inferiore. Levai tutti questi pezzi. Passai poscia le dita sotto le parti residuali del crotafite, e sotto gl' orli del cranio nel quale avendo sentito alcune altre scheggiuole, passai sotto le mie dita trà la dura madre, e gli orli della frattura l' uncinetto, che adopro nella operazione della fistola lacrimale per far uscire dal naso la candeletta, che io passare pel condotto nasale. L' infermo si lamentò acerbamente nel fare una tal ricerca, e mi fece vive istanze di farle il meno male, che mi fosse possibile. E pure il mio uncino ottuso non toccava

(1) Storia dell' Accademia 1700. p. 40.

(2) Questa osservazione mi è stata comunicata da Monf. Helia, che trovavasi presente alle lezioni di Monf. Duverney, e che l' avea scritta sotto la dettatura di questo chiaro Professore.

cava che la dura madre, e gl'orli del cranio fratturato. Le mie dita, che sostenevano l'altre parti molli, erano immobili.

Il Sig. Haller crede, che la compressione dell'uncinetto abbia potuto comunicarsi al cervello. Questa parola di uncinetto, può far pensar del pari a coloro, che non hanno altra cognizione, che dell'istrumento di simil nome, che si adopera ne' parti. Ma quando si riguarderà la delicatezza di questo, il quale è stato inventato a solo fine di cercare una candela nella inferior parte delle narici, si comprenderà, che non può produrre la compressione, che viene allegata.

Per procedere alla cura, posi sopra la dura madre un piumacciuolo imbevuto d'acqua spiritosa di lavanda, che fece uscire in alcuni altri lamenti il ferito.

Lo spirito di vino, dice il Sig. Haller, si fa appena sentire, nella dura madre nella speriienza del Sig. Le Cat.

In fatti è ben da stupirsi, che una testa ammaccata, che una dura madre con tale ammaccatura abbia poca sensitività in uno stato, in cui il paziente trovandosi stupido, ha quasi una generale insensività.

Gli effetti del semplice tocco del mio uncino, e la impressione dell'acqua di lavanda, sono due circostanze assai decisive in favore della sensitività della dura madre. Ciò non ostante avrei potuto rendere questa decisione più irrevocabile, toccando col mio uncino nel mezzo della dura madre, nelli tegumenti, e ne' muscoli alternativamente, interrogando quindi a cadauna di queste prove il ferito sul grado del senso particolare per ciascuna di queste parti. Ma io mi trovava talmente occupato dalla premura di apportar sollievo a quest'infelice nella sua terribile ferita, che tal idea non mi sovvenne, che un'ora dopo averlo medicato.

Mi proposi bensì di eseguir simili prove nella medicazione della fera. Ma il ferito era caduto in un sopore letargico, e morì poco dopo. Fu aperto, e non vi si trovò lesione alcuna nel cervello, ed era assai chiaro, che quella della dura madre era la sola cagione della sua morte. Ebbi una prova affatto simile a questa degl'incidenti mortali della sola lesione delle meningi li 15. Gennajo 1752. in un artefice, il quale restò ferito ne i lavori del nuovo Hôtel-Dieu, che fabbricossi fuori della Città, ma una tale osservazione non aggiunge veruna cosa alle precedenti.

La dura madre d'Eustachio Fleury, che corrispondeva alla ferita trovossi trasparente nel mezzo, come se fossesi disseccata, o imbevuta d'oglio. Una tal circostanza mi fa pensare, che per far delle prove decisive sopra la sensitività di questa membrana, sia necessario, che ella sia di fresco scoperta, e non alterata dalle materie.

Finalmente li 9. Luglio 1752. trovai questa preziosa occasione, che avevo lasciata sfuggire li 30. Dicembre 1751. di decidere col mezzo di fatti ben circostanziati la questione sulla sensitività della dura madre.

Antonio Mabire manuale muratore in età di 22. anni di Fleury

ry la Forest de Lions lavorando presso la Signora Contessa d' Anger cadde il dì 3. Luglio a sett' ore della mattina da una scala dell' altezza di 20. piedi, urtando colla tempia sinistra contro un pezzo di legno quadro, che facendole una ferita, internossi, e spezzò questa regione del cranio. Nello stesso giorno gli fu tratto sangue tre volte, e il giorno appresso alle sett' ore della sera ci giunse all' Hôtel-Dieu di Rouën. Avea il coronale, e l' osso temporale nella union loro alla sommità delle tempie, e incontro all' orbita spezzati, e internati. Un lungo pezzo inferiore moveasi, e la sostanza del cervello usciva dall' apertura fatta di sotto all' orbita verso il picciol angolo.

Feci una vasta incisione cruciale in questa regione. Levai gl' integumenti sopra, e all' intorno di questi pezzi rotti. L' ammalato era sano di mente. Prima però di staccar tutti questi pezzi, li cui strappamenti potevano stupefare la dura madre, ebbi questa volta attenzione di fare la nostra esperienza con tutte le possibili cautele, e diligenze. Toccai con un nettadenti gl' integumenti, e il pericranio, ch' io aveva posto in libertà, e chiesi al ferito se si risentiva di quel ch' io le faceva. Mi rispose di sì: passai lo stesso nettadenti per la frattura, ed avendolo mosso, e rimossi sopra la dura madre, le chiesi di bel nuovo se lo sentiva; sì, mi rispose; ma qual de' due vi fa più male le dissi; Questo, ove siete ora replicò egli; tutti i Chirurghi dell' Ospitale al numero di 15, o 20. si trovarono presenti a questa medicazione, i quali occorrendo potrebbero fare un' attestazione di tutti questi fatti.

Allora levai i pezzi frantumati in numero di 9. uno de' quali, di figura triangolare, avea l' altezza di tre dita, e mezzo, e 3. di larghezza nella sua base; Un' altro quasi quadro, avea un pollice, e mezzo pel lungo, e uno pel largo; gl' altri sette eran minori. Questa estrazione fu laboriosa, e durò molto; Il ferito affaticato, dopo l' operazione, non sentiva più toccarsi col nettadenti, nè sulla dura madre, nè sopra gl' integumenti. Il solo spirito di vino applicato sopra la dura madre rinovò i suoi dolori, e i suoi lamenti. Forse qualche altro men coraggioso, e men sano di spirito, non avrebbe neppur sentito questo spiritoso liquore, e questo è il caso de' feriti, che han fatto credere, che la dura madre sia insensibile. Vi possono essere per altro porzioni di questa membrana quasi cartilaginose, oppure ossificate, nelle quali sia realmente estinta la sensazione.

Il giorno seguente dopo la medicatura, il nostro ferito in pieno sentimento, e vigore, diede altre più autentiche prove della sensitività tanto de' tegumenti, che della dura madre. Nettando questa con bordonetti, e lavandola dal sangue, che si era travasata, con parti eguali d' acqua comune, e d' acqua di lavanda, affermò assai positivamente di sentir molto dolore. Raddoppiò i suoi lamenti nel passar, che io feci le estremità delle dita, e una lastra di piombo crivellata fra la dura madre, ed il cranio.

La dura madre restando in tal guisa coperta da questa lastra per cagione massime delle frequenti eruzioni della sostanza del cervello, non vi fu più modo di ripigliare le nostre sperienze sino al decimo quarto giorno della operazione, nel quale le papille carnosae della dura madre cominciando a trapelare per i buchi della lastra, la levai, e trovai la maggior parte di questa membrana coperta da questi fiocchetti carnosì.

La nettai con un bordonetto, e la lavai con l'acqua di lavanda temperata per metà coll'acqua comune, e così pure le carni degl'integumenti. Chiesi al ferito se sentisse quel ch'io gli faceva, mi rispose di sì; l'interrogai sul grado del suo dolore, mi disse, ch'era mediocre, e del pari rispose, o nel toccargli le carni della dura madre, o quelle degli integumenti. Queste nuove sperienze a me sembra, che confermino le opinioni antiche. Li suoi dolori erano mediocri; imperocchè i medicamenti spiritosi applicati ciaschedun giorno, vi avevano avezzate queste parti, e rintuzzata la lor sensazione. Erano eguali, sì per l'una, che per l'altra parte, perchè le papille carnosae della dura madre, del pericranio, e delli tegumenti erano esattamente le medesime. Tale esperienza si è ripetuta, ed i suoi risultati sono sempre stati confirmati nelle medicature seguenti.

Se v'ha in tutta la Fisica sperimentale fatti precisi, esatti, ed evidenti, questi certamente lo sono; e non ostante il Signor Haller pubblica nelle gazzette di Gottinga, nelle sue dissertazioni sopra l'irritabilità, e sensitività, che le mie sperienze sono *fuor d'ordine, e indeterminate*. Io mi credeva d'aspettare da un uomo dotto, qual'è il Signor Haller, meno pregiudizj, e più equità.

Alla regione della dura madre lacerata di Mabire, e nel cervello, che riempiva quest'apertura, trovavasi una crosta bianchiccia, sopra cui applicai uno de' nostri piumacciuoli già imbevuto d'acqua di lavanda temperata, come ho esposto, ed intinto di miele rosato. Nel giorno appresso, questa porzion del cervello comparve coperta di fiocchetti vermigli, ed essendo tra pochi giorni cadute le croste, e formate le sfollazioni, non vi restò più, che un sol letto carnosò uniforme, d'un senso eguale, ma più concentrato verso il mezzo della piaga, che verso gli integumenti; poichè la fermentazione suppuratoria, che gonfiava questa porzion del cervello, e gli faceva formontare il livello, era cessata. Quando però le sfollazioni eccitavano una nuova suppurazione abbondante, il fondo della piaga si rilevava verso il livello.

Nel quarantesimo giorno dell'operazione, essendosi raccolta un po di marcia, nella concentrità della quale ho parlato, il ferito cominciò a dolersi d'un piccol mal di testa, che cessava, allorchè era medicato. Tale impressione della marcia sopra la dura madre coperta di carni granite, è una nuova prova di sua sensitività, e conferma le conseguenze, che tratte abbiamo in favor suo da' mali di capo sì fieri, prodotti dalle impressioni de' corpi, o materie nocive sulla
dura

dura madre toccata nella sua nudità, se si può dir così, da queste materie.

Simili osservazioni, e molt' altre ancora, ch' io riferbo pel volume, che publicar deggio su questa materia, dimostrano, che i dolori di capo provengono dal dolor particolare, che ha la dura, e la pia madre; ne viene per conseguenza, che queste membrane hanno la loro sensitività, come i muscoli hanno anch' essi la loro, non solo nelle impressioni de' corpi stranieri, ma altresì nelle affezioni diverse delle infermità, e veggiamo ogni giorno le sfusioni, i reumatismi, la gotta, dopo averci dolorosamente tormentati nei muscoli, e nelle giunture risalire al capo, e cagionar in esso quell' altro particolar dolore, che da noi dicesi dolor di capo; poichè queste malattie hanno la loro sede negl' involucri del cervello. Perciò le emicranie periodiche accompagnate da vomiti, e sì terribili pel dolore, e per l' oppressione, occupano queste istesse membrane sulle quali la puntura d' alcuni oggetti contro l' ordine naturale, hanno prodotti tali sintomi secondo le precedenti osservazioni. Queste membrane adunque sono sensitive.

E se nol fossero, come la lor lesione potrebbe cagionare dolori mortali? Si lacererebbero con pericolo niente maggiore di quello v' ha a tagliarsi i capelli, e a rodersi l' unghie, e il termine di lesione per nulla lor converrebbe. Un organo ferito, non può condurre alla morte, che in uno di questi due modi, o coll' intercettare il corso de' fluidi, da quali dipende la vita, come l' apertura d' una arteria considerabile, la compressione, o la sezione del principio nervoso; oppure col depravare, o dissipare pel dolore, o per qualch' altra cagione questo istesso fluido vitale. Ora la lesione della dura, e pia madre non interdice il corso del sangue, o degli spiriti, sebbene renda le sorgenti di questi due fluidi più tarde, e lente. E' meno possibile ancora, che una semplice ferita da causa esterna possa portarvi una virulenza capace di alterare colla sua mala qualità saniosa questi fluidi. Adunque dal solo dolore, e dalla perfezion degli spiriti, che ne sono la conseguenza, dipendono gli accidenti perniciosi, e mortali di questa lesione.

Dirà forse alcuno, che il cervello è così vicino a queste madri membrane, che le cagioni violente della loro offesa, non possono non assalire questo pregiabil viscere, e che la sua lesione più tosto, che quella di tali meningi, producono gli accidenti, che alle medesime vengono attribuiti?

Le osservazioni seguenti, per lo cui mezzo si vede, che le ferite della dura madre non hanno potuto per modo alcuno portar offesa al cervello, provano per conseguenza, che i loro accidenti erano della lesione di questa membrana, e non del poc' anzi detto viscere.

Nel Sabato 4. Giugno 1740. Vigilia della Pentecoste, Dionigi Cauvet Macellaro alla piccola macelleria di questa Città, uomo di

di 35. anni, e d' un temperamento robustissimo nel pesar carne ad una bilancia, li cui fusti suspendono uncini, lasciò scorrer quello, dov' egli attaccar voleva un quarto di bue. Il peso equivalente, che sosteneva l' altro braccio della bilancia, operando interamente sopra quello dell' uncino da cui erasi la carne staccata, rialzò violentemente questo, il quale incontrandosi colla palpebra superiore di Cauvet, glie la squarciò, entrò nell' orbita, e lo sospese in qualche maniera per questa parte. Cauvet cadde tosto in istupidità, compreso da tutti gli accidenti della lesione della dura madre, che veste l' orbita, e in 3, o 4. giorni non ostante tutti i soccorsi dell' arte, che vi si poterono apprestare, trapassò.

Clermont Soldato nel Reggimento Real-Dragoni ricevette nel Lunedì 2. Aprile 1753. un colpo di punta di spadone alla palpebra inferiore dell' occhio destro. Cadde egli tosto a terra senza cognizione. Le fu immediatamente cavato sangue dal braccio, e dal piede. La cognizione non le tornò, avea il polso concentrato, vermicolare, moti convulsivi &c. Morì la notte delli 3, andando alli 4. dalla sua ferita.

Aperto il cadavere trovai, che il colpo avea toccato il fondo dell' orbita sul canale del nervo ottico parte inferiore esterna sull' appendice ossosa, che separa questo foro dalla fessura sfenoidica: l' osso in questa parte era stato spezzato dalla punta dello spadone, ma il nervo ottico era sano, ed intero, siccome tutti quelli, che passano per la fessura sfenoidica. Alcuni rami di vasi solamente erano stati aperti, e aveano tramandati sangue, del quale trovammo pure alcuni piccoli grumi, ne l' occhio, nè le sue appartenenze erano state offese; il solo nervo ottico avea una espansione di sangue sotto la prima sua tonaca, che deriva dalla dura madre. Tutta la porzion di questa parte di meninge situata nel cranio era inzuppata di sangue, e sopra eravi una cucchiara di linfa sparsa. Cosicchè da questa osservazione si ricava, che la dura madre, che veste l' orbita, e che somministra la prima tonaca al nervo ottico, e fornisce le pareti della regione vicina del cranio, era la sola parte molle ferita, e affetta da' segni di lesione. Per conseguenza la sua sensitività, e la sua tensione erano soli la causa degli accidenti, e della morte seguita a questa ferita.

Il Sig. Haller asserisce contro questa osservazione, *che il nervo ottico è stato offeso per mia propria confessione.*

Si è veduto per lo contrario, ch' io ho detto espressissimamente, *ma il nervo ottico era sano, ed intero.* Quanto allo spargimento del sangue sotto la sua prima tonaca era questo una conseguenza della sola lesione della dura madre, come pure lo stesso accidente, e lo spandimento di linfa osservati in tutta la regione anteriore di questa membrana. Ne deriva per conseguenza, che è impossibile il sottrarsi da questa conclusione, che la sola ferita della dura madre sia stata la causa della morte di Clermont, e di Cauvet.

E' ben

E' ben difficile; soggiunge il Sig. Haller, che in una sezione ordinaria s' arrivi a sapere, se i nervi, che vanno serpendo intorno all' orbita, sianfi conservati.

Purchè il Sig. Haller per i termini di una dissezione ordinaria non intenda una dissezione malissimo fatta, non vedo ove sia la difficoltà di distinguere al fondo dell' orbita, se i nervi sieno feriti, o no: se si tratta de' filamenti de' nervi quasi impercettibili, la loro ferita non potrà produrre le morti sollecite, delle quali poc' anzi s' è parlato; se si tratta di nervi importanti, converrebbe essere molto mal pratico d' anotomia per prendere abbaglio.

Dopo la mia memoria mandata a Berlino, ho fatto, ed ho fatto fare quantità di sperienze sopra la dura madre. Se ne sono trovate alcune in cert' uni, ne quali non s' è veduto segno, che tali membrane fossero sensitive, ma la maggior parte mostravano una precisa sensitività, e vedrassi all' Articolo IV. quale fondamento far debbasi, su i fatti negativi. Mons. le Blanc valentissimo Chirurgo ad Orleans, amico mio, avea trovato una dura madre con apparenze d' insensività in una piaga accompagnata da una ammaccatura, e da una comozione estrema. Quest' amico, alcuni mesi dopo, fu egli stesso assalito da una malattia in questa membrana, che gli diede una ben viva lezione sopra la sua sensitività. Li 19. Giugno 1756. facea vedere a non so quali Dame forestiere la fonderia della moneta d' Orleans. I fornelli erano accesi, il calore era estremo, e il vapor del carbone lo assalirono immediatamente pel naso, mediante la membrana pituitaria. Fu preso da un infreddamento, e da un dolore a tutta la regione anteriore, e superiore della dura madre, fino verso le orecchie. Alcuni giorni dopo, risentì in queste regioni li più crudeli dolori, e provò in appresso li più pericolosi, e più lunghi accidenti fin che la marcia si fu aperto un passaggio per le orecchie. A misura, che i più atroci dolori diminuivano, mi scrivea per consultarmi. Nella sua lettera delli 16. Agosto 1756, che era il cinquantesimo giorno di questa sua dolorosa malattia, mi assicura ch' egli sentiva l' effetto della suppurazione nella duplicatura della sua dura madre, e la distrazione delle pareti di questa duplicatura a cagion della marcia, che cercava farsi strada per la parte che avesse meno resistito; E quindi è, dice egli, per cagione di tale distrazione, che provo sì gran dolori; di maniera che parmi, che la marcia dissecchi per così dire le lamine della dura madre. Dopo sì cruda esperienza, proseguisce egli, venga pure il Dottor Haller a dirmi, che tale meninge non è sensibile; l' avrei bensì desiderato, perchè in tal caso non avrei sofferto i dolori crudeli che soffro, prodotti dalla irritazione di questa membrana.

Mons. Clavier Maestro Chirurgo a Neubourg in Normandia allievo della Università di Parigi, mi ha mandato in Ottobre 1756. l' osservazione di una piaga di testa dov' era scoperta la dura madre, e sulla quale egli ha assertivamente mostrata più volte davanti a
pa-

parecchie persone dell' arte la sensitività di questa membrana all' impressione de' liquori spiritosi, al contatto d' uno stuzzicadenti, d' una sonda &c., ed ha accreditata questa osservazione con un processo verbale, sottoscritto da testimonj presenti. La brevità, che mi sono prefissa in quest' estratto, m' obbliga a sopprimere altri raziocinj su tale materia.

ARTICOLO II.

Sensitività della pia madre.

LE precedenti osservazioni sono principalmente concernenti alla dura madre. La presente è una circostanziatissima riguardo alla pia madre, e che parmi egualmente adattata a formare un sistema stabile intorno alla sensitività di questa membrana.

Saranno vent' anni, che opero nell' Hôtel-Dieu di Rouën, ed ho osservati circa una dozzina d' infermi assaliti da questa rigidezza universale de' muscoli, che noi diciamo *Tetanos*, e non mi sovviene d' averne veduto guarir alcuno.

Tutti convengono, che questa malattia consista in una contrazione convulsiva di tutti i muscoli; ma qual' è la cagione di tal contrazione costante.

Gli autori più accreditati e celebri son di parere, che questa causa sia nel cervello sorgente del fluido, che produce la contrazione ordinaria di questi organi.

Avrei volentieri aderito ad autorità sì rispettabili, se non mi fossi creduto ben fondato a riguardare il cervello come un feltro puramente passivo del fluido de' nervi, e de' muscoli. In tali supposizioni, io non poteva più trovare unione tra la contrazione costante de' muscoli, ed una causa qualunque stabilita nella sostanza del cervello; poichè, se tal causa è irritante, non ha effetto sopra un viscere, che manca di senso; se è un semplice ostacolo al corso del fluido nervoso, la contrazione de' muscoli si troverà indebolita, o annientata, in vece d' essere portata all' eccesso del *Tetanos*.

Avevamo compreso, mediante le osservazioni, che un tendine, un nervo scoperto, ed irritatissimo, cagionano convulsioni, e convulsioni costanti, che sono li *Tetanos*, e le sue differenti specie. Ma questi fatti ci confermavano nella idea, in cui eravamo, che la sede della causa di tali malattie, esser dovesse un organo sensitivissimo. I nervi a mio credere, ricevono la loro solidità, e per conseguenza un de' principj della loro sensitività, dalle membrane del cervello. Il perchè doveasi naturalmente conchiudere, che il *Tetanos* da causa interna, il quale riconoscesse la sua sede nell' unione di questi nervi, o nel principio del senso, avrebbe per conseguenza la sua causa nelle membrane del cervello.

Per quanto si voglia conseguente; e probabile questa teoria, li
Suppl. Part. II. C cui

cui principj ci sembrano sodamente stabiliti nella nostra Fisiologia, può ancor riguardarsi come una semplice conghiettura, sopra tutto da quelli, che danno sensazione al cervello, e che sono tentati a negarlo a queste membrane. Perciò, affine di farla passare dallo stato di semplice conghiettura a quello di dogma, conveniva verificarla, per mezzo di fatti, e di osservazioni, e abbiamo avuta la sorte di farlo in un modo fortunatissimo, e convincentissimo.

Primieramente dall' apertura de' cadaveri delli due ultimi ammalati del nostro Spedale assaliti dal *Tetanos* da causa interna, non s' è trovato alcun altro disordine, se non che, una infiammazione universale della pia madre, ed una leggiera suppurazione in tutta la sua estensione. Nulla nel cervello, che non fosse sano. Queste due sole osservazioni provano assai dimostrativamente, che la causa del *Tetanos* consiste in questa infiammazione della pia madre. Nuladimeno sarebbesi ancor potuto in qualche modo allegare, che questa infiammazione non fosse probabilmente altro, che l' effetto del *Tetanos* stesso, o del vizio del cervello, che l' avesse prodotto; ma la terza osservazione seguente, mi par, che decida affatto la questione.

Li 12. Gennaio 1752. Pietro Perchepiè d' età d' anni 66. operario del luogo de' convalescenti, dove si fabbrica il nostro nuovo Spedale, ricevette sul capo il colpo d' un puntello d' un peso considerabile, dal quale ne restò atterrato, ed immobile, e privo di cognizione. Ricondotto all' uso de' sensi, ritornò a casa sua, e passò la notte assai bene. La mattina dopo, tornò al suo lavoro, e fece al solito la sua giornata. Prima prova, che la sostanza del cervello non era stata, nè compressa, nè alterata da questo colpo, e che la perdita di cognizione era stata l' effetto della scossa violenta, e della irritazion momentanea delle membrane del cervello, la quale percussion dolorosa avea soppresso per certo tempo in queste membrane il concortò delle sensazioni, delle quali esse sono la sede, e perciò avea sospesi i moti consecutivi dell' anima, e degli spiriti negli organi del moto, come presso a poco accader suole, quando dopo uno storcimento mediocre della nocciola del piede, o un colpo assai doloroso alla rotola, stiano alcuni momenti senza poter far uso della gamba.

Perchepiè dopo la sua giornata tornò a casa sua, ma non ebbe appetito cenando, e la notte fu sorpreso dal delirio. Fu condotto al nostro Spedale li 19. Gennaio, terzo giorno del suo infortunio. Gli fu fatta un' abbondante emissione di sangue. Avea una forte ammaccatura, ed un tumor molle negl' integumenti del parietale sinistro. Aperi questo tumore, gliene levai gli angoli, e posi allo scoperto l' osso di questa regione, nel quale non trovai alcuna frattura.

Il delirio, e le agitazioni continuarono, e vi si aggiunse un *Tetanos* universale, il quale faceva, che quando si alzava il capo al
ferito

ferito per medicarlo, si alzasse anche tutto il suo corpo, che era interizzato, come quello d' un cadavere. Fu trapanato, ma non si trovò spargimento di fluido. Morì li 17. Gennajo, 15. giorno dell' accidente. e secondo, dopo l' operazione. Fu aperto; nè si trovò nè sopra, nè sotto alle membrane del cervello veruna lesione. La dura madre avea sotto il colpo una disposizione suppuratoria, e pareva ammaccata. La pia madre conteneva un letto leggiero di marcia in tutta la sua estensione, e ne trovammo circa uno, o due cucchiari tanto ne' ventricoli, quanto sotto la base del cervello. Questo viscere, per altro, era sanissimo in tutta la sua tessitura interna, di modo, che apparve ad evidenza, che tutti questi accidenti, è segnatamente il *Tetanos*, come pure la di lui morte, fossero conseguenze della infiammazione suppuratoria della pia madre, e di tutte le sue pertinenze, come il plesso coroidèo &c. derivati dalla percossa, e dall' ammaccatura.

Questa osservazione conferma dunque in modo autentico la nostra opinione sulla sensitività, e gli usi di queste madri membrane. Si vede cogli stessi occhi, che la privazione di cognizione di Perchepiè venne dalla stupidità, impotenza, o inazione di queste membrane. Che il delirio, o il disordine di sua ragione, è stato l' effetto della loro infiammazione, o della loro tensiva contrazione, e non di quelle malattie locate nel cervello; e che perciò il loro stato legittimo, è una disposizione capitale alla costituzione d' un uom ragionevole, e che per conseguenza elleno fanno quel, che chiamasi la sede dell' anima (1).

Li nervi entrando negli organi del senso, e del moto, si spogliano della loro prima tonaca fatta dalla dura madre; non resta più al nervo, che la pia madre, e questa fa per una parte le tele, e i fiocchetti nervosi, organi immediati delle sensazioni; e dall' altra le fibre motrici, ch' entrano nella composizione de' muscoli. L' infiammazione di questa membrana, dà a tutto il sistema, che da lei formasi una rigidità convulsiva, che tien tese le pareti de' suoi canali, e la loro cavità aperta del continuo agli spiriti verso questi organi, e le comunica nello stesso tempo una irritazione dolorosa, che vi chiama anche del continuo questi spiriti, e li mette in un orgasmo perpetuo, nel mentre, che questo stato medesimo produce in queste tonache una indocilità decisa agl' ordini della volontà. La contrazione convulsiva, e costante di tutti i muscoli, è adunque una conseguenza necessaria di questa infiammazione della pia madre, e della loro origine da questa tonaca.

Oltre la teoria del *Tetanos*, che ricaviamo dalla nostra osservazione, questa ce ne somministra ancora un' altra importante per la pratica chirurgica, la quale in altro non consiste, che ne' segni par-

C 2

ti-

(1) Questa proposizione, è provata ampiamente nella mia Fisiologia.

ticolari alla infiammazione della pia madre, e alla lesione della dura madre, mercè cui, viene l'una distinta dall'altra. E' un raziocinio questo, il quale convien vedere nell'opera istessa.

Il Signor Haller crede distruggere tali prove, allegando, *che lo spasmo può avere delle ragioni, che sono assolutamente inaccessibili a' nostri sensi.*

Queste inaccessibili ragioni, lungi dal far tener per incerte quelle, che sono sensitive, ed evidenti, devono anzi renderle più preziose, più stimabili, e più conchiudenti. Non pretendo, che la infiammazione della pia madre, sia la causa unica del *Tetanos*, ma il numero, e la uniformità delle mie osservazioni, provano incontrastabilmente, che ella, ne è una causa. Ciò mi basta.

Questa storia di Percuپی (proseguisce il Signor Haller) non dovrebbe allegarsi contro di me. Quest' uomo avea del marciume ne' ventricoli, e sotto la base del cervello. Ed eccovi più, che non bisogna per far nascere il delirio.

Rispondesi. I. Non si tratta quì di delirio, ma di *Tetanos*, che la marcia ne' ventricoli, o sotto la base del cervello non produce.

II. Abbiamo molte osservazioni che provano, che la marcia, che de' corpi stranieri stessi, profondati, e nella propria sostanza del cervello trattenuti, non v'hanno cagionato, nè delirio, nè *Tetanos*. Perciò tali accidenti non deggiono attribuirsi all'azione di questa marcia sul cervello, ma all' infiammazione della pia madre, che cuopre i ventricoli, mediante il plesso coroidèo, e che parimente cuopre la base del cervello. Per questo la marcia, che ho trovata in queste due regioni della pia madre, sempre più comprova l' infiammazion generale di questa membrana, e le conseguenze da me dedotte.

Per confutarmi (aggiunge il Signor Haller), conveniva al Signor le Cat servirsi d'esperienze pari alle mie, di dure, e pie madri irritate, per mezzo delle quali fossero sopraggiunte convulsioni.

In primo luogo la mia memoria sopra la sensitività della dura e pia madre, era un seguito necessario di quella sul moto muscolare premiata a Berlino, e non si è mai trattato di confutare il Signor Haller, ma di stabilire in essa un' opinione, ch'entrava in qualche modo nella citata memoria. Ma mi pare, che a questo Uomo dotto, non si renda agevole di liberarsi da' suoi pregiudizj.

II. Non veggio, qual necessità fiavi, che la dura madre irritata abbia a dar convulsioni, perchè la sua sensitività sia costante. Non di meno nell'opera, che preparo, resterà appagato; poichè troverà in alcune osservazioni, che il dolore eccitato su la dura madre, è arrivato realmente al segno di produrre de' moti convulsivi. Confesserò anche d'averne trovato delle insensitive. Riguardo a ciò, non posso ripetergli, se non quello, che ho avuto l'onor di dirgli nella mia lettera delli 24. Ottobre 1755. „ Non sò ancora, se non „ quel

„ quel che io sapeva già per le vostre sperienze, e le mie, cioè che
 „ vi sono de' casi, ne' quali la dura, e pia madre &c. hanno qual-
 „ che cosa del genere della sensitività, che si prova alla pelle, ai
 „ muscoli, ai nervi, ed altri casi, ne' quali queste parti non ne han-
 „ no. Il primo mio oggetto mi par attualmente, che sia di deter-
 „ minar questi casi, le cause di questa alternativa, e d' analizzarne
 „ le sperienze medesime, che sono, bene spesso, più delusorie de' prin-
 „ cipj. Esaminarò poscia, se ogni genere di parti sensitive, ha il suo
 „ dolore, o la sua particolare sensitività. Se quella, che risentesi
 „ nella pelle, ne' muscoli &c. sia assolutamente comune a tutte le
 „ parti viventi, sensitive, e se fosse possibile, che una parte, che
 „ non è, nè pelle, nè muscoli &c. mancasse di questa sensitività co-
 „ mune, di quel vivo dolore, che cagiona un' ago penetrato nella
 „ pelle, senza cessar di aver quella, che le è propria, e che forse
 „ è più difficile da distinguersi. Per esempio la marcia, la sanie,
 „ che soggiorna sulla pelle, la sfiora, e vi cagiona pruriti vivi, e
 „ insopportabili. Laddove sulla dura madre d' *Antonio Mabire* non
 „ produssero, che un leggiero dolor di capo.

Aggiungiamo a ciò le cause generali dell' insensività acciden-
 tale, alle quali la dura, e pia madre possono essere sottoposte, co-
 me l' altre parti sensitive, quali sono le convulsioni, e le altera-
 zioni, le disposizioni all' ossificazione, ed altre simili, capaci di to-
 gliere il senso.

Certi animali giovani, e sani non hanno la dura madre quasi cartilaginosa, o quasi ossea, dice di più il Signor Haller. Nò, ma questa membrana è ammaccata, o stupefatta dalle operazioni, che l' hanno scoperta; o l' irritazione, che vi si è fatta, non vi avrà prodotto, che una sensazione d' emicrania, che non dee far gridar gli animali più degli uomini, ed anche meno eccitar in essi le convulsioni. Finalmente un animale, può sentire un vivo dolore, e non ne dare alcun segno, mercè che è preso da paura, e distratto da un senso ancor più vivo di quello, che forma l' oggetto della speranza, nel mentre, che darà li contrassegni della maggior sensazione, allorchè gli verranno toccate delle parti insensitive. Ciò vedremo all' Articolo IV.

Lo stesso Mons. Clavier Chirurgo di Neubourg, che ha testifi-
 cata la sensitività della dura madre, essendo stato obbligato ad aprir
 questa per un decubito formatovisi sotto, provò ancora, che la pia
 madre, ch' ella cuopriva, avea della sensitività, e l' afferma nello
 stesso processo verbale, che ho citato.

Li 21. Giugno 1756. Mons. Echevin mio allievo, e Chirurgo
 dell' Ospital generale di questa Città, trovò la pia madre d' un
 cane sensitivissima alla punta d' una lancetta; almeno l' animale
 fece de' gran movimenti nel mentre, che si faceva adoperar questa
 punta sopra la pia madre. Non riferisco qui questa esperienza, che
 per opporla a quelle dello stesso genere, che citansi contro la nostra
 opi-

opinione, mentrè noi non facciamo gran conto delle osservazioni di questa specie, fatte su gli animali.

ARTICOLO III.

Sensività delle membrane, legamenti, tendini &c.

MI pare, che se la dura, e pia madre hanno vinta la loro causa, li periosti, le altre membrane, i tendini, i legamenti &c. non possono perderla.

Tutti i pratici conoscono, quanto basta, gli accidenti della lesione del pericranio, la necessità di stagliarlo, ed allentarlo per far cessare tali accidenti, il dolor vivo, che provano li feriti, ai quali s' applicano rimedii spiritosi su questa membrana; non di meno, ec-covi osservazioni, che li fortificaranno nella loro opinione.

Maria Margheritta l' Etouvè d' età d' anni 18., nata a Bremon-tier en Bray, abitante a S. Giacomo presso Darnetal, venne all' Hôtel-Dieu in Novembre 1753. per cagione d' una soppressione delle sue regole. Ella v' ebbe nel seguente inverno il vajolo, all' uscìr del quale, fu assalita da una risipola sul volto, e per tutto il capo; quest' ultima malattia fu seguita da due tumori indolenti nella parte posteriore della sommità della testa. Essi non terminarono in ascesso, che alla fine di Maggio 1754.

Se n' aprì uno li 5, e l' altro alli 8. Il cranio non era scoperto. Il fondo dell' ascesso era una membrana bianca, che doveva essere o il pericranio, o la cuffia aponeurotica. La grossezza de' tegumenti aperti potea far sospettare, che la cuffia aponeurotica fosse compresa nell' incisione, ma tegumenti ascessati possono gonfiarsi.

Quel ch' è certo si è, che dalla sola situazione degli ascessi, si può asserire, che ivi non era alcuna parte muscolosa. Ora subito, che fu fatta l' apertura, posì l' estremità del dito sulla parte bianca, che ne faceva il fondo, e l' inferma gridò fortemente. Ripetei questo toccamento, e chiesi all' ammalata, se veramente sentisse il mio dito, ed ella mi rispose con espressioni di malissimo umore, che senza alcun dubbio, io l' offendevo.

Allorchè si aperse il secondo tumore, feci la stessa speriienza, con ugual successo. Nello stesso tempo ritoccai il fondo della prima apertura, il quale era coperto di papille carnose, e lo feci colla punta del dito, senza che l' unghia avesse alcuna parte in questo toccamento, e non ostante l' inferma si lamentò egualmente, e diede le medesime risposte, che s' ebbero nella prima speriienza.

Li 10. Giugno al levarsi dell' apparecchio dell' ultima apertura, toccai parimente il fondo di queste due ulceri, sull' ultimo delle quali compariva appena una prima ombra di color di carne. L' ammalata risentì un vivissimo dolore. La prima apertura era pie-na

na di carne un po' floscia, e perciò il dolore era molto più soffribile, secondo le spiegazioni distintissime, che ce ne diede la medesima.

Tutte queste sperienze si fecero alla presenza di tutti i Chirurghi dell' Hôtel-Dieu, e de' Signori Shalmers, e Fenovick, il primo Scozzese, il secondo Inglese, ambedue miei pensionarij.

Monf. le Blanc Chirurgo d' Orleans, mi fa sapere con una lettera delli 8. Dicembre 1752. d' aver molte volte fatta l' operazione del trapano a soggetti, che aveano l' uso di tutta la lor ragione, e che ha sempre veduto, che lo staccamento del pericranio, che si fa precedere all' applicazione delle corone, ha fatto de' gran dolori a soggetti, alli quali si distaccava. Aggiunge, che si legge nel Dizionario di James al Tom. 2. coll. 1538., che non si può levar il pericranio, allorchè è ben attaccato *senza causar un dolore estremamente vivo, purchè l' ammalato non sia affatto insensitivo, e letargico.*

Il dì 29. Gennajo 1756. la Roze Dragone del Regimento della Regina, Compagnia della Porta, ricevette una ferita nella parte superiore della fronte, che gli denudò il pericranio alla estensione di 3, o 4. traversi di dita. Se le punse questa membrana in più parti con un ago. Ritiravasi ad ogni puntura, e si doleva distintamente, che se gli facesse del male.

In una delle nostre sperienze delli 16. Giugno 1755. sopra un cane più vecchio, che giovine, si posè dell' olio di vitriolo sul suo pericranio; l' animale cacciò delle orribili grida. Tutto il suo corpo fu agitato da convulsioni, in tempo delle quali, rese le sue orine, e gl' escrementi &c.

In quelle delli 21. Giugno dello stesso anno, un cane a cui fu punto il pericranio con una lancetta, parve sentirla benissimo; ma lo spirito di vino, e specialmente l' olio di vitriolo, lo fecero gridare orribilmente.

Li 12. Settembre 1753. avendo scoperto il pericranio ad un cane forte, fu toccato collo spirito di vitriolo. L' animale non cessò di dibattersi.

La riputazione della sensitività de' periofti, non è stabilita men sodamente, e sulle stesse prove.

„ Se si considera attentamente dice Monf. du Verney nel suo trattato delle malattie dell' ossa, alla situazione del perioftio, ed alla „ connessione, ch' egli ha colle parti vicine, facilmente si conosce, „ che tra tutte le membrane del corpo, è quella, il senso della quale dee essere più vivo. Il che, è anche una conseguenza della sua „ struttura.

„ In generale aggiunge egli, tutte le membrane del corpo hanno „ un squisitissimo senso, ma fra tutte le membrane, non v'è alcuna „ d' esse, che abbia una sensazione così squisita, quanto il perioftio, e „ li cui dolori sieno sì crudeli.

A que-

A questa grande sensitività del perioftio, tutti li pratici attribuiscono il gran dolore cagionato dalla formazione delle esoftosi; ed a qual altra proprietà potrebbe attribuirli?

Nel primo Settembre 1756. toccai colla sonda una carne rigenerata con porzioni di perioftio sul peronè di Mons. le Pelletier Ufficiale de' Dragoni della Regina, dalla quale avevamo cavata una esfoliazione alcuni giorni avanti. Questa sonda cagionò dolori assai vivi al ferito.

Li 3. Settembre, si replicò la stessa esperienza. Allorchè io toccava leggermente, non sentiva nulla, quando appoggiava un po' più, veniva il sangue, e sentiva vivamente. Questa è bene una sensitività rimarchevole per un perioftio nella formazion sua; quando però così chiamare si possano carni di fresco rinnovate sopra dell' ossa, che si sono sfogliate. Ed aveva anche applicato il di avanti sù queste carni un po' di fondo dell' estratto di Saturno.

Li 4. e 5. Settembre dalla stessa esperienza s' ebbe il medesimo risultato.

Nelle nostre sperienze sugli animali delli 15. Giugno 1755. avendo messo dell' olio di vitriolo sul perioftio della gamba d' un cane, l' animale diede prove di sensitività tanto grandi, quanto quelle, che avevano accompagnata l' apertura, e la dissezione de' tegumenti.

Li 20. dello stesso mese, un cane giovane di 4. mesi sul perioftio del quale si applicò dello spirito di vitriolo, fece gran gridi, e degli sforzi per fuggirsene.

La membrana congiuntiva dell' occhio, la cornea trasparente, e generalmente tutte le membrane di questa parte, hanno una grandissima sensitività ben dimostrata dalli dolori crudeli, che cagiona il menomo corpo straniero introdotto in quest' organo. Esse sono membrane. Non hanno niente di muscoloso. E la loro origine dal pericranio, dalla dura, e pia madre provata abbastanza, riduce queste osservazioni ad una prova generale della sensitività di tutte le membrane.

Li 21. Aprile 1755. levai ad una fanciulla inferma nel nostro Spedale una porzione della congiuntiva dell' occhio sinistro, preso la palpebra inferiore, e un'altra porzione di questa membrana verso la palpebra superiore; essendo l' una, e l' altra porzione degenerata in escrescenza. L' inferma provò dolori sì acerbi, ch' ella cadde in sincope dopo l' operazione.

In tutte le depressioni della cateratta, che ho fatte, ho avuto delle prove non equivoche, che le membrane dell' occhio, che si forano con l' ago sono sensitive; la congiuntiva tra l' altre, lo è a segno tale, che se non si fora prontissimamente, vi sfugge al primo sentir ch' ella fa la punta dell' ago, e si mette il globo in tale agitazione, che non solo ritarda l' operazione, ma leva alle parti il picciol momento di riposo, che è necessario per lo passaggio dell' ago.

Chi

Chi non sà li dolori insopportabili, che cagiona la più menoma scaglietta d' acciaio locata sulla cornea trasparente, e un poco di polve entrata sotto la congiuntiva?

Se dalle membrane della testa passiamo a quelle del petto, che dolor soffocante non cagionerà l' infiammazione della pleura? qual convulsione non eccita una semplice goccia d' acqua introdotta sulla membrana interna della trachea arteria? Le malattie più crudeli, e le più sollecite mortali, che abbiamo avute nell' anno 1752. e 1753., erano infiammazioni suppuratorie del pericardio, e della tonaca esteriore del cuore, che n' è una produzione.

Quanti cadaveri ho aperti, ne' quali non ho trovata altra causa di morte, che una suppurazione di tutta la pleura! Ho fatto 20. volte la stessa osservazione per rapporto al peritonèo.

(1) Qual' è il Medico, il Chirurgo, che dubitasse, prima dell' Illustre Signor Haller, delli dolori violenti, ed accidenti terribili consecutivi alle punture dei tendini!

Pietro Marchetti nelle sue osservazioni Medico-Chirurgiche, ne riferisce una della puntura d' un tendine seguita da convulsioni, e dalla morte (2).

Monti. le Dran nelle sue osservazioni (3), fa vedere quanto giustamente temer si debbono le ferite delle parti tendinose, aponevrotiche &c. A questi Autori ne potremmo di molti altri unire, e tutti rispettabili, ma io mi restringerò ai fatti, e sopra tutto alli più recenti.

Le osservazioni, e ricerche di Medicina d' una Società di Medici di Londra stampate nuovamente in ottavo in essa Città, riferiscono nel Tom. I. art. 4. l' osservazione d' una contrazione spasmodica della mascella inferiore d' una donna, cagionata dalla lacerazione del tendine d' uno de' suoi diti.

Io stesso sono stato testimonia d' alcuni malagevoli accidenti, che sono accaduti in conseguenza delle punture dei tendini.

Nel 1737. una vecchia, donna di governo di Madama la Presidente di Bermonville, nella strada della pica a Rouen passando la mano sul tapeto d' una tavola per pulirlo, s' incontrò in un ago, che le entrò nella mano, e le punse il tendine flessore del pollice. Le sopravvenne una gonfiezza estrema, non solo in tutta la mano, ma nel braccio ancora, all' ascella, alla parte medesima del petto, con gran febbre, delirio &c.

Non ostante tutte le cavate di sangue, e tutti i rimedj indicati in simil caso, tutte queste parti si alcessarono, l' inferma si ridusse agli estremi, s' aprirono i passaggi interrotti di tutti i tendini alcessati, così pure i legamenti trasversali della giuntura della

Suppl. Part. II.

D

la

(1) *Sensitivité de' tendini.* (2) *Bibliot. di Montp. Tom. 4. p. 345.*

(3) *Tom. I. p. 370. tom. 2. p. p. 352. 357.*

la mano col braccio, la regione del muscolo quadrato, prohatore, il braccio &c.

Quantunque questa donna guarisse da sì terribili accidenti, il suo temperamento, che prima di tal puntura era de' più robusti, si perversò affatto, il suo corpo divenne per un' anno intero un fenumenajo d' ascessi, i quali l' uno all' altro in diverse parti sopravvenendo, condussero finalmente la miserabil paziente alla morte.

Quanti accidenti di ugual natura, non ho io veduti, oppure, che s' accostavano a questi, dopo le punture di spine, che avevano feriti, o li tendini delle dita, o le aponevrosi palmari? Ne ho veduti ancor de' mortali dopo cavate di sangue, che avevano punta l' aponevrosi del bicipite. Si dirà per questo, che la ferita della pelle, che cuopre le articolazioni, i tendini, le aponevrosi, la quale è più sensitiva, del restante de' tegumenti, sia la sola cagione di questi accidenti? Tutti fanno, che la pelle, è una parte, che si taglia con tale indennità, che i cerretani fanno su d' essa le sperienze pubbliche, pel mezzo delle quali spacciano le virtù prodigiose de' loro balsami. Non v' è dunque apparenza, che un' organo si sofferente sia il principio di così stravaganti disordini, quand' anche s' accordasse ad esso una maggiore sensitività nelle parti citate. Dico di più, questa proprietà, che se gli accorda, si oppone ad evidenza contro il nuovo sistema. Imperocchè, in qual maniera tegumenti, che cuoprivano parti insensitive, potrebbero avere una sensitività superiore a tutti gli altri? Se hanno questa eminente sensitività, da chi la ricevono eglino, se non se, dalle parti, che cuoprono, le quali per conseguenza aver deggiono questa sensitività superiore, prima di a loro comunicarla.

Li 28. Maggio 1755. Vincenzo Lequet d' età d' anni 10. della Parrocchia di S. Maclou, venne al nostro Spedale, avendo la pelle del dito indice della mano destra portata via interamente sulla parte esterna della prima falange, e conseguentemente il tendine estensore, e i legamenti, che lo rivestono totalmente scoperti.

Posi l' unghia del mio dito indice su queste parti, scotendole un poco, e chiesi a Vincenzo, se così sentisse quel, che io gli faceva, egli mi rispose di sì, e che ti faccio io adunque? Voi mi tirate questa parte rispos' egli.

Applicai la punta delle forbici alla parte dell' unghia, senza farli alcun moto, ebbene senti questa gli dissi? ed egli rispose, ch' io gli faceva male.

E siccome quei, che lo tenevano gl' impedivano, che non vedesse la parte ferita, e che la sua vista portar non potesse, se non, che sulla sommità delle mani, che lo toccavano, quindi si posero le mani, come se si adoperasse su queste parti senza farlo, e se gli domandò quel che sentiva, per vedere se l' immaginazione fosse mai concorsa alle sue prime risposte, ed egli disse, che non sentiva cosa alcuna.

Quarantott' ore dopo, li 30. Maggio; ripetei questa medesima esperienza, toccando il tendine con uno stiletto spuntato. Vincenzo si lamentò del dolore, che io gli faceva. Affettai di sostenergli, ch' esso mentiva, o che s' ingannava, e ripetei molte volte li miei toccamenti, egli continuò a dolersi ad ogni esperienza, e ad assicurarmi, ch' io lo faceva grandemente patire.

Due giorni dopo (primo Giugno) feci la esperienza con un ago. Al primo toccarlo non sentì nulla, ma avendo locato il mio ago alcune linee lontano, l' ago penetrò avanti; egli si dolse acutamente, e ne uscì un po' di sangue. Credo, che la insensitività del primo toccamento provenisse dall' essere allora mortificato il tendine ch' io toccava, mentre alcuni giorni dopo, questa porzione si separò, e la parte sensitiva, che tramandò sangue, era il periosio. Le due falangi seguenti, ch' erano infrantumate, essendosi imputridite, caddero li 3. Giugno, e nel 4. il rimanente del tendine della prima falange cominciava a cuoprirsi di carni vermiglie.

Li 27. Maggio 1756. la Riviere Granatiere di Francia della Compagnia di Groand, giunse al nostro Hôtel-Dieu con il tendine principale anteriore, o interno dell' estensore del pollice tagliato da un colpo di sciabla. Mons. Ferrandy meritevole dal magistero, che lo ricevè, e medicò, gli prese l' estremità tagliate di questo tendine con tanaglie, e avendole prima stese con le medesime, poscia le punse con un ago. In tutte queste prove, il Granatiere assicurò, che sentiva quel che se gli faceva, e che la puntura dell' ago, gli cagionava dolore. La mattina dopo, fec' io le stesse esperienze alla presenza di tutti i Chirurghi dell' Hôtel-Dieu. Il Granatiere, ci assicurò dell' istessa sensitività, ma ella era mediocre nel mezzo esteriore del tendine scoperto, mentre scorgevasi essere più forte nella sua parte laterale, che ricoperta veniva dalle parti vicine, allorchè s' univano. Ripetei le stesse esperienze il giorno dopo 29. Maggio, e n' ebbi lo stesso risultato.

Le semplici ammaccature, e le distensioni dell' articolazione, ove non sono che legamenti, e tendini, non hanno anch' esse delle conseguenze acerbissime? Abbiain veduta la febbre, e il delirio suscitarsi ne' dolori vivi cagionati dalle lussazioni, più che complete, che aveano rotti i legamenti articolari, ed anche i tendini stessi su queste articolazioni. Da quai dolori pure non sono seguiti semplici stordimenti, ne' quali non v' ha interesse alcuna parte muscolosa? Ho veduto un uom vigoroso restar compreso da un sì forte dolore per una caduta, nella quale uno de' suoi ginocchi avea urtato contro l' angolo d' un pavimento, ch' egli ne stette assai male.

Li 25. Aprile 1755. Mons. Charpentier antica guardia del Rè, e Cittadino di Rouën nella strada Belvicina, cadde da cavallo a Tôte sulla strada di Dieppe. Il suo ginocchio destro fermò la caduta sopra de' sassi, e benchè fosse cogli stivali molli, risentì nondimeno a questa parte un dolor sì violento, che durò per lo meno 30. minuti.

nuti. Nel corso di 15. giorni, questa estremità restò attaccata non solo da un dolore, ma da una piaga della grandezza dell' unghia del pollice sulla faccia esterna inferior della rotola. Passati detti quindici giorni, quantunque il dolore minorasse, non andò guarì però, che tornò ad inasprirsi. Fu accompagnato da pungimenti, e stupidità nella gamba. L' esaminai li 9. Giugno, cioè sei settimane dopo la caduta, e trovai realmente verso la punta inferiore della faccia esterna della rotola, una piccola incavatura, come fosse d' una piaga fatta nel legamento apponevrotico, da cui vien rivestita questa superficie, la qual piaga lasciava a scoperto sotto gl' integumenti l' osso, che sentivasi a traverso di detti integumenti. All' orlo inferiore di questo piccol spazio, sentii un pezzetto molle, e che moveasi da un lato all' altro, che pareva una piccola escrescenza rigenerata dall' orlo inferiore di questa apponevrofi, su la quale piccola escrescenza non poteasi appoggiare, senza che vi si eccitasse un vivo dolore. Allorchè Monf. Charpentier teneva dritta la gamba, non sentivasi alcun male, ma quando che la piegava, i dolori ricominciavano. E' chiaro ad evidenza, che questa ferita consisteva nella rottura d' una porzione del legamento capsulare della rotola, e che tutti questi dolori sono una pruova della sensitività di questo genere di parti.

Tale osservazione mi rammenta più rotture del tendine d' achille, che ho medicate, e che sono sempre state accompagnate dal dolore.

(1) Un Macellajo a me cognito, fu colpito violentemente nel ginocchio dalla forza elastica d' un grosso ramo d' arbore. Tutta la estremità gonfiossi, gli sopraggiunse la cancrena, e ne morì il ferito.

Heister dice nelle sue istituzioni chirurgiche (2) *Quoties ossium junctura collisa sunt, insignes plerumque dolores, atque inflammationes, convulsiones item, atque gangrena, & sphacellus &c. moriuntur.*

Pietro Prevôt legnaiuolo d' età di 41. anni, del paese di Fontaines sotto Preaux, entrò nell' Hôtel-Dieu di Roien verso la fine di Giugno, per motivo d' una ferita longitudinale di circa 3. dita di lunghezza, situata all' articolazione del ginocchio superiormente, e un poco internamente, cioè al di sopra, e nell' interno della rotola. Questo ferito era da principio stato medicato con pezze di tela bagnata nell' acqua vita, e fortemente frettò, e turato. Gli levammo tale apparecchio, e trovammo una piaga assai brutta, ed asciutta, per cui agiungemmo a' digestivi ordinarj il cataplasma ammolliente, e risolutivo sopra li piumacciuoli.

Non diminuendosi la gonfiezza della coscia, posi in libertà la piaga, massime verso la sommità, ed avendo scoperta fluttuazione fu-

(1) Nel 1741. (2) Part. I. l. 1. cap. 15. art. 6.

superiormente, estesi ancor più le mie incisioni, e ne trassi con ciò una gran quantità di fetido marciume. Feci delle contrapperture, de' condotti, ma non ostante le nostre precauzioni, l' ammalato morì alcuni giorni dopo.

(1) Pietro Arcard, garzone di Falegname d'età d'anni 20. della Parrocchia del Minerolo, venne al nostro Hôtel-Dieu per un colpo d'ascia, che s'era dato nel ginocchio sinistro, sul condilo interno del femore, ch'era scoperto quanto richiedevasi, perchè si potesse toccarlo col dito. Tutta questa estremità, e in particolare la coscia era gonfiata, ed orribilmente tesa. Io l'allargai, ma con tutta cautela, a cagione della morte accaduta nella persona, che l'anno scorso ebbe un simigliante accidente. Questo visse un po' più, ma egli morì nondimeno li 25. Giugno 1742.

Niccola l'Archeveque parente del fu Medico di tal cognome, d'età d'anni 32 della Parrocchia di S. Aignan, si diede un colpo di falce sù la rotola, ed un poco sul tendine degli estensori dalla parte sinistra. Questo accidente gli avvenne li 2. Maggio 1724. Recolsi al nostro Spedale li 3. Non v'era parte alcuna muscolosa interessata in tal ferita; nulladimeno fu seguita da gran dolori. Passarono tre giorni senza accidenti rimarcabili, ma dopo tal tempo, tutta questa estremità s'enfiò, e si formarono degli ascessi intorno alla rotola. Prima sotto la pelle in tutta la estensione de' muscoli della coscia, e poscia sotto i muscoli vasti. Indi la suppurazione s'impadronì della gamba, di modo, che l'estremità intera divenne tutta un ascesso. Se ne apersero i principali, tolto ch'essi comparvero, ma la suppurazione si fece con tale estensione, e si generalmente, che superò li soccorsi dell'arte, ed il soggetto morì.

Verso il finir di Novembre 1753. Mons. Val Bottajo nella Parrocchia di S. Maclou, entrò nel nostro Spedale per cagion di una Lupa della grossezza del pugno d'un fanciullo, che avea sopra la rotola. L'estirpai. Perciò dopo fatta un'incisione circolare a' tegumenti, superai col ferro l'aderenza di questa lupa alla rotola, e siccome questa aderenza era intimissima, e che io non voleva aprir il sacco della lupa, la dissezione si fece sopra l'apponevrofi, dalle quali è vestita la rotola, e fu assai lunga. Sorpreso dallo scorgere, che l'ammalato non gettava alcun grido, nè proferiva parola nel farle questa separazione col ferro, gli chiesi, se sentisse quel ch'io gli faceva; se lo sento, esclamò, lo sento per modo, che sono in procinto di stare assai male, ma non dico alcuna cosa, giacchè le grida non sono in acconcio per guarire, ed ho presa la mia risoluzione di sofferir con pazienza. L'interrogai fatta l'operazione intorno la diversità del dolore provato nella incisione de' tegumenti, e il dolore prodotto dalla dissezione fatta sopra le apponevrofi: mi disse, che la incisione della

(1) Nel 1742.

della pelle éragli stata più sensitiva; e nondimeno allorchè era io intorno ai periosti, e alle apponevrosi gridò, che il dolore era giunto al segno da non poterlo più tollerare.

Giacomo Carpentier d'anni 32. di Beaumenil presso Vire, Diocesi di Coutance lavorando a Parigi nelle felciate, fu attaccato nel 1752. il mese d'Ottobre da certo male, che dagli idioti viene chiamato una frigidezza, nel ginocchio sinistro. Questa parte s' enfiò, e degenerò in ascesso, talchè convenne aprirla in Gennajo 1753. Si medicò poscia con diversi rimedj, che non ebbero succelso felice.

Venne al nostro Spedale li 20. Marzo 1754. Non vedevasi alla parte, che un piccol buco fistoloso, pel quale spiccava un sottile umore. Tutta l' articolazione pareva nuotare nella materia. Trovai alcune parti vicine, ch' erano inzuppate di linfa. Tutta la estremità enfiatissima. Vi s' applicò il cataplasma maturativo. Lascioffi l' ammalato in riposo. Si preparò con alcuni purganti, poichè era talmente spossato, che non ebbi ardire di fargli cavar sangue, e gli feci l' operazione la Domenica in Albis 21. Aprile.

Trovi la superficie esterna della rotola corrosa. Un ascesso tra la rotola, e l' articolazione nella capsula articolare. Nulla d' alterato in tale articolazione. Della fungosità alla superficie di questa capsula, sopra tutto, verso la metà.

Palsai una larga striscia nel condotto di questo ascesso, e la feci uscire per la parte laterale del basso della coscia. In tutta questa operazione, l' ammalato sentiva dolori grandissimi, allorchè adoperava io sopra le apponevrosi, e sopra i legamenti.

Io lo medicali con le filacciche asciutte. Nel levare l' apparecchio, applicai sopra la lacerazione, e sù le fungosità il cauterio attuale, di cui l' ammalato risentì vivamente l' effetto, e per conseguenza ci diede una nuova prova della sensitività del periostio, de' legamenti, e delle apponevrosi.

In tutte queste osservazioni non veggo, che la lesione de' legamenti, e de' tendini. E vi si trova del dolore, e degli accidenti, che i più vivi dolori alla pelle non hanno giammai prodotto.

Li poveri gottofi non sono anch' essi tante voci, che depongono contro la insensitività delle articolazioni, delle membrane, e de' legamenti? La lor sinovia degenerata in nodi incrostati, non è una dimostrazione, che nell' articolazione stessa, ha la sua sede questa dolorosa malattia, e non già nelli tegumenti!

Ho fatta più volte la esperienza della buboncella dilattando l' anello stretto sopra il sacco dell' ernia, e in tutte queste operazioni, io tagliava l' apponevrosi del muscolo obliquo esterno in parte, ed osservava distintamente, che i piani di questo muscolo, sotto de' quali passava la mia tasta scannellata erano puramente apponevrotici. Or mi ricordo benissimo, che ogn' una di queste particolari dilatazioni fatte col ferro, eccitava le grida dell' ammalato, e ch' era

impossibile, ch' egli non patisse notabilmente per cagione di tale incisione.

Chi v' ha, che non sappia gl' accidenti terribili inseparabili dalle ferite di quella parte, che chiamasi il centro nervoso del diaframma, che non è altro, che un tendine, o un' apponevrofi muscolare? Ho veduto in Gennajo 1755. una piastrilla cancerosa in questa parte cagionare i dolori più vivi ne' due lati della cavità del petto, e nel dorso, e recar la morte al malato in meno di 24. ore.

Monf. Delio Professore Medico nell' Università d' Erlang, e delle Accademie de' Curiosi della natura, di quelle di Montpellier, e di Rouën &c. mi fa noto in una lettera delli 10. Dicembre 1754. d' aver veduto un' ulcera sul *fascia lata*, per cui risentivansi i più vivi dolori.

Io stesso adoperando nel nostro Spedale li 9. Aprile 1754. sopra il Signor le Coq d' età d' anni 40. della Parrocchia di Boulleville presso Ponteademer, ch' era travagliato da un vecchio ascesso fistoloso in tutta l' ampiezza del *fascia lata*, dopo aver levati i tegumenti, o sia parete esterna della fistola, applicai il cauterio attuale sopra una grande estensione del fondo calloso, ed assai caldo, che avea per base il *fascia lata*, e la regione del gran Trocantere, ed ebbi contrassegni sicuri, che l' ammalato risentiva molto dolore da questa applicazione del fuoco, non solamente nel punto stesso, ma ancora sei ore dopo la operazione.

ARTICOLO IV.

Insensitività accidentale delle parti antecedenti. Insensitività naturale, e permanente del cervello.

Riferendo qui alcune osservazioni, che provano la sensitività delle parti nelle quali vien contraddetta dal Signor Haller, ragion vuole, ch' io non taccia d' averle io pure trovate più volte insensitive, così nella pratica, come nelle sperienze fatte dopo le sue.

Ma giacchè tali esperienze sono contraddette da altre, nelle quali la sensitività è evidente, quindi è, che le prime divengono testimonj negativi, che non hanno veruna autorità, e non lasciano ai Fisiologi altro imbarazzo, se non se, quello di spiegar tali casi, ne quali delle parti naturalmente sensitive perdono questa proprietà.

In regola di buona, e sana Fisiologia, tutte le nostre parti traggono la loro origine, il loro aumento, ed il loro nutrimento, per fine, la loro vita, dai nervi. Come dunque con tale origine, e tal dipendenza, può una parte divenire insensitiva? Questa metamorfosi non può succedere, che in uno di questi modi: o perchè il solido non contien più il sugo nervoso, del quale gode la sua origine, o perchè, questo v' è per così dire istupidito, condensato, senza azione; o finalmente noi lo giudichiamo insensitivo, perchè *la di lui sen-*

senfazione divien equivoca, o non corrisponde a ciò, che da noi chiamasi dolor nella pelle, ne' muscoli &c.

I.

Un solido non contien sugo nervoso.

PRima, perchè la sua tessitura è sì stretta, che non può ammetterlo. Tali sono le unghie, i capelli, la maggior parte dell'ossa &c.

Non dubito, che non sia questo il caso della maggior parte de' tendini punti, e tagliati senza dolore. Ho osservato perciò, che spetta a questo, che tali tendini aveano principalmente questa insensibilità lungi dal muscolo. E n' ho veduti altri, che insensitivi alle punture, ed alle incisioni, non lo erano alla pressione viva delle tanaglie da taglio. Ciò prova in loro un senso ottuso, che non può attribuirsi, che alla lor tessitura troppo stretta, e troppo accostantesi a quella dell' unghia, e de' capelli.

Così pure dee dirsi di certe dure madri trovate anch' esse insensitive, e come tendenti all' ossificazione.

In secondo luogo, un secondo caso, in cui il solido non contien sugo nervoso, è allora quando soggiace ad una trasformazione per cui egli lascia sfuggir quello, che conteneva il suo principio. Per esempio una branca nervosa, semplice, unica, sensitivissima, perchè contiene sugo nervoso; s' apre, e si spande in una tela d' estrema finezza, e di un' ampiezza ben grande, e così facendo si lascia sfuggire, o non contiene più fluido nervoso; questa branca disse, fin d' allora, che si spande in tela, la quale chiamiamo col nome di tessitura cellulare, manca del senso, di cui era dotato il suo tronco originario. Può vedersi questa formazione della tessitura cellulare in quello della guancia pei filetti della porzion dura, e in quello del petto per quelli dell' intercostale, dell' ottava coppia &c. Ora se una porzion del periostio, del pericranio, della pleura, del peritonèo non trovasi formata, che dall' unione di più foglietti cellulari pigiati gl' uni contro gli altri, come lo insegno nella mia Fisiologia, e destituiti di nervi, i quali certo non è possibile di trovare, infallibilmente queste membrane saranno insensitive. Avranno per lo contrario molta sensitività, se la espansion formatrice non distrugge il filamento nervoso, o se vien composta da più filamenti intrecciati gl' uni con gli altri, o per fine, se le espansioni medesime, che suppongo più fine delle tele de' ragnatelli, sono revivificate pel mezzo de' nervi, lo che succede più d' ordinario. E quindi è, ch' io non posso far altro, che toccar leggermente alcuna cosa sopra questi principj.

I I.

*Il fugo nervoso contenuto in un solido, può rimanervi
senza azione.*

Prima pel difetto del calor naturale necessario a quest' azione. Accade tutto giorno, che le nostre dita perfettamente vitali, divengano insensitive, perocchè il freddo avrà instupiditi i principj della sensazione, e del moto. L' ammaccatura in conseguenza d' un colpo, la perdita di sostanza, e di sangue cagionata da una ferita, la sua divisione, ch' ella produce ne' canali del sangue, e del fluido nervoso, cagionano la stessa stupidità. Ho veduto persone, che dopo aver avuti colpi di sciabla, che aveano loro tagliata una parte, de' tendini del pugno, non sentire non solo le estremità di questi tendini, ch' io le pungeva; ma neppur la pelle della mano, ch' io lor toccava (1).

Per la stessa ragione, supponiamo che ad un animale giovane, la cui dura madre sarà per altro sanissima, e naturalmente sensitivissima, sia stata la trapanazion fatta. Tale operazione ha prodotto una torpidezza, e uno stupore in questa membrana, che toglie ogni azione al fluido, principio della sua sensitività. S' è veduto nelle nostre osservazioni (art. I.), che Mabire, che avea avuto una sensitività sì distinta in questa membrana prima della estrazione de' pezzi intrantumati del suo cranio, non avere più quella sensazione, dopo questa penosa operazione. Un altro stato del fugo nervoso, che gli toglie la sua azione, è quello dello ingorgamento, o della enfiagione della parte, allorchè è tale, che i liquori adunati arrivano a comprimere i solidi, e così vi sommergono, od estinguono per così dire il principio del senso. Per tal causa, ho toccato de' pericranj edematosi senza verun segno di dolore, ho trovato delle ferite con gonfiezza, gli stessi nervi delle quali, erano privi di sensazione.

I I I.

La sensazione è equivoca.

Perchè un più vivo dolore, o un altro dolore diverso da quello, che da noi viene eccitato su la parte sottoposta alla esperienza, impedisce il soggetto di rilevar questa. Una passione violenta, può cagionare la medesima distrazione.

Una gran ferita, che cagiona grandi dolori in tutto un membro

Suppl. Part. II.

E

bro

(1) Ho fatta questa osservazione, tra gli altri, nella persona di Mons. de la Croix Negoziante ad Elbeuf.

bro distrae l' ammalato in maniera, che più non fa l' attenzione , a ciò, che noi gli chiederemmo al toccar d' un pericranio, d' una dura madre, d' un tendine &c.

Nella maggior parte degli esperimenti fatti sopra gli animali, questi sono occupati dal terrore delle violenze, che loro si fanno. Si veggono lasciarsi aprir il ventre, ch' è sensitivissimo, senza smaniarsi, e fare spaventevoli contorsioni, allorchè loro raschiarete una parte, che non ha sensazione. Ne ho veduti lasciarsi fare pacificamente l' incisione cruciale, che praticasi sopra de' tegumenti sensitivissimi, approvata universalmente, e gridare allor quando se li trapanava il cranio, che tutti riconoscono per insensitivo. In oltre, non facevano qualche volta verun moto, quando se gli apriva, o bruciava la dura madre, che tante esperienze fatte sopra soggetti ragionevoli, ci hanno dimostrata sensitiva. In somma, pareva alcune volte, che le operazioni dolorose imponessero silenzio, e che le operazioni indifferenti lasciassero loro la libertà d' agitarsi.

II. Noi cerchiamo nel toccar parti sensitive un dolor simile a quel che proviamo nella escoriazion della pelle; ma cerchiam quello, che non può sempre trovarsi nella natura. Abbiam veduto superiormente, che il dolor naturale alla dura madre, o fors' anche alla pia, è il mal di capo, l' emicrania. Tal sensazione soffresi più agevolmente di quella, che vien prodotta da un irritante sopra un fiocco nervoso. La sua maggior violenza produce non di rado vomiti, ma non mai, ch' io sappia convulsioni, e quelle agitazioni, che vanno unite coi dolori vivi ordinarij. Come adunque voglionfi avere tutti questi segni nelle esperienze fatte sopra la dura madre degli animali? Un uom ragionevole, che non senta, che male alla testa, nel toccare ad esso lui la dura madre, come potrà assicurarvi, che voi gli cagionate dolore?

Quel che ho detto della dura madre, convien applicarlo a tutti gli altri organi. Per esempio lo stomaco ha le sue coliche, e le sue gravetze, che non rassomigliano ai dolori de' fiocchetti nervosi della pelle. Quelle dei reni, e della vescica parimente. Afferisco lo stesso de' polmoni. Tutte queste diversità ricercate a fondo, se procureremo di farlo, daranno come spero molto lume nella soluzione delle difficoltà formate dalle sperienze del Signor Haller contro l' opinione del volgo.

IV.

Il Cervello è insensitivo.

Tutti i Fisici fanno l' esperimento col quale Mons. Mariotte ha mostrato, che la porzion midollosa del nervo ottico non ha sensazione, cioè non riceve l' impression della luce, e lascia per-

perciò una specie di buco, oppure un circolo d' oscurità nell' immagine totale, che s' imprime nell' occhio (1).

M' è accaduto più volte di toglier via delle porzioni assai notabili di cervello nelle ferite della testa, e gli ammalati non se ne son querelati. Molti chirurghi hanno fatta l' istessa operazione, e tutti quelli, che ho consultati, m' hanno certificato d' essersi convinti della insensività de' feriti in questa operazione.

Bonneti nel suo *Sepulcretum* vol. prim. p. 26. ci racconta essersi palsato uno stilo a traverso del cervello di una persona, che avea in esso un ascesso, senza averne il menomo incomodo doloroso.

Li 21. Giugno 1755. un allievo da me impiegato nelli nostri esperimenti, fece questo sopra il cervello d' un cane (2). Egli cacciò lo stile assai oltre nella sua sostanza, avanti, dietro, e sulle parti laterali del medesimo. L' animale ch' avea prorotto in grida, e moti nelle aperture della dura, e pia madre, restossi immobile per tutto il tempo di questo frugamento nel suo cervello.

Evvi nelle memorie dell' Accademia di chirurgia quattro, o cinque osservazioni, nelle quali scorgesi, che alcune palle di fucile sono rimaste degl' anni interi nel cervello, senza cagionarvi del dolore. Si è trovato ancora in questo viscere un pezzo di stilo portato lo spazio d' anni cinque. Una punta di freccia, una scheggia di cranio, un pezzo dell' osso frontale restatovi molti mesi, la metà d' un coltello conservata per otto anni. Una punta di spada portata per tutto il tempo del vivere nel cervello, senza risentirne incomodo alcuno.

Sembra pure, che non si ricerchino esperimenti per restar convinti della insensività della midolla del cervello. La semplice natura di tutte le sensazioni, che consistono in scotimenti, in vibrazioni, nella struttura de' loro organi, che in tutti ha una solidità propria a produrre queste vibrazioni, ci sembra escludere la midolla del cervello dalla classe delle parti sensitive. Non si accorderà fuor di dubbio la sensitività a' nostri liquori; e pure egli è verisimilissimo, che la sostanza midollare sia per così dire il fondaco del fugo nervoso, e che conseguentemente sia il liquore particolare del cervello. La realtà di questa congettura, dimostresi col mezzo dell' analogia. Nella balena il cervello, il cervelletto, e la midolla allungata, sono veramente un liquor trasparente (3), la cui condensazione artificiale forma ciò, che dicesi bianco di balena. Io non penso, che li partigiani più zelanti dell' opinione del Sig. Haller possano sostenere, che un istrumento penetrante profundato in questo liquor tra-

E 2

spa-

(1) Vedi nel mio trattato de' sensi p. p. 386. 390.

(2) Mons. d' Echevin, che è attualmente Chirurgo nel nostro Spedale generale. (3) Storia naturale del Groenland d' Anderson t. 2. p. 120.

sparente v' ecciterà del dolore; dunque, se il cervello della balena è insensitivo, perchè il nostro non lo farà egli? La sua sostanza presso di noi, è una sorta di farina, o di pasta analoga a quella delle sementi. Questa polve stemperata, mediante una linfa sottile, forma quel che chiamasi il sugo nervoso, il sugo nutritivo. Un sugo di tal genere, non può aver senso, e questa proprietà vien riservata agli spiriti subordinati all'anima, e combinati col meccanismo d' un organo solido, ed elastico.

La struttura delli tenuissimi tubuletti escretori, che osservansi nella sostanza midollosa, non è propria ad essa, la riceve da i vasi, che la contengono, e questi finissimi tubuletti sono o prolungamenti dell' estremità arteriose stesse, che portano gli spiriti, e la linfa nella sostanza corticale, e di là nella midollare; ovvero sono produzioni della pia madre, che accompagnano questi vasi. Perocchè non si danno secrezioni senza vasi secretorj, ed escretorj. Gli ultimi appariscono in tutti gl' organi una continuazion de' primi. E s' osservi bene di non confondere il vaso escretorio col liquore ch' egli contiene. Non devesi neppur confondere la midolla del cervello, la polpa dell' interno de' nervi, i materiali del sugo nerveo, colli tubuletti esilissimi, che li conducono.

Questa teoria spiega parimenti le osservazioni, nelle quali le piaghe fatte a questa sostanza midollosa par che abbino eccitati dei dolori. In primo luogo supponendo, che i filamenti, che la pia madre, o le estremità arteriose prestano a questa midolla sieno troppo sottili, e impacciati di troppo in questa sostanza caseosa per produrre gli scotimenti necessarj al meccanismo del dolore, la quantità prodigiosa de' vasi più solidi, che penetrano questa sostanza, vi suppliranno. Secondo. I sintomi più ordinarij, che sonosi riguardati in queste esperienze, come segni de' dolori, sono convulsioni. Ma questo accidente non ha connessione col dolore. Un' esuberante emissione di sangue, cagiona delle sincopi, e delle convulsioni per mezzo della semplice evacuazione del sangue, e della turbazione, che ne nasce nella sua distribuzione.

Parimenti la sola dissipazione degli spiriti colla perdita della sostanza, che li somministra, o il disordine della loro distribuzione, che produce una soluzione formata nelli filamenti, o nel torrente di questo fluido, può anch' essa produrre delle convulsioni, senza che il dolore v' abbia alcuna parte. Per altro, può succedere, e succede indubitabilmente spesso, che uno strumento portato in quest' organo attragga delle porzioni considerabili della pia madre, come la membrana corioide, i suoi plessi &c., e tutte le parti necessarie, ed essenziali alle sensazioni.

ARTICOLO V.

Riflessioni sopra l'irritabilità Halleriana.

DA che deriva, che quando mi si punge la mano, o che mi si tocca con un carbone acceso, la ritiro con tutta fretta, e vien quasi per se medesima? La ragione si è, ch'io provo le impressioni dolorose della puntura, o dell'abbruciamento, e che la mia anima in tal caso non aspetta di riflettere per fare operar subitamente la potenza motrice destinata a sottrar la parte dall'offesa di questo corpo nocevole.

Da che procede altresì, che allora quando io applico questi medesimi oggetti ardenti, o pungenti sulli corni d'una lumaca, o sulla coda d'un verme, questi animali traggono essi stessi a se queste parti? E' ancor senza dubbio, perchè ne sentono le impressioni; poichè non si cade più oggi nella stravaganza di crederle pure macchine.

Allorchè io applico questi medesimi stimoli sul cuore d'un animale vivente, non evvi alcuna difficoltà, e le conseguenze son le medesime. Questo cuore trafitto, si contrae; imperocchè egli sente come la mia mano, o come il verme, le impressioni di questi oggetti; ma s'egli è separato dal corpo dell'animale, e che la mia puntura lo faccia ancor contraersi, s'avrà coraggio a sostenere, che non si ritira più in conseguenza della sua sensitività, ma solo per un nuovo principio, che si chiamerà col nome d'*irritabilità*? Che precipizio di ragionamento! lo stesso effetto, come può prodursi in due momenti, che si toccano fra loro per due diverse cagioni? E che differenza fra queste cagioni! Una è sensitiva evidente, e l'altra inconcepibile, ripugnante alla ragione, contraddittoria all'espressione medesima che la rappresenta.

Ho trovato de' Fisici, che sforzavansi a colorar questo paradosso con alcune speciose spiegazioni.

Nella stessa maniera, dicevan essi, che una ruota, la quale fo girar colla mano, prosegue a volgersi anche allora, ch'io cesso di toccarla; nella guisa stessa le fibre viventi, che si contraevano sotto lo stimolo mediante la sensazione, seguono a contraersi dopo la morte, e senza senso.

Accetto il paragone, e fo vedere l'incongruenza della conclusione. La mia mano, che spinge una ruota, è la causa, che in lei eccita il moto, che fa rivolgerla, in quella guisa, che la vita d'un animale, è quella, che dà alle sue fibre la sensazione, che fa ch'el leno si contraggano sotto a una puntura.

Allorchè cessa la mia mano di toccare la ruota, prosegue ella a girare, atteso che il moto, che ho in lei eccitato, vi sussiste ancora per certo tempo; nello stesso modo le fibre d'un animale
mor-

morto, che contraggonsi ancora sotto una puntura, ci somministrano una prova, che la sensazione vi sussiste per tale puntura, come il moto nella ruota, per certo tempo, e fin che lo spirito vitale, che le ha contribuito questa sensazione, ha cessato d' esistere nello animale.

Per qual causa, replica il partigiano del Signor Haller, tale contrazione non potrebbe parimente succedere senza l' intervento d' alcuna sensazione, e per un puro effetto meccanico della puntura, come la contrazione delle foglie della pianta detta *sensitiva* produceasi per l' effetto d' un meccanismo posto in azione col semplice tatto.

Ho due risposte pronte a questa istanza.

In primo luogo, non evvi dimostrazione alcuna, che provi, che la sola meccanica produca la contrazione della *sensitiva*. Fors' anche la poca solidità delle spiegazioni, che si sono volute fin ora, dare a questa meccanica, basterebbe a farci cader in sospetto, che la *sensitiva* potesse divenir un giorno un zoofito, o per lo meno un mezzo zoofito. Il polipo d' acqua dolce, l' animal fiore &c., denno ispirarci una grande ritenutezza nelle nostre decisioni sù i limiti precisi delli regni animale, e vegetabile.

In secondo luogo, se pretendasi, che la contrazion d' una fibra, punta dopo la morte, si faccia meccanicamente, e indipendentemente dal senso, per qual motivo non dovrà ella farsi nel modo istesso trovandosi ancor viva? Ora essendo impossibile a questi Signori il trovare nelle visioni del sistema degli animali automati meccanismi, che spieghino, come le fibre d' un animale, che pungesi si contraggano, senza che il senso faccia operar la potenza motrice di queste fibre, e che per altro è evidente per esperimento nostro, e per le nostre proprie sensazioni, che le contrazioni consecutive alla puntura hanno per causa eccitante il dolore; ne segue, che il paradosso della *irritabilità senza senso*, non può essere decorato d' alcuna ragionevole spiegazione.

Per questo motivo, gli suoi più zelanti seguaci non ricorrono ad alcun sistema meccanico del secolo precedente da esso loro aborrito. E pure, questo ne somministrarebbe loro delli vieppiù accreditati, e più comodi. Si rivolgono ad una di quelle nuove proprietà, o per meglio dir rinnovate, delle quali si è dispensato dal darne ragione, ad una virtù finalmente, che non ardiscono di nominare senza esitazione *virtù occulta*; ma caratterizzata a sufficienza per vedere, ch' ella non merita altro epiteto. Declamasi contro i sistemi, e si produce il più singolare tra essi, supponendo, che una contrazione fibrosa eccitata da una puntura, sia una proprietà attaccata a certe fibre indipendentemente dalla sensazione, ed è questa proprietà incomprendibile, che chiamasi una *irritabilità*.

Frattanto, le parole essendo l' espressioni delle idee, quella stessa d' *irritabilità*, che adoperaasi, par che tradisca gli suoi autori. Poichè

chè, chi dice *irritabilità*, dice facoltà d' essere irritato, d' essere posto in colera; la colera, è una passione, un sentimento. E però secondo la loro propria espressione, la loro occulta virtù, è una sensazione, o la conseguenza d' una sensazione; E quindi è, che è o una sensitività allo stimolo, ch' eccita la fibra a contraersi, come tutti hanno pensato fino ad ora; o la loro espressione, è contraddittoria all' idea, che volevano congiunta ad essa.

Ma il senso, diranno essi, che non appartiene, che all' anima, suppone la sua presenza. E l' anima non esiste in un cuore separato dal corpo; eppur questo cuore contraesi, allorch' è punto. Adunque questa *irritabilità* non dipende dal senso.

Ricavo da un tal fatto la conseguenza del tutto opposta, come s' è già preveduta nelle nostre risposte alle obbiezioni. Il cuor d' un anguilla, ch' io pungo, allorchè sta attaccato all' animale vivente si contrae, perciocchè sente la mia puntura; per la stessa ragione, che io ritiro la mia mano quand' è ferita. Separo questo cuore dall' animale, di nuovo il pungo, e nel modo stesso contraesi. Da ciò conchiudo, che il principio, che il faceva contrarre allora quando stava attaccato all' animale, sussiste ancor nelle fibre qualche tempo dopo, che n' è separato, e in conseguenza questo cuore sente la mia puntura anche allora, che non è più unito al suo corpo, e che la sua *irritabilità*, è, come prima di questa separazione, una vera *irritabilità*, cioè la sensazione di uno stimolo eccitato dalla potenza motrice delle fibre del cuore; e credo poter provarlo mediante li medemi principj del Signor Haller.

Questo celebre dottissimo autore attribuisce il moto naturale del cuore allo stimolo del sangue venoso, e però non è da dubitarsi, ch' egli intenda per stimolo qualche cosa, che si fa sentire, o che eccita una potenza motrice. Un letteratissimo Uomo del merito del Signor Haller, è incapace di pervertire le idee in disse alle espressioni di consenso unanime di tutte le nazioni. Or se questo grand' uomo riconosce, che la potenza motrice del cuore nel suo moto naturale, e perpetuo, abbisogna d' uno stimolo, cui obbedisce; come potrà negare sinceramente, che il moto consecutivo dello stimolo d' una lancetta, d' un' ago assai più vivo, ed efficace del sangue venoso, non proceda dalla sensitività di quest' organo? E che per fine questa sensitività non sussista in quest' organo per qualche spazio di tempo dopo la sua separazione dal corpo dell' animale?

In tutte le sperienze, che il Signor Haller ha fatte, affine di provare la insensitività di certe parti, e la sensitività d' alcun' altre, qual' è stato il suo segno caratteristico della sensazione di queste ultime? Il moto, che faceva l' animale in sequela delle punture, delle abbruciature, ed altre impressioni, colle quali offendeva le parti. Per qual contraddizione, quest' Uomo dotto, vuol oggi adunque, che questi stessi movimenti, questa medema contrazione d' un

or-

organo stimolato da una puntura, non sieno più un segno, è una prova della sua sensitività.

Dal cuor dell'anguilla separato dall' animale, se passiamo alli pezzi tronchi, ne' quali ho divisa la stessa anguilla, li miei ragionamenti non faranno men giusti. E se da quelli passo a gettar lo sguardo su i venti, o trenta pezzi d' un polipo diviso, e tagliato, li quali non solo risentono le punture, e si contraggono, ma godono anche di tutti i privilegi dell' animalità, e della più eminente tra le sue prerogative, che è quella di formar il suo simile, potraffi ricular loro il principio del moto, e del senso, che è la base di tutte queste funzioni.

In quel modo, dirà il Fisiologista Teologo, che supponete voi il principio del senso, l' anima per conseguenza sussistendo in un cuore separato dal corpo, in un pezzo d' intestino separato altresì, e finalmente in tutti li tronchi d' un' anguilla, in tutti i pezzi divisi d' un polipo: l' anima diessi di questi animali voi supporrete divisa in tante parti, quante a voi piacerà di dividerli.

Certo che sì, e nol suppongo già, ma li fatti ne fanno una prova incontrastabile. (1) Ogni pezzo d' anguilla; è sensitivo alle mie punture, ne' quali pezzi ciascuno d' essi ha il principio del senso. V' ha di più. Un pollo, un colombo, e meglio d' essi un serpente, una rana, a' quali siasi levato il cervello, e in conseguenza l' anima, secondo l' opinione del Signor Haller, non lasciano di godere per lo spazio di più ore di tutti i loro movimenti, di tutti i loro sensi, e di avere della paura, della colera, in una parola di tutte le loro ordinarie passioni. Troncate l' intero capo a questo serpente, a questa rana, le medesime facoltà sussisteranno ancor per molt' ore.

Ma cos' è questo principio di senso, quest' anima divisa per total modo in più pezzi. Ella è l' anima sensitiva, che i nostri Padri hanno giudiziosissimamente stabilita in tutto il regno animale, ne' più perfetti individui di questo regno, e ne' più vili, e da' quali i moderni non potranno allontanarsi giammai, senza incorrere ne' paradossi, e negli assurdi. Qual' è la natura di quest' anima sensitiva divisibile? questa sì è una quistione, che non riguarda un Fisco. A me basta: che l' effetto me lo dimostri, e negli animali, e nell' Uomo medesimo, perchè io ne conchiuda, che esiste. E siccome sò di certa scienza, che l' uomo ha ancor per principio de' suoi pensieri, de' suoi sentimenti, e delle sue riflessioni sublimi un essere infinitamente superiore, conchiudo perciò, anche da questi nuovi fatti, che l' uomo, che ha con gli altri animali un' anima sensitiva in comune, possenga ancora sopra quest' altre specie, un' anima assai più nobile, e tutta celeste, che rende questa

mo-

morendo, è che l'altra fustite in questi organi, come in que' dell'anguilla qualche spazio di tempo ancor dopo morte. Questo è tutto il mistero dell'*irritabilità*, che io aveva già esposto nella mia Fisiologia, e nella memoria premiata dall'Accademia di Berlino nel 1753., mistero, il cui scioglimento è dettato da i fatti, e che non esige nè supposti nuovi, nè proposizioni paradosse, anche meno le contraddittorie, e in cui il Fifico avanza i suoi ragionamenti perfino alli ultimi confini della Fisica, ed a quei, che la separano dalla Metafisica, e dalla Teologia, alle quali abbandoniamo il restante della quistione.

Fin' or, s'è veduto essere fondata la opinione nostra sopra un seguito di fatti, e che non v'ha proposizione veruna, che dettata non sia dalle osservazioni. Fate or paragone di questa condotta con quella de' partigiani della nuova *irritabilità*. Questi uomini dotti, che professano di non prender altra guida, che quella degli sperimenti, delle verità Fisiche le men contraddette, cominciano dal gettarsi in una Metafisica, che è fuori della loro portata, e della quale render non possono ragione. In conseguenza di tai principii, quel medesimo Fisiologista, che affetta di fondar tutte le sue opere sopra de' fatti, non esita a negare quelli, che sono i più incontrastabili, e la cui evidenza colpisce gl'occhi i meno attenti, quale si è la sensibilità d'un'organo, che contraesi sotto la puntura d'una lancetta; e su questi due fondamenti alzasi l'edifizio della *irritabilità* senza senso, e la *irritabilità* senza irritazione.

Ci si vanta nulladimeno come l'unica sodisfacente e solida Fisiologia, quella per cui ammettesi questo principio. *La maniera d'operare dell'oppio*, dicefi, (1) *che ha prodotti tanti sistemi ugualmente opposti, e chimERICI, che ha cagionate tante dispute, senza poter essere terminata, lo è finalmente da che conoscesi la irritabilità. Per qual ragione l'oppio fa dormire? lo fa*, segue a dire uno de' difensori di questa opinione: *diminuendo l'irritabilità*. In vero, questa è una scoperta prodigiosa! Per qual causa gl'anodini calmano le parti irritate, perchè anno la virtù di sedare la loro irritazione. *Quare opium facit dormire? quia est in eo virtus dormitiva*. Si faccia il paragone tra queste due fisiche, e mi si mostri la diversità, che corre trà loro. Ecco dove conduconci gli esperimenti innumerabili, che finalmente poi altro non sono, che esperimenti. Questi sono i progressi del metodo de' nostri moderni, di quel metodo, che aborrisce i principii, e i piani, o sieno i sistemi, che se ne deducono, i quali restringonfi negl'effetti, senza degnarsi di consultare le relazioni, che hanno colle cause, che sostituiscono a queste delle parole, per le quali, i più sapienti ci lasciano ond'eravamo, e per cui la maggior parte ci rimandano agl'elementi della Filosofia.

Suppl. Part. II.

F

AL

(1) *Prefazione delle Dissertazioni del Sig. Haller intorno le parti irritabili e sensitive. Lojanna 1753.*

AL CHIARO ED ECCELLENTE SIGNORE
ERCOLE LELLI

Accademico Clementino, e dello Istituto delle Scienze.

IL DOTT. GIACINTO BARTOLOMEO FABRI:

LA sollecitudine ch' io mi son presa (e bene era dovere ch' io me la prendessi) di dar fuori volante l' ultimo ricevuto scritto del chiarissimo Sig. Le Cat, ricevuto non ha molto tempo per lo mezzo di chiarissimo soggetto il quale so, che sarà ricevuto da tutti gli scienziati, e molto più da' veri conoscitori del merito di così celebre Professore con quel piacere, col quale soglionfi le cose d' Uomini grandi ricevere, a me pure ha convenevol strada aperta, onde al Pubblico esporre il caso, ch' ella mi commise ad essere curato, il quale, quanto parmi convicentissimo a disingannar quelli, che credono, il tendine umano essere affatto privo e spogliato di senso, altrettanto opportunissimo a vie più persuader gli altri, che sono di contraria opinione a tener per indubitato, anzi a irrevocabilmente credere, non potersi ad una tal parte quella sensazione assolutamente negare, che oggi giorno le viene con ogni calore contrastata. Vedrà ella, ch' io mi limito solamente a descrivere, tanto quello, che ho trovato io solo esperienze facendo, quanto l' altro, cui essa stessa fu oculatissimo testimonio, per così esser breve, e non istuccar di soverchio, chi si desse un pò d' agio, ed usando pazienza, volesse scorrere questa semplice narrazione. La storia de' fatti, è tal quale ho pensato di darla fuori: ella però la legga, e se trovasse, ch' io non fossi veridico e fedele riportatore de' sperimenti adoperati 'n sua presenza, lo sconvenevole a dinotarmi la, prego, affinchè in una cosa delicata, e di tanta importanza, niuno avesse a dubitare di me, e tener lei di troppo condiscendente per lo sistema contrario a quello del celebratissimo Signor Haller, cui somma stima, e riguardo sommo io professo, e per la sua grande autorità e dottrina, professerò mai sempre. E senza più passo, alla Storia.

Sul terminare del Mese di Luglio 1757, un tale per nome Tommaso..... d' anni 50 in circa, di temperamento caldo e secco, recossi in cotesta Città per farsi medicare, dopo esserlo stato per non so quanti giorni fuori, a cagione di una grande ulcera a Cancrena ridotta, fattasegli per un' ammaccatura con bruciatura, rilevata infelicitamente nella parte interna della coda del braccio sinistro, in vicinanza dell' articolazione del raggio, e dell' ulna colle ossa del carpo, fino d' allora, che gli scoppio un archibuso in mano.

Estendevasi questa oltre sei dita transversali in lunghezza e larghez-

chezza, sicchè venivà a comprendere anco eternamente il dorso della menzionata parte. Mandato a tal fine per un Professor chiaro di uno di codesti primarj Spedali (1), fu visitato, la prima volta medicato, e nello stesso tempo lasciato in libertà, onde ad altro più comodo, si potesse applicare per venire assiduamente, siccome volevalo il grave, ed urgentissimo vopo medicato, ed assistito. Chiamato io dunque a tale malagevole cura da esso Lei, perchè era questi Uomo di sua premura, sottentrar volentieri nello impegno, e visitatolo la prima fiata, trovai lo Infermo, e la parte nello stato, che passo brevemente, e con tutta semplicità a descrivere.

Quanto al primo, era desso compreso da una febbre sintomatica, la quale mostravasi del carattere di quelle, che non di rado accompagnar sogliono in sì fatte circostanze le ulceri cancerose, il perchè faceaglisi prendere ogni giorno, quando quattro, quando due, drame di scorza, onde con ciò impedire, per quanto si potea, e la febbre, e lo avanzamento alla cancrena, la quale nel corso di non molti giorni si vide fermata. Quanto alla parte, l'ulcera, che in essa scorgevasi era piena di marciume, e di fordidezze, le quali mi diedi a levar via sollecitamente, per separare, per quanto si potea, le parti cancerenate dalle sane, e guarir non andò, che essendosi fatta la grand' ulcera un poco più pulita, campo mi aperse di trovarmi innanzi tendini scoperti, l'appendice della sottil fascia aponeurotica, altramenti detta legamento annulare del carpo derivantesi dall'aponeurosi del muscolo anconeò, la quale si termina con uno intrecciamento delle sue fibre poco sopra il ponticello formato dalla unione de' muscoli, che muovono dalla parte interna riguardante la palma della mano i diti pollice et indice; e per fine piccola porzione di muscolatura. Oltre questi tendini scoperti, la più parte de' quali da mortificazion tocchi essendo, convenne in gran parte levarli, manifestavasi il grosso, e notabilissimo del muscolo ulnare interno, il quale per salvarlo, e per quanto fosse possibile dalla corruzione guarentirlo, mi applicai a levargli d'attorno tutto ciò, che di guasto e infradiciato io vedeai, lo che fatto, eccolo del tutto fuori saltato, e bello, e bianco, e sfoderato agli occhi d'ogni uno esposto.

Una tale fortunata occasione, destò nell'animo mio la virtuosa curiosità di appagar me, e chiunque con meco fosse stato desideroso di sperimentare sopra un tendine umano con tutta la più possibile destrezza e carità, e non passarono giorni, che per non lasciarmi sfuggire un sì bel colpo, mi diedi diligentemente ad osservare primo, per indi chiamar altri ad essere presenti a ciò, che sarebbe succeduto nell'adoperare accuratamente gli oportuni cimenti.

F 2

Colto

(1) Il celebre Sig. Dott. Gaetano Tacconi Fisico Chirurgo nello Archispedale di Santa Maria della Morte.

Colto dunque il tempo, cominciai li 4. Agosto dopo aver levato lo apparecchio, e nettata convenevolmente l'ulcera a tentare le mie sperienze. Per la qual cosa, presi la mia spatolella d'argento di punta ottusa anzi che nò, e toccai destramente, e con moderatezza il tendine senza dir altro, fingendo di levare dalla sua superficie alcuna nociva cosa, al cui tatto nulla altro disse, se non che gli pareva, che quel nervo (che nervo in suo senso il Paziente esser teneva il tendine) non fosse perduto, attesochè sentiva toccarselo; e quindi è, che accusava senso di percezione. Ciò ottenuto spinfi la detta punta un poco più abbasso tra filamento e filamento del tendine, trovandosi esso così bene spogliato del suo involto, che chi avesse pazienza avuta, ed occhio armato, si farebbono tali fascetti tendinosi quasi ad un per uno numerati, osservando diligentemente di non toccare altra parte, ned' altra si poteva toccare, perchè il tendine, che bianchissimo era, risaltava sopra il piano dell'ulcera da due linee e più di Parigi, ed il Paziente allora si dolse un poco più. Fatta l'osservazione, in tale maniera sul tendine, e notato fedelmente quanto era nello sperimentare accaduto, scopersi l'altra metà della piaga, che in tempo de' miei sperimenti erami piaciuto coprire, per rinettarla, bene pulita medicarla, e così lasciare per allora in pace il mio sofferente Malato.

E' da notarsi, che nel mentre, che io intento era a levare col ferro quello, che di cattivo, e cancerenato vedea, e con bordonetti di filacciche spiumacciate, l'altro detergere con maniera, che bisognava, ecco uscire improvvisamente un grido dal Malato, il quale perchè inopinato, mi sorprese. Cessato dallo ulteriormente toccarlo, e richiestolo del perchè avesse siffattamente gridato, dissemi, che aveva io toccato con quel corpetto di filacciche un punto, il quale tal dolore gli aveva mosso, che si era propagato fino alla spalla, nella quale durava ancora la sensazione dolorosa. Udito ciò, null'altro fare io volli, e piacquemi di riportar tutt'altro, che pensava di tentare alla susseguente mutazion di apparecchio.

Alla nuova medicazione dunque della sera, replicai mie sperienze sopra il tendine, il quale si conservava illeso e da ogni lordura pulito, nè riuscirono diversamente dalle prime; anzi preso un ago un po' curvo, e con tutta destrezza spintolo fu pel suo asse verso il termine mobile, (non curandomi di cimentare così la porzion superiore riguardante il rispettivo suo muscolo per lo timore di non incontrarmi in qualche fibra carnea allungata, e bene se ne allungano con filetti nervosi per sentimento del Sig. Haller medesimo, comechè essendo questo un tendine lungo sembri, che non ci fosse tanto pericolo, e quella incolpare se senso si fosse trovato) il quale ha il suo attacco all'ultimo ed esteriore prominente cassetto del primo ordine di quelli del carpo, il Paziente si dolse anche più di prima, ed interrogato, perchè così si lagnasse, risposemi, perchè gli faceva male, nè potendolo, avrebbe voluto, che io più gli fossi cotanto molesto.

molesto. Fatto questo, lasciai il mio Infermo quietare, e quieto che fu, proseguij a nettar l'ulcera dove l'uopo il cercava, dove cioè la digestione facendosi, marcia si era formata, nel che fare passato sopra lo accennato punto, tornò a farsi sentire il dolore alla spalla, che nella medicazione antecedente avea sentito e provato; cosa, che m' impegnò a cercar per minuto, onde rinvenire circa quello la cagion del doloroso incomodo. E in fatti, con ogni possibile diligenza alzati filamenti tendinosi un po' fracidi, che inferiormente aveano per base un letto di marcia accostantesi al bianco, ed accuratamente osservando, se mai alcuna branca nervosa tra loro, o in lor vicinanza scorresse, e da quella derivar potesse la sensazione molesta, che verso il capo dell' omero si eccitava; m' incontrai in un minutissimo filamentuccio bianco, rispettivamente ai tendini di colore alterati, più di loro resistente, il quale, passando obbliquamente sotto e sopra porzion d' essi, sembrava, se male non mi avvidi, andare a terminarsi colà dove il tendine, sul quale avea sperimentato, col mentovato ossetto del carpo fortemente si appicca. Questo scoperto, e con ogni gelosia guardato, m' ingegnai di conservarlo per veder pure, se venivami fatto di discoprire, se mai nel tendine medesimo inferito si fosse, e per allora nulla più feci, la medicazion terminando.

Giunto al di seguente, prima d' ogni altra cosa, tornai di nuovo a rifare le mie sperienze, e di più volli, l' esortazione seguendo del Sig. Haller, prender tra le mollette il detto tendine, e strignerlo come ne insegna, per vedere da tale tentativo, quale cosa io ne ricavava. La qual prova con ogn' circospezzion fatta, trovai lo Infermo dolersi, e farlo non poco.

Questo pur anco chiarissimamente rilevato, rivolsi mie cure al filamento nervoso derivantesi probabilmente dal tronco del nervo mediano, il quale passa sotto la fascia aponeurotica sopra notata dalla parte interna della coda del braccio, che negli apparecchi passati era io andato guardando, per vedere, se veramente nel tendine s' inferiva; giacchè, come dissi poc' anzi, verso il suo termine inferiore drizzar si vedea la minuta propagin sua; e lo avrei, se non in una, in più volte con ogni più minuta cautela fatto, se per levare di dolore lo stanco ed abbattuto Infermo, ogni volta ch' io lo toccava con bordonetti quantunque di filacciche fine, o alzavalo colla punta della spatola, o seguivalo alzato con uno stiletto (e così bisognava ch' io facessi per lo pressissimi fine), non avessi dovuto alla seconda mutazion dello apparecchio della sera troncarlo, e di un tanto incomodo rendutolo libero, agevolare così ad Esso la sofferenza delle ulteriori medicazioni. Che veramente un tale filamentuccio nervoso andasse ad inferirsi, ed impiantarsi nel tendine, modo non fu di scoprirlo: e il ragionevolmente supporlo, che male farebbe?

Assicurato imperciò da quello, che mi era accaduto sperimentando,

do, che il tendine non potevasi dire assolutamente privo della sensazione costante, ch' egli mostrava, pensai di replicare sollecitamente tali tentativi in presenza di persona, cui niuna eccezione dar si potesse, affinchè da esso lei confirmati, non avessero, esposti al pubblico, ad incontrare diffidenza, e per veraci non venire da coloro, che opposti sono di parere ammessi. Ed ella Sig. Ercole ornatissimo, come Uomo di quel ingegno, che ogni uno sa, e tra le altre cose, chiaro e valente nelle Anatomiche, come veder puossi dalle incomparabili statue, che forniscono la nobilissima stanza Anatomica nello Istituto delle scienze, che all' occhio de' risguardanti recan maraviglia, e stupore, fu a tal fine lo scelto, non solo, perchè l' avea per lo innanzi sempre trovata in questa controversia indifferente, ma perchè erale piaciuto di fidare alla mia cura lo Infermo.

Trovatomi dunque collo stesso dal nostro Malato la sera delli 6. Agosto, e quindi sciolto il totale apparecchio e la gran piaga scoperta, cominciai esso presente a reiterare le fatte sperienze, non ommettendo punto niuna di quelle cautele, che praticate avea da me solo le descritte pruove facendo. E' d' avvertire, che al povero Sofferente non era noto il fine, pel quale erami piaciuto ch' egli intervenisse alla medicazione, e conveniva tacerlo, perciocchè probabilmente non avrebbe permesso, che tali prove si fossero altra fiata ritentate.

Fingendo dunque, come egli sa, di mostrar lui i tendini scoperti, e di fargli vedere tutta l' estension dell' ulcera, e quanto di notevole ci era, venni bel bello toccando colla punta della spatola la superficie del tendine grosso dello ulnare, nel qual tempo, da entrambi un dopo l' altro richiesto il Malato se sentiva toccarsi, udimmo risponderli prontamente che sì; ed ecco corrispondere appunto questo primo sperimento, altrui presente adoperato, al primo primo da me solo tentato. Ciò udito, declinai tosto la punta della spatola teste dritta, lateralmente al tendine, e toccai porzion di carne rubiconda, che cominciavasi a discoprire, ed Esso allora accusò maggior senso dicendo, mi tocca sul vivo; così successe ancora toccando i margini dell' ulcera. Senza perder tempo, tornai la punta della spatola tra fibra e fibra del tendine spingendola più abbasso; ed ah! cominciò a gridare, mi fa male. Fatto questo, copersi per un poco l' ulcera, e lasciai che si ristorasse lo Infermo, mostrando lui la necessità, che avea di tempo e pazienza per bene levare dalla medesima tutto quello, che avrebbe potuto opporsi alla sollecita guarigione, che così facendo, io gli andava procurando.

In tale convenevole maniera lusingatolo a lasciarsi tutto fare, che io pensava opportuno, e la sua confidenza avendo con ciò guadagnata, scopersi di nuovo l' ulcera, presi di nascosto l' ago, ed introdottolo fu per l' asse del tendine verso il suo termine mobile, innanzi lo spinai alcune linee; ma a non so qual punto arrivato, convennemi ben presto levarlo pel male, che diceva il povero Paziente

ziente patire. Ciò non ostante lo riconfortammo dicendogli, che poco più vi restava da fare per chiudere la medicazione, e che usasse, per ciò, anche un poco di sua sofferenza. Lo che detto, ripresi tra non molto l' ago, e piacquemi di fare quello, che da me solo non avea curato, piacquemi cioè d' introdurre su per l' opposto asse del tendine riguardante il relativo suo muscolo il detto ago, il quale dolcissimamente spingere innanzi volendo, mestier fu, ch' io mi fermassi, perchè con la mano sana, presa il Malato la mia, impedimmi a non poter più oltre coll' ago andare, replicando tutto caldo e crucioso, che gli faceva assai male.

Restava da stringersi il tendine tra le molette; ma per non inquietarlo di soverchio, ci determinammo di riportare un tale sperimento ad una delle medicazioni susseguenti; e così chiuso lo apparecchio, null' altro per allora si fece.

Tornato io solo la mattina a medicare il mio Piagato, e domandatolo, se la notte passata avea avuto dolore nel braccio, dissemi, che solo circa i luoghi dove avea levata la carne cattiva, con tanto suo incomodo (voleva dire, dove si era sperimentato) seguitò per un ora e più, dopo che fummo partiti, a sentire, se non dolore, almeno un certo tal qual male, che non sapeva spiegare, e che mi pregava a non porre più quel balsamo (era olio di trementina) sul nervo scoperto (s' intendeva il tendine) perchè dappoi ch' io l' avea cominciato ad usare, sentiva un molesto pizzicamento alla parte su cui ponevalo, e tal volta anche sensazion dolorosa. Il perchè, applicatomi alle filacciche secche fine, e queste pur anco riuscendogli di qualche incomodo, dovetti finalmente determinarmi ad un leggerissimo digerente, dopo l' uso del quale, più non accusò alcun patimento di quelli, che sofferiva, quando io le usava intinte nell' olio di trementina, o naturali come erano: cosa, che faceagli spesso ripetere, che le ungeffi sempre con un tale unto.

Passato dunque il restante di questa giornata, ed ancora tutto il chiaro dell' altra, tornammo sull' imbrunir della sera delli 8 col Sig. Lelli dallo Inferno per fare lo sperimento, che restava. Sicchè tratto d' impaccio lo apparecchio, senza più altro pungere e forare il tendine, applicaigli cauto le molette, guardandomi bene, come feci l' altra volta di non comprendere tra le sue branche alcun' altra sensitiva parte, e nello stringerlo, di non stirarlo in maniera, che lo stiramento propagato alle fibre muscolari, non fosse in colpa rivotato, se avesse il tendine mostrato senso, e così premunito, lo strinsi prima competentemente, indi più forte. Sul principio pochissimo segno diede di sentire, ma nel comprimerlo, e stringerlo al grado, ch' io lo strinsi, lo Inferno cominciò a dirmi, ch' io lo lasciassi stare, e che non voleva più essere assolutamente tormentato, parendogli ora, che dovessilo, senza altro male targli, lasciare in tanta pace.

Ciò udito, ed osservato diligentemente dal chiaro Sig. Lelli, del

del quale certo somma fu l'attenzione in esaminar tutto; e tornato da me medesimo ad osservare, lo quietammo, e tutt'altro adoperato, che bisognava, terminai la mia medicazione.

Passati altri due giorni senza più alcuna pruova fare, ne cadendomi in mente, che avesse cosa nuova a succedere, la quale mi dovesse impegnare a pensare diversamente; ecco non andar guari, che mi si presentò altro interessante motivo da replicare almeno per un'altra volta sul tendine nudo miei abbandonati sperimenti col ferro; giacchè niun caustico porre in uso mi piacque, perchè, per mio avviso, per quanto vadasi cauto in simili casi nello applicar questi, sempre si può sospettare, che altra parte potessero toccare, e quindi rendere equivoco lo sperimento; e fu in tempo, che risipolatasi la porzion superiore del braccio apparente sana al di fuori, che era tra la grand' ulcera ed altra piccola a lei sovrapposta, veniva una suppurazione in un seno tra loro comunicante palesemente minacciata.

Non mi lasciai dunque fuggire così bella circostanza, per vedere se il tendine all'occasione di questa infiammazione avesse mostrata maggiore sensazione o no. Di fatti, toccatolo, e punto leggermente con un ago, svegliossi nella parte un positivo doloretto, dove prima non accusava, almen solo toccandolo, che puro senso di percezione. Presa la spatola, e spinta la sua punta un poco più abbasso, non potè rattenersi dal non gridar forte, che io gli faceva dolore. Quello, che di particolare trovai in questi ultimi tentativi, i quali con tutta quanta la più possibile dolcezza furono anche la sera, senz'altro dire, collo stesso succedimento rifatti, è, che quello, che è positivo dolore, durava nella parte per più minuti colla medesima intensioncella, solo a lenti gradi diminuendo; cosa la quale non accadeva prima della risipola posteriormente nata, nel qual tempo accusava bensì di sentire un non so qual male, ma non positivo dolore. (1) E quindi, tutto con iscrupolosa diligenza notato, e deliberato avendo di lasciare totalmente da parte ogni altro

-
- (1) *Avvegnachè, io mi fossi proposto di non aggiugnere a questa qualunque siasi storia, alcuna considerazione, ed abbandonarla così nuda e di per se stessa al savissimo discernimento di quelli, che la leggeranno; ciò non pertanto tornami opportuno di notare, ch'egli è mestieri di confessare, come ho di volo sul terminarla toccato, che le varie e molte circostanze possano fare, che le parti, le quali per loro natura erano sensitive, addivengano del tutto prive di senso; e le parti, che poca o quasi niuna sensazione mostravano, compariscano sensitivissime. Per esempio una forte ammaccatura, una gagliarda compressione &c., renderà talmente stucca una parte, che se prima al semplicemente toccarla dava segni di senso, non li darà più, qualunque sia*

altro tentativo, ragion volle, che io rivolgeffi tutti i miei pensieri alla cura, la quale poco dopo la solennità del Nascimento di Maria Vergine, fu coll' ajuto del Donator d' ogni bene per me medesimo felicemente ultimata.

Se questa storia, che ho con precisione, fedeltà, e prevenzion niuna difesa, e ad esso-Lei mandata da leggere comprenda in se medesima cose valevoli a far giudicare più a favore della sensitività del tendine, che della insensitività, Ella sel vede. L' essermi io proposto, di solo stendere il caso, e non altro, vuol che mi taccia, e passando sopra ad alcune riflessioni, che avrei potuto ad illustrazione e rischiaramento della sensitività del tendine, che certo per varie e molte circostanze può venire, quando diminuita, e quando accresciuta aggiugnere, lasci al cortesissimo leggitore tutto il campo di entrar lui col suo ottimo discernimento a giudicare su questa, e cavare dagli sperimenti, ch' ella comprende quelle induzioni, che parerà lui di poter cavare, giacchè ho deliberato, senza più, di consegnarla al Pubblico. Ella però vede, che avendo a far questo, mestieri è, ch' io mi vaglia di sua testimonianza, per rendere indubitata l' esperienza almeno fatte in sua presenza, e per guarentirmi dalle dicerie di quelli, che mi potessero accusare di troppo prevenuto a favore della sensitività del tendine, comechè realmente nol sia, pronto anzi essendo ad abbandonare lo antico sistema, e non più farla da scettico, quando costantemente la predicata insensitività, non negli animali irragionevoli, ma ne' corpi, che son da ragione condotti, sia dalla

Suppl. Part. II.

G

più

sia per essere l' agente del quale vuolsi servire per farne le prove. Un nervo, un muscolo, la cute medesima tanto dotata di senso, in istato di mortificazione, e di cancrena non compariranno più di niun senso; eppure ogn' uno sa, quanto queste parti nello stato loro naturale sieno sensitive. Un tendine, una membrana, e simili, che prima non sembravano avere che quasi niuno, o almeno pochissimo senso, posta una infiammazione, una tensione &c., danno segni di senso, e di un senso squisitissimo. Qual conchiusione, e quali altre ulteriori riflessioni da questa nota cavare si possano, chiunque sel vede, il quale vogliasi nello esame di tali circostanze, e d' altre ancora versare; ne qui torna in acconcio, a titolo di brevità, oltre farmi a discorrerla. Vuol ragione però ch' io avverta, che le accennate circostanze erano già state dal chiarissimo Sig. Laghi prima di me notate nella sua erudita lettera in risposta al Reverendissimo Padre Pozzi, non che le più volte in pratica vedute nascere, e confermate dall' oculatissimo, e dottissimo Sig. Pier-Paolo Mollinelli Professor Chirurgo nello Spedale di Santa Maria della Vita, il quale col suo penetrantissimo discernimento, fu il primo a far rilevar quindi in Bologna a' Signori Halleriani il non fin qui abbastanza spiegato fenomeno, che costantemente si osserva al semplice follicolo della d'ura madre con un specillo di punta ottusa, indicante chiarissimamente la sua sensitività.

più parte approvata. E così vuole la verace estimazione, che ho, ed avrò sempre pel suo incomparabile ritrovatore.

A niun certamente avrà a cadere in dubbio, ch' io l' abbia tratta in inganno sperimentando, perchè trattandosi di parti del corpo umano, ella ha quella cognizione, che molti minutamente non hanno, e potrebbe benissimo, quanto alla Osteologia e Miologia altri instruire, come ha fatto, ed a me medesimo è accaduto. Non dico, che salendo le Cattedre, fosse in grado di affibbiarsi la giornèa, ed entrare in dispute spettanti ad una perfetta, e minuta Splanchnologia: dico ch' ella è Uom tale, che la sola sua autorità in questo avrà a bastare, perchè non mi vengan contrariate l' esperienze, anzi che approvate. S' accinga dunque a darmene il permesso, ed avrei piacere, che il facesse in iscritto; giacchè in iscritto mi è piaciuto di chiederlene la licenza. Stia sana, e mi mantenga tra i suoi veraci amici.

Di Casa li 10. Settembre 1757.

All' Egregio, ed Ornatissimo Signore

GIACINTO BARTOLOMEO FABRI

Medico Filosofo, e Professor Chirurgo.

ERCOLE LELLI.

Ella mi ha di troppo onorato Signor Dottore ornatissimo avendomi mandata da leggere la storia da lei distesa del Caso, che ha felicemente curato. Io l' ho con mia sodisfazione letta e riletta, quantunque pieno di occupazioni io mi sia, e le ne sono per ciò grandemente obbligato. Quanto alle sperienze, che in mia presenza ha fatte, trovo, che sono descritte appuntino quali a V. S. Eccellentissima fare le vidi, e senza la più menoma alterazione: nè io certamente m' ingannai osservandole; imperocchè, come sa, volli usare ogni diligenza nel vederle eseguire, e per non fidarmi dell' occhio nudo, mi piacque di averlo armato. Amo il vero, e come vero il riportato, non avrò difficoltà di confermarlo a chiunque avesse difficoltà di crederlo. Anzi dirò in oltre, che in una tale circostanza, ho ammirata la sua destrezza, ed accuratezza nel fare tali sperimenti, ed ho veduto, quanta sia la sua abilità nel condurre al suo fine lo impreso malagevole impegno. Stampi ella dunque la distesa storia, e la stampi tal quale l' ho letta, perchè torno a dirle, che quanto a quello, che a me appartiene, non ha bisogno di alcuna mutazione. La verità vuolsi avere in pregio, nè deve tacerfi, quando l' uopo il richiegga. Se in altro posso servirla, dee comandarmi, sapendo ch' altre volte l' ho fatta padrona. Mi conservi l' amor suo, e per se, e per altri, si mantenga in salute.

Di Casa li 16. Settembre 1757.

D. HEN-

D. HENRICI FRIDERICI DELIJ

ANIMADVERSIONES

IN DOCTRINAM

D E

IRRITABILITATE, TONO,
SENSATIONE, ET MOTU
CORPORIS HUMANI.

HIPPOCRATES AD THESSALUM

*Præclara res est, tale ministerium in medicina habere,
quod partes intensiōis ac remissionis, cum ex parte
inæquales fuerint, facile cognoscibiles exhibet,
citra errorem.*

HENR. NOLLIUS

In stud. med. remora:

Philosophia non est Aristorelis; nec medicina Galeni;
sed Dei & naturæ: Ex hisce addisce, si quid men-
te assequi cupis.

D. HENRICI FRIDERICI DELII

De irritabilitate, tono, &c.

S. I.

Regnare diversis temporibus animadvertimus in diversas scientias diversum etiam & peculiare studium. Non evagari per amplissimum scientiarum campum lubet. Philosophia naturalis & medicinæ scientia propius dicta confirmant. Cogitationum, attentionum, admirationum vicissitudo. In summo fastigio sæpe sunt, quæ mox contemnuntur. Contemnuntur magno detrimento incolumes veritates, quæ mox sublata ex oculis quæruntur anxie. Genium sæculi observamus. Sentiendi libertate ducti autem desudant eruditi in appetenda, evolvenda, studioseque & sollicitè tractanda, quadam scientiæ parte, præ aliis. Mortalitem negotii in præsentia non rimabimur. In omnibus autem ita procedendum esse reor, ut sapienter cogitata & curiosius exalta ornet, quæ viros decet, constantia, neque concedatur tristi disterio locus:

Principium fervet, medium tepet, ultima frigent.

Sed ex consensu variorum ingeniorum in excolenda scientiæ cuiusdam parte notionum certe distinctarum & adæquatarum gignitur copia, ex qua demum res recto iudicio ponderare applicareque oportet, egregio scientiarum emolumento. In philosophia naturali sæculi genium mox cometologiam, mox magnetismi historiam & theoriam, mox antlia pneumatica experimenta exposcit; mox electricitatis vorticibus ipsa abripiuntur ingenia: mox magicam lucernam, mox solare microscopium admirantur omnes: mox speculis causticis conflagrant omnia: mox in theatrum publicum spectra producuntur, mox magica quæstiones ventilantur: mox polyporum admirandæ qualitates ex insectorum vasta historia considerantur; mox plantarum colores & structuram eleganter pingunt, sexuales partes vegetabilium, nuptias, generationes, fideliter observant, & herbarum & radicum dictionarium curant: mox tot diversorum lapidum curiosæ collectiones & profunt & delectant; mox de pluralitate mundorum discursus societates exhilarant; mox de monadibus loquuntur omnes. In medicamentis ipsis quanta est vis consuetudinis & morum sæculi regnantium. In medicina alia secta aliam pepulit. Dogmatica empiricam, illam methodica, ecclesiastica utraque, Galenica omnes. Hanc deinde chymica, quam iterum mechanica & physica superasse videtur, cum organica licet perpetua bella gerens. Fausto omine philosophicas etiam veritates in medicinam, neque hoc per μεταβασις εις αλλα γενος, introduxerunt. Alio tempore anatomia, alio chymia, chirurgia alio, alio materiæ medicæ doctrina & in his omnibus peculiaris pars quædam caput extulit.

tulit. Probatione haud eget, cum rerum testimonia loquantur, & alia post alia perpetuo prodeant compendia & opera maiora physiologica, *Physiologium*, uti sæpenumero pristinis, sic & nostris temporibus magni æstimari.

§. I I.

Hæc autem *physiologia*, animata anatome, doctrina de natura hominis, de partibus corporis humani vivi & sani, earum qualitatibus & inde pendentibus functionibus & mutationibus tot tantaque involuit, ut mirum videri vix possit, quando in evolvenda hac vel illa parte consentientia ingenia certis temporibus improbo labore functi sunt. Addiderunt seculi regnantes mores, ut uno eodemque tempore eodem studio delectarentur animi. Fuere tempora, quibus solas *acidi* & *alkali* proprietates in corpore humano observandas, iudicabant. *Spiritus animales*, aliique sylvestres, campestres, rectores *ces.* alio tempore confabulationum objecta erant. *Anima* in corpus suum imperium quot quantasque contentiones excitavit? *Monstrorum* considerationibus quantum temporis tritum est. Inventa *circulationis sanguinis* theoria, quam fecunda fuit & gloriosa scientiæ medicæ periodus, ex qua istius rationem studiosius & curiosius habere adlaborant medici ingenui. Alio tempore *microscopica* observationes profuerunt & delectabant. Alio *seminales vermiculi* omnium admirationum, ad se repiebant. Aliud tempus canibus fatale existit, quo *exsectionem lineis* pro determinanda ejus natura & functione tentabant, vel in *succi pancreatici* historiam & naturam vel in alia inquirere necessarium iudicabant naturæ mystæ. Cuncta quis recenscat?

§. I I I.

Sed ab omni tempore quæsitum est *principium*, quod corporis humani mutationum rationem contineat, quod *impetum* faciat, quod *το ενορμονον* veteres appellarunt; quo pacto *mutationum* in corpore nostro reddamur *conscii*; unde derivanda sit *motuum* in homine vivo existentia, proportionata ordinatio; quales sint *potentia* & *vires* quæ determinant actiones; qualis sit inter *solidas* & *fluidas* corporis partes proportio, harmonia, & habitus inter se.

§. I V.

Vix errabimus, si doctrinam de *constitutione*, *actione* & *mutatione fibrarum*, e quibus C. H. structum est, de *sensatione*, de *ratione sufficiente* & *determinante motuum* C. H. inter præcipua themata numeramus, in quibus ex seculi genio evolvendis & explicandis occupatur hodie plurimorum physicorum & medicorum solers industria. Resonant sæpissime in cathedris, oberrant in scriptis termini, *mechanismi*, *irritabilitatis*, *contractilitatis*, *toni*, *elateris*, *motricis fibræ*, *stimuli*, *tremoris*, *tensionis*, *sensationis*, *cohesionis*, *attractionis*, *stringentis spiritus*, &c. Alii in alias sententias abeunt, ultro citroque

con-

controverſas. Sæpiuſcule, quid enim fateri nefas eſt? fovi ſimiles cogitationes, ex quo animum ad phyſicum & medicum ſtudium ap-
puli. Juſſit neceſſaria cauſarum evolutio & fœcundus principiorum
uſus. Olim nonnulla feci pericula. Ante hos tres annos juſſit re-
gnans ſeculi ſententia, & muneris mei ratio meditationes tam late
patentis theoriæ. Evulgatæ ſunt inter alias opellæ de *Theoria &*
fœcundo in medicina uſu principii: ſenſationem ſequitur motus ſenſatio-
ni proportionatus & theoria toni magnum medicina incrementum. 1749.
Nondum per hoc tempus in conſideratione dictorum eruditi conti-
nuere, ſed digna admodum iis viſa eſt, in qua ulterius deſcendent, &
ſæpenumero vel hypothetice adſumtis, vel demonſtratis integra ſyſte-
mata ſuperſtruant. Non placet, ea quæ ſuperioribus anni evulgata
dedimus, notiones, definitiones, demonſtrationes, iterum tranſcri-
bere: animadverſiones autem nonnullas exhibendas judicamus.

§. V.

Veritatem & fœcundum in medicina uſum principii: *Sensatio-*
nem ſequitur motus ſenſationi proportionatus ultro agnoſcentes, multi
in medicinam feliciter introduxerunt. Aliis ſyſtematis conditi ima-
go placuit. Multis, antea inauditum nec cogitatum judicantibus, ob
novitatis gratiam adiecit: ſed hi erunt fere, qui ab experientia & af-
fidua ſapienteque obſervatione non proſectam eſſe regulam vel legem
autumant. Contrarium autem antiquiſſimorum & philoſophorum &
medicorum pariter ac noſtro tempore ſcripta plane demonſtrant. Ego
quidem regulæ præexiſtentiam in memorata Theoria oſtendi, & jam
idem innui 1746. in reſponſione ad Cel. Kratzenſtenium: *utrum ani-*
ma ſit corporis ſui architecta. Vide Ejuſdem *Physicaliſche Briefe.* Ne-
que adeo mihi ſuſſenus ſum, ut gloriam inventionis & applicationis
captare ſtudeam. Cum autem in varias abire ſententias videamus
principii hermeneutas, facile patet, non unam eandemque omnibus
eſſe theoriā & applicationem.

§. VI.

Ante annum Cel. Krugerus, in academia Helmſtadienſi jam medici-
næ Profeſſor ordinarius clariffimus, Halæ adhuc diſſertationi præſuit,
quæ de lege naturæ tractat, quod in corpore animali ſenſationem excipiat
motus ſenſationi proportionatus, reſpondente auctore, uti rubrum indicat,
Petro Samuele de Chauſepie. Facile concedimus auctori, in præmio Cel.
Krugerum inventorem regulæ nuncupare. Lubentes idem agnoſcimus,
quando de explicatione mentis ſuæ circa hanc theoriā ſermo eſt.
Novit orbis eruditus, peculiarem principii exceſſum ſeliter in Phy-
ſiologia ſua, aliſque doctis elaborationibus adhibuiſſe celeberrimum
virum. Graſſiſſimæ quoque mihi recordationis tempus eſt, quo ipſius
celeberrimi & ingenioli viri favore ſtudio & amicitia frui mihi con-
tingit. Neque his mihi, dum forte contra humaniſſimi viri ſententiam
quædam moneo, eſt animus, ut contradicendi pruritu ductus, barba-
ros

ros nonnullos eruditorum mores æmulari contendam. Sed ex ipsa dissertatione jus mihi quoddam subnascitur, nonnulla animadvertere. Contra enim theoriam adductam meam p. 21. dissertationis monet quædam auctor & adstruere conatur, me legem additamento quodam minus necessario augere voluisse, quod scilicet sensationem sequatur motus non solum proportionatus, sed etiam congruus. Verba sunt:

„ Existimant itaque illi, qui doctrinam *Stablianam* profitentur, ani-

„ mam sentientem salutarî consilio motus suscipere & excitare, quas

„ ad corporis conservationem necessarios existimat. Ad hanc vero

„ quod attinet sententiam, non minoribus difficultatibus laborare vi-

„ detur, quibus factum est, ut a me nondum impetrare potuerim,

„ ut sententiæ clarissimi D. Delij Prof. med. in academia Erlangen-

„ si celeberrimi subscriberem, qui nostram legem illo additamento

„ augere voluit, quod sensationem sequatur motus non solum pro-

„ portionatus, sed etiam congruus, hoc est talis qui aptus est ad cor-

„ poris conservationem, & hoc propterea fieri, quoniam anima per

„ liberam voluntatem & perfectam corporis cognitionem hunc potius

„ quam alium motum producat. Multa enim hic gratis assumpta vi-

„ dentur & experientiæ contraria. Quamvis enim ambamus largia-

„ mur, motus sensationes excipientes, ipsis sensationibus sæpissime

„ esse convenientes & congruos, tota tamen res magis a structura

„ corporis mechanica quam ab animæ voluntate & arbitrio pendere

„ videtur &c. Ego vero nunc honorem *Stabliani* non sperabam:

quantum etenim a sectarii, odiosum & ignobile nomen! vel imita-

toris negotio absim, omnes norunt, qui in prælectionibus & scriptis

academicis me sæpiusculum animadvertunt minime terminis inanibus

contentum, quibus non redditur ratio eorum quæ sunt, hinc magis

eclecticum, conciliatorem, sed & in examinandis sententiis occupa-

tum, ita tamen, ut, relicto suo cuique, verum rectumque sequi me

solum obligatum esse sentiam. Non itaque cl. Auctori succenseo,

quando non per omnia ipsi sententia mea placet. Ipse autem gratis

multa assumit, & est assertioni ejus opella mea aperte contraria.

Facillime ergo loco constitutionis operosioris, ut ipsi relegere medi-

tationes meas, exactiusque ponderare placeat, rogare possem: An

etenim præter necessitatem additamento legem augere volui? An po-

tius antiquam veritatem noviter in apicem posui? Absit arrogantia

dictis. An docui animam per liberam voluntatem & perfectam cor-

poris cognitionem hunc potius quam alium motum producere? Ex

variis potius exemplis commonstravi, quod cum multa anima faciat,

quorum distincte non sibi conscia videatur, non contradictionem in-

volvat, neque hanc inde veram elicere oporteat, quando pro ultima

motuum causa anima venditur, cum omnino ex naturæ animæ

fluat, bonum velle, malum averfari, & pro obtinendis hisce finibus

sequantur proportionati motus. Sed alias certe mutationes in ma-

chinis, alias in cadavere, utut adhuc corpore structo, alias in ho-

mine vivo quisquis reperit naturæ scrutator. Ergo valeat tantum in

machina; in physico vel structo corpore lex mutationis, minime vero sensationis. Cum enim ex propria confessione, & perpetua loquendi consuetudine, sensatio sit representatio rei in mente, aperte sequitur, absque mente sensationem nunquam poni posse. Sequatur ergo motus sensationem ex intentione animæ, sequatur illa volente vel nolente, vel conscia vel non, V. §. 7. 10. *Theor.* hinc ex lege circa unionem ipsius cum corpore divinitus stabilita, sequitur tamen. Interim fatentur omnes, corpus nostrum adeo apprimè dispositum esse, ut sensationibus ad tales determinetur motus, qui ad ipsius conservationem, & perfectionem veram vel imaginariam aliquid faciunt. Ii contra motus, qui non in nostra libertate plane positi esse videntur, non ad nostri perfectionem instituti forent, quando ex libero animæ arbitrio instituerentur. Cordis enim & thoracis motum plane tollere, idem esset ac vitam tollere. Sed vitam tollere, an ad hominis, qui ex animo & corpore constat, perfectionem tendit? Modesta erit responsio, si risu non comitatur. Interim & in actiones vitales animæ imperium patet. Singulare adducit Cheynæus in *english malady Domini Tomnsend* exemplum, qui pro lubitu cordis motum & respirationem suppressere, iterumque reassumere ante mortem potuerit. Nervorum, immediata animæ organa, ut omnium consensu vocantur, imperium in arterias uberrime confirmavit Perill. Hallerus in dissert. de eodem argumento. Mechanismi abusum merito damnat, finem potius sensationes sequentium motuum adstruit Cel. De Sauvages in annot. ad Cl. Hales hæmastat. edit. german. p. 182. 183. seqq. nec non in theoria inflammationum p. 309. 310. seqq. *Animam medicam* denique peculiari sermone demonstratam dare adlaboravit Cl. Nichols in Oratione Londini habita. 1750.

V. Cl. Maty. Journ. britann. Mart. 1750. Nos autem cum Nicholso minime plane idem sentire, neque similia ultra suum tertium, & ad ridiculum usque extendi debere, ediximus, in *Er-lang.* Gel. Anzeigen. 1750. N. xxxvi.

§. VII.

Ex finibus autem rerum, quatenus illos introspicere datum nobis est, & theologia deduxi potius rationem, quare hi potius quam alii sequantur sensationem motus, quoniam scilicet hic motus finibus §. 6. exsequendis generatim magis *conformis & conveniens* est quam alius. Non est, ut novum vel inanem terminum *motus finales* vocemus, vel eodem medico respectu non adsumamus. Perill. Wolfius in den *Absichten der natürlichen Dinge, & in den Gedanken vom Gebrauch der Theile im Menschen und Thieren* diu jam & egregie rerum fines indagandos ulterius demonstravit. Cl. Tralles in amplissima epistola de *machina & anima humana* contra *hominis machina* auctorem ultro finalium motuum dignissimam considerationem commendavit, pessimeque hanc sæpius omitti redarguit. p. 108. 109. seqq.

Sed quot sunt, qui optime præmissa concedunt & demonstrant, nihilo vero minus confectionaria negant? Cum autem finis sit principium *usus* alicujus rei vel etiam *abusus* p. *princ. metaphys.* Conf. Cel. Baumgart. *Metaphys.* §. 341. tum motus sensationem excipientes possunt esse proportionati, conformes, finibus, quando scilicet *abusi* organis licitum nobis esse credimus, vel imaginamur. Ipse Cel. Kruigeri elegans discursus de Pathematicum animi efficacia in C. H. in *diætica* sua p. 417. 418. aperte ea, quæ nos in *theoria toni* §. 14. not. b. p. 22. ediximus, confirmat, & demonstrat certe, motus in pathematicis animi oriri ob avertenda mala, & accersenda bona. Quis hic finem prævidere audebit? Ad prævisos autem *fines*, partes animalium fabricatas esse rectissime demonstrat Perill. Hallerus *Pral. Boerb.* Tom. IV. p. 616. not. y. Quis itaque non videt, *appetere* nos sub specie boni, *aversari* sub specie mali, & fluere hinc intentiones. V. *Theor. nostr. appetitus*. Appetere hinc & efficere valemus nonnulla, certo nobis nocitura.

§. VIII.

Neque ergo solum cum sensatione conjunctum partium C. H. fibrosarum, motuique dicatarum, motum plane mechanicum, neque optati non semper effectus, uti accidit, prævisi, finis confectionem sub proportionato sensationi motu intelligendum volumus. An etenim in *imaginationibus*, quæ tamen etiam utique representationis in mente sunt ac sensationes, occurrunt perpetuo irritantes particulæ? Quis adfirmavit? Et tamen *imaginationes* etiam sequuntur motus sensationi alias proportionati. *Theor. sens. & mor.* §. xi. Ergo philosophandum erat ulterius. Non autem ideo principium adsumendum erat, ac si nervi, tanquam sensationis organi, major minorve alteratio vel irritatio solum excitaret majorem liquidi nervei influxum, indeque pendentem majorem motum, & vice versa. Veri speciem præ se fert explicatio. Neque eandem, ubi par est, excludimus. Quo minus autem sola mechanica explicatio arridere possit, *imaginationis* historia & effectus vetant. Hanc autem pure mechanicè explicare, idem esset, ac petulantix honorem, quam lepidi scripti, *bomo machina* autor Julianus Osrai de la Mettrie, qui haud ita pridem, an mechanice, vel ex lege animali, sub judice forte lis est? motuum, sensationes & *imaginationes* sequentium, pœnam lepidus ipse medicus morte luit, affectare. V. Erlang. *Gel. Anmerk. und. Nachr.* N. III. 1752.

§. IX.

Vix mihi, per *leges sensationis & motus*, temperare possum, quin musculi faciei & respirationis risui inservientes in motum cieantur, quando cl. auctoris p. 21. instantiam, qua motum sensationem excipientem ex sola structura, atque ita pure mechanicè, explicare nititur, considero. „Equo jubet exhibere medicamentum emeticum, spasticos quidem & convulsivos musculorum abdominis motum sequi

cre-

credit, sed nullum vomitum. Hosce motus ergo non congruos esse autumat, sed rationem in structuræ diversitate esse quærendam, quæ efficiat, ut ventriculus eorum ab actione diaphragmatis & musculorum abdominis tali ratione comprimi non possit, sicuti in corpore humano fieri solet. " Fateor certe, me non invenire posse, quidnam roboris sententiæ cl. auctoris ex hac inductione accedere possit. An etenim emeticum medicamentum musculos tantum abdominales & septum transversum ad motum concitat? an potius ventriculus & intestinorum canalis primario irritantur? quæ ergo irritatio quando valida satis est, motum producit conformem, scilicet eundem, qui removere ingratam sensationem intendit, & hoc loco peristalticum motum inversum. Cum autem etiam sensatio sit uti organi sensorii alteratio, certe emetici dosis, quam homini propinamus, in validiore & crassiore equi ventriculo quando non æque tales motus producit ac in homine fieri solet, an jure hoc mirandum est? Proportionatam autem emetici seu veneni dosin in quadrupedibus etiam vomitus, nec solos diaphragmatis & abdominalium musculorum spasticos motus producere, testantur historiæ morborum boum, vaccarumque, eorundemque institutæ curationes. Immo in equis sæpiuscule ope hepatis antimonii producitur vomitus. Immo nisi, ob œsophagi, diaphragmatis & ventriculi diversum ab homine situ, semper oritur vomitus, sequitur tamen motus sensationi congruus, scilicet major seri & fluidorum congestio, qua ingratum irritans oblitur, & per alui fluxum educitur. Ajuvant hunc motum musculorum abdominalium ipsorumque intestinorum spasmi. Hæc est ratio quare ipse medicamentorum agendi modum ex sensatione §. 13. Theor. derivavi. Quando enim, uti loqui malunt, *medicamenta agunt pro receptivitate sui*, idem est ac si diceret: actio medicamentorum est sensationi, quam, dum recipiuntur, excitant & excitare queunt, proportionata, conformis. Nihil impedit, quod non semper motum sequatur effectus optatus. Et responsum jam est ad hanc objectionem §. 15. Theor. Neque ex ratione & raciotinio, sed ex sensationibus derivavi motus. Si denique motus est uti sensatio, confusas etiam sensationes turbulentas minusque salutaris oriri motus potest. Quanta porro est abstractionis, distractionis, consuetudinis vis? Explicanda hinc sunt phænomena, dum e multis & quotidianis fere observationibus præternaturalium conformationum, tumorum, prolapsium, excrementiarum, motuum ad extrema usque adsumtorum vel abolitorum, epilepsiæ puta & paralyseos & apoplexiæ, inferre volunt, motus finales esse non posse, quoniam magis ruerent in his & similibus casibus ad interitum, quam ad salutem corporis. Sed primo tamen intentio aliqua fuit, mutata deinde per varias causas, conf. & §. 7. *Alia etenim sensatio alium etiam motum excitat*, veluti pluribus exemplis hoc theorema peculiari dissertatione egregie confirmavit Cel. D. D. Weiss in academia Altorfina Med. Prof. publ. ord. Partium equidem structuram ejusque in determinandis motibus rationem lubentissime

agnosco. Necessariam etiam subjunxi parænesin circa usum principij §. 20. *Thor. sensat. & mot.* Neque in obscuris & abstractis rebus delitescere semper est animus: Pigrorum philosophiam odi & arceo. Veritates *physicas & anatomicas* me in explicanda doctrina de natura humana utilissime & jure acceptare, in prælectionibus philurisve academicis, nisi me omnia fallunt, demonstratum dedi, minime in alienam messem falce missa. Sed ea est, præ aliis, corporis humani vivi structuræ indoles, ut ad varios fines & effectus disponi mutarique queat, prout ratio fiendi illos exigit modos. Hinc præter elegantissimas *physicas, mechanicas & medicas*, alias etiam exposcit meditationes. Cum cadavere etenim, utut præsentem eadem structuram, res nobis in præsentem non est. Neque ad solam machinam seu structum corpus solum principium nostrum quadrat.

§. X.

At enim vero dissertationis adductæ cl. auctor nobiscum sæpiuscule adeo convenit, ut in locum contradictionis sæpe succedat uberior sententiæ nostræ confirmatio. Legenti mihi relegendique paginas, mihi, me theoriæ meæ periodos legere, in multis locis visum sum. Transcripta multa, mutata varia, mutuataque me observasse putavi. Secundum leges imaginationum & cogitationum, duo vel plures ad unum idemque theorema, ad unam eandemque demonstrationem pervenire queunt, absque plagii literarii suspitione. Mathematici sæpe uno eodemque modo solvere problema quoddam queunt. Sed loquendi formulæ certe tam variæ sunt, ut dictionis flumen, quando fere idem in diversis, diversoque tempore promulgatis, scriptis est, absque usurpationis indicio vix liberum existere possit, præstabilita etiam harmonia vix excusandum. Specimen autem convenientiæ dictorum meorum, & adductæ dissertationis hic exhibeo. (1)

§. XI.

(1) Dissertatio de lege naturæ quod in corpore animali sensatio nem excipiat motus sensationi proportionatus. Præside Celeb. D. D. Krugero Resp. P. S. de Chauffepie. Halæ. 1751.

§. VIII.

Animam autem cogitantem vel sibi aliquid representantem cogitare non possumus, quoniam ea ipsa est quæ cogitat; eodem modo ac quid lumen sit videre non possumus, quia lumen ipsa ut videamus causa est. Scite igitur & perquam apposite
dixit

Delius theoria & fecundus in medic. usu principij: sensationem sequitur motus sensationi proportionatus. Erlangæ 1749.

§. VII.

Cogitantis vero vim facultatem animæ explicare cupienti opus esset extra animam alicubi consistere, unde illam conspiciere & intueri liceret, ut perquam apposite loquitur Lancisius. Lumen autem proprie videre quoque non possumus, quoniam
lumen

§. XI.

Fœcundum in chirurgia ulum principii mihi in theoria me prætermisisse videor. Sed uberrimum ejusdem usum jam in prolegomenis

dixit Lancisius: cogitantis animæ vim & facultatem explicare cupienti opus esse, ut extra animam alicubi consistat, unde illam conspiciere & intueri liceret.

§. XXV.

Acre aliquid vel molestum, si in oculum illapsum fuerit, lacrymarum sequitur affluxum, qui semper eo major erit, quo fortior fuit sensatio a corpore in oculum agente excitata. Quid vere ad abstergendum oculum, & tollendum istam sensationem molestam est aptius, quam ipse lacrymarum affluxus. — Inter edendum aliquando contingit, vel inter bibendum aut ridendum, ut aliquid in asperam arteriam decidat, quo facto excitatur sensatio, hanc vero sequitur tussis, quæ quidem ad eliminandum illud, quod respirationem impediendo, molestam inducit sensationem, omnium est aptissima.

§. XXV.

Quanta & quam stupenda peragit anima in delirio, somno, noctambulatione, nihil omnino sibi conscia. An vero clarius ejusdem dari potest exemplum, quam illa celeberrimi Leibnitzii de anima numerante instantia. Representat sibi anima ope auditus harmoniam & differentiam sonorum, tonorum vero differentia consistit in diverso numero & celeritate trementis aeris. Si igitur varios discernimus tonos, numerum diversum, ac determinatam aeris trementis celeritatem numeramus.

Mi-

lumen ipsum causa est, ut videamus: hinc animam cogitantem & efficientem vix cogitari possumus, quoniam ea ipsa est quæ cogitat, quæ agit.

§. VIII. IX.

Eo plus lacrymabit oculus, quo plus corpus oculum tangens habebit acredinis, impetus, vis, coëssionis. & §. 9. Conveniens utique est motus, si ad acre vel molestum aliquid forte in oculum illapsum abstergendum oritur adfluxus lacrymarum. — Tussis oritur insignis, si in tracheam corpus peregrinum illapsum est. Oritur in trachea admodum nervosa sensatio, hanc sequitur motus sensationi conveniens, ut videlicet excernatur peregrinum corpus molestam sensationem inducens, liberamque respirationem impediens.

§. VII.

Quanta autem & stupenda peragit in somno, noctambulando, præjaciendo, delirando? nihilum sibi conscia, ad minimum in minimo claritatis gradu. — Notissima est & elegantissima Leibnitzii instantia de numerante anima, licet, quod numeret, non conscia. Audimus musicam: Representat sibi anima auditus ope harmoniam & differentiam tonorum: tonorum differentia consistit in diverso numero & celeritate aeris in tremulo motu constituti. Si itaque varios discernimus tonos, di-

nisi de chirurgia generatim §. 4. & in inflammationum nec non in aliorum chirurgicorum morborum §. 33. 35. doctrina speciatim innuit

Minime autem nobis quod numeramus consci sumus. Agit ergo anima actionis suae sibi non conscia, hinc videmus ideo minime negari posse sensationem, quia non satis vide eandem percipimus.

§. XVI.

Adsunt hic veritates universales, & quidem tales, quibus optime medicina contemptoribus, artis salutari incertitudinem perpetuo accusantibus obviam procedi posse reor.

§. XXXV.

Suppeditat autem nobis certa principia & firmas regulas, ex quibus rationales in therapia desumere possumus indicationes. Cum enim morbum curare nihil aliud sit, quam ejus causam tollere, facile quilibet videt, in morbis vel ab excessu vel a defectu motuum pendentibus, exactam requiri motuum notitiam atque causarum motus excitantium, si quidem medicus salutari suae intentioni cupit satisfacere. Hinc cum in morbis non semper motus pro ipso habendi sint morbo, sed potius pro remedio materiae peccantis, non motibus solummodo obviam ire medicus, sed potissimum causas illas motus excitantes tollere studebit.

§. XL.

— ingenio medico non conveniat hisce contentum esse, quod sciat tantummodo, motum excipere sensa-

diversum numerum determinatamque trementis aeris celeritatem numeramus. Agit ergo anima actionis primo intuitu non conscia.

§. XXI.

Perutile ego vero prater ea, principium nostrum iudico, quod opponatur medicinae contemptoribus, perpetuo clamitantibus, quod ars medica sit infida incertissimaque, ubi deficiant veritates, universales principia. — Adsunt hic veritates universales, & tales &c.

§. XII.

Quando in morbis animadvertes motus a sensatione molesti alicujus in economia vitali originem ducentes, & pro exturbando illo molesto institutos inventa molestae sensationis, hinc morbi causa secundum re. Ete formatas indicationes molestum illud sensationem & motum excitans removere, remoras & obstacula, quae impediunt, quo minus sensationi per motus satisfiat, quantum in potestate artis medica situm est, auferre adlaborabit, ita ut cessante causa, sic cesset effectus. Tali ratione ingenuus medicus motus in morbis non pro ipso morbo, sed pro remedio materiae peccantis habebit, neque motibus solummodo obviam ibit, sed causas sensationem & motum excitantes eruere easque tollere studebit.

§. XX.

Supere est autem prater ea, quae §. 10. dicta sunt, indicasse, quod ingenio medico non sufficiat adsumere legem

auit, & confirmat etiam post fata Cel. Platnerus in *institutionibus chirurgiæ*. Locupletissima autem edocti experientia ultro confirmare valemus, quodsi inflammationum vehementia ad gangrænam sphacelumve usque processerit, vel ejusdem eventus non expectationi satis fecerit, certe molestissimam quandam in vulnere seu loco adfecto sensationem e. g. sensibiliorem cujusdam partis alterationem, nervi puncturam, periosteï læsionem, sanguiferorum vasorum, tendinum, lacerationem vel compressionem, irritationem a fracti ossis aculeis & fragmentis, a medicamentis acribus vel incongruis, &c. excitasse motus, acerbæ sensationi proportionatos; remotis autem causis sensationem excitantibus, sublatum esse etiam motum, sæpius pro ipso morbo, & injuste satis, habitum. Felix ergo, qui poterit rerum cognoscere causas. Si ad curandum demum non plane sufficiet, sufficiet tamen medicus ad dignoscendum & ad demonstrandum, nihil fieri sine causa sufficiente & determinante.

§. XII.

Alius ergo motus erit, qui ex naturæ fibra sensationem individuus comitatur, alius qui eandem excipit. Hic finalis erit. V. Theor. Ton. §. 4. 5. 9. De febrilium motuum causa conf. Erlang. Gel. Anzeigen. 1749. n. 45. & 46. Fines autem provide admodum determinare, eoque sollicite investigare oportet, neque effectus & eventus semper pro intento fine habendus erit §. 7. 9. Errabit ergo, e. g. qui, ut sæpe fieri solet, in sanguinis auctiori motu hæmoptysin subvenientem pro sapienter instituto & finali motu semper habere velit. Accidit autem, quando minus caute ratiocinantur. Monendos ergo serio judico medicinæ cultores, ne fines, quos nunquam intendit natura, pro salutaribus habeant, hosque omni opera invenire vel sibi fingere & magno ægrotorum detrimento attingere studeant, sed potius discant, quo vergat natura, ut eo eam ducant, memores autem simul alius

sationem, sed potius anniti debere, ut cognoscat cur magis bi quam alii sequantur motus. Quod quidem diligenter in structuram inquirendo, & ubique &c.

legem nostram veram & secundam, & tum adquiescere & torpescere otio & socordia, immo studio ignorare velle, quæ ad intimiorem corporis cognitionem pertinent, sed cognita hac veritate summa ope niti debet, ut diligentissime in organa structa modosque inquireat, quibus magis bi motus quam alii sensationem sequantur.

Præfat.

Sufficit ad illius laudem, si demonstravero, illam esse vinculum, ejus ope Stahliani medici cum mechanici conciliari possunt.

§. XXI.

Perutile judico principium, quo diversa medicorum secta in posterum possunt combinari.

alius Hippocratis effati Lib. VI. epid. S. VI. n. 21. *Reuellenda ea sunt, quæ quo non oportet, vergunt &c.* Quantum ergo interest, ut existat *medicus naturæ dominus*, qui alias *naturæ minister* salutari foret! Animi autem ipsa pathemata

--- quo non mortalia cogunt
pectora?

§. XIII.

At enim vero, cum *motus* vel sensationem excipiens, vel cum eadem necessario conjunctus, absque *fibræ animalis* mutatione concipi nequeat; ex hujus fibræ structura, qualitatibus & mutationibus *functionem* explicandam esse, recte judicatur. Sed de fibrarum constitutione & actione adhuc ambigunt. Verissimum est, fluidorum mutationes magna ex parte a solidorum qualitatibus pendere. Fibrarum enim cohesio, tensio, elasticitas, robur, directio, situs, connexio, sensibilitas, mutationes determinant. Hæc ratio est, quare olim & nunc ingenui medici de fibrarum vi motrice evoluenda & determinanda jure meritoque solliciti fuerint. Sed in varias eos abire sententias videmus. Phænomena enim fibræ vegetabilis & animalis, sæpe & metallicæ elasticæ, generatim, ad functiones corporis humani vivi unde multi applicant. Ex *tono physico* fibrarum actiones deducunt, quem determinatum mollitiei, flexilitatis & elasticitatis gradum vocant. V. Ill. Hambergeri Physiolog. med. §. 47. n. 1. Vi hujus toni non solum constanter ad contractionem tendere, sed omni vi istas extendenti resistere docent. Ibid. l. c. §. 84. I. Coll. ill. & de philosophia naturali diu immortaliter meriti, Hambergeri *Elem. physici*. §. 190. 191. Sed quo minus tonum fibrarum physicum, seu earundem elasticitatem, cum contractione in corpore animali vivo plane eundem facere queamus, impediunt rationes in nostra toni theoria passim, præcipue §. 9. 14. adductæ. Sed *vitam* tamen merito admittit *tonum*, a *physico* distinctum, Ill. Hambergerus §. 85. Dum *vita* §. 16. 38. in actionum autem exercitio consistit, quæ tandem exercitii hujus ultima causa? Certo adeo simplex, ut propterea forsân prætervisa sit. An plane nihil probat ratiocinium: Si B semper est, si A est, & B non est nisi A sit, ut ideo A sit causa B, si præcipue nullum C adsit, quod causa esse possit? Facilis applicatio in concreto. Quantum porro discrimen actionis *fibræ mortuæ*, in qua elasticitatis gradum quendam adhuc adsumere oportet, & *vivæ* adsint quotidie experimenta docent, quæ constanter confirmant, *tonum* potius *vitam* magis in perpetua & determinata hujus tensionis & elasticitatis administratione, prout res & fines exigunt, consistere.

§. XIV.

Majori ergo jure inter actiones sic dictas vitales, præter circulationem sanguinis & humorum & respirationem, numeramus *tonicum motum*, quam *calorem*, uti cum veteribus nonnullis placet, quod ab Ill. Hambergero factum esse, in *Physiol. med.* §. 1639. observamus,

mus, ita ut Vir Celeberrimus ab antiquissimis temporibus usu receptam divisionem conservare tutius esse putet, quam sine ullo commodo novam introducere. l. c. §. 1640. In aprico est scientiæ medicæ incrementum, ex actionis partium solido molliorum C. H. theoria derivandum. Majori ergo jure sibi vendicat, repeto, locum inter vitales functiones *tonus* quam quidem calor, cum præter actionem salium & sulphurearum particularum, earundemque attritum, motumque intestinum, ipse fibrarum *tonus* hæc mutationes, humores movendo, producere, *caloremque* generare debeat.

§. X V.

Sentientes sunt corporis humani vivi fibræ. p. exper. Non videmus ergo, quomodo a *sola* cohesionis & elasticitatis mutatione rationem functionum excitatarum vel remissarum reddere valeamus. Ex actione autem *spirituum* sic dictorum animalium, seu liquidi nervei fibrarum actionem, determinant. V. Ill. Hamberg. *Physiol. med.* §. 1350. 1640. & ex hujus absentia vel defectu immunitas actiones derivant, hinc & *somnum*, l. c. 1361. Quando autem demonstrari potest, partim fluido hoc nerveo in copia præsentem oriri posse *somnum*, & multo adhuc magis imminutas actiones e. g. in apoplexia, catarrho suffocativo; partim in defectu hujus liquidi nullum omnino sequi somnum, tum fundamento non adeo gavisam esse hanc theoriam facile apparet. Sed ipsa animi pathemata arcent somnum & inuitant. Unde generatur tam cito, ea quæ par est, liquidi nervei culpa, e. g. in medico gratos carpente somnos, quodsi noctu subito ad ægrotum vocatur, & recte negotia gerit? An forte *algebra* & *calculi differentialis* studium in minus aduictis penuriam spirituum producit, quando hi præ curarum & meditationum gravitate obdormiunt? An lectio libelli vel carminis ignobilis minusque libati spiritus dissipat, quando obdormientis lectoris tremula manus, quæ comprehendebat, dimittit? an in bene pastis, curarum expertibus, phlegmaticis, succis laudabilibus plenis, facile dormientibus, est liquidi nervei defectus? An nutricis cantus in infantulo animales spiritus seu fluidum nerveum ita dissipare poterit, ut a denegato hujus influxu somnus oriatur? an inopinatus nuntius, grati amici adventus consuetum alias meridianum somnum, spiritus p. *hypoth.* deficientes invitando iterum, arcere valet? an murmur aquarum, venti susurrus, pluvie strepitus in fugam vertit animales spiritus, an potius irritationem & excitationem, hinc hypothesi contrarium, producit? Instrumentorum musicorum concentus & somnum invitare & ad vigilias & ad saltationes stimulare poterit simul? An potius omnia ex representatione grati vel ingrati derivanda sunt? ita ut, vel alta securitas mentis, vel etiam objectorum, laborum, cogitationum fastidium activitatem minuatur, vividæ e contrario representationes eandem intendunt. Rusticus Corydon, alto somno sepultus, non suavi avium

cantu, non orientis solis radiis excitatur, sed læto ancillarum clamore paratum esse jentaculum.

Forte autem, si non absentia, tamen fixatio & denegatus, seu a laxitate partium & præsentia oleosorum, glutinosorum &c. particularum oriundus, spirituum influxus, vel a vario fibrarum tremore mutatus, dispersus, somni causa erit? Sed nonne ex repræsentationibus & imaginationibus novus oritur spirituum influxus? eorumque decens fluiditas? *p. hypothes.* Quid autem est, quod sentiat, sibi repræsentet, imaginetur? Unde *Somnambulorum* tanti motus musculares, qui sine liquidi nervei influxu *p. hyp.* actuari nequeunt? Certe nisi ex repræsentationibus in mente, ex sensationibus motus simul deducimus, labefactatur facile motuum corporis humani vivi theoria. Ibi enim, ubi desinit physicus, incipere medicus debet.

§. XVI.

In locum autem *toni* & sensationis, quæ sit tensorum fibrarum ope, succedere videtur *irritabilitatis* theoria. Germanico idiomate vocant: *den Reitz*. Hanc *perill.* Hallerus in *prim. lin. physiol.* Edit. II. §. 408. Novam & ab omni alia *battenus* cognita proprietate corporum diversam vim vocat. Mutavit in altera Physiologiæ editione sententiam Vir *perillustris*. Quam enim in priori editione eodem §. rectissime posuerat *contractionem vivam*, quæ ab ea vi, quæ omnibus partibus insit, omnino differat, ejus in altera editione eodem §. mentionem plane non facit. Et recedit ab illa contractionis fibræ theoria, quam in *commentar. ad Prælect.* Boerhaav. Vol. III. p. 403. statuit Vir. *perill.* ubi non paucos anatomicos iustissimo argumento redarguit, quod *naturalem* contractionem fibræ muscularis *confundant cum vitali*. Et errorem merito vocat. Et Galenum jam *bene olim* utrasque contractiones separasse laudat. *Irritabilitatem* autem vocant, quando corpus ex irritatione contrahitur: & ab *elate* hanc proprietatem distinguunt.

§. XVII.

Vix errabimus, si ex tot in vivis mortuisque animalibus institutis experimentis Virum acutissimum judicamus novæ theoriæ operam dedisse. Et fateri fas est, præclara sunt & operosa & primo intuitu certissima experimenta, ob fibræ animalis historiam facta, & indubiæ videntur inde profectæ conclusiones. Magna ex parte facta pericula propria, & Excell. Halleri experimenta cum publico communicavit D. D. Zinn in dissert. de experim. circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem; & haud ita pridem D. D. Zimmermann in diss. de Irritabilitate, licet Baglivi olim, nostris, aliorumque experimentis sæpe numero contraria. Neque diffiteor irritabilitatis etiam vocem & theoriæ arridere posse, si eam præcipue commendet seculi genius, & regnans dicendi mos. Sed quo minus irritabilitatis theoriæ plane nostram faciamus, multa prohibent argumenta.

§. XVIII.

§. X V I I I.

Non est ut multis comprobem, quanti semper fecerim & jure faciam Virum perillustrem, Virum, in quo tantas animi dotes, locavit cœli benignitas, Virum, quem, dignissimum laude,

--- *musâ vetat mori*

multaque ejus pars vitabit libitinam.

Pro me etiam communis & publica vox, quæ in omnium ore est, merito loquitur. Sed ex ingenuo animi candore facile feret Vir perill. si ad evolvendas magis & confirmandas veritates nonnulla moneo. I. Violentiam & præternaturale quid, tantum non semper, involvunt experimenta, ex quibus ad naturalem C. H. mutationem non tuto concludere licet. *Coactio* adest. Concedatur *libertas*, alia erunt phænomena. II. Exposcitante omnia & præsupponit habilitatem dicta proprietates ad producendam irritabilitatem, quæ utrum in alia hac in *tensione* determinata & *tono* consistere possit maxime dubito. III. Manifesta inter *sensibilitatem* & *irritabilitatem* oritur, hinc notionum, confusio, quam autem fugere rectissime jubet philosophia. Irritabilitas enim in mortuo corpore superest, non autem sensibilitas & rei vel mutationes præsentis sensatio. Mortuus non mordet. In tune porro, chorda tensa, planta, obtinet irritabilitas, sed quis sensibilitatem stricte sic dictam absque loco hic statuminabit? IV. Manca admodum est ipsius irritabilitatis historia. Dum enim aperte fibræ contractionem forte non animadvertimus, tum in hac, vel illa parte ejusdem existentiam plane vel in tantum negare velle, nimis durum mihi videtur, veluti in citata dissertatione & apud *perill. Hallerum physiol.* §. 408. de membranis, nonnullis visceribus, tendinibus, factum esse video. Si enim irritabilitate destituuntur, etiam sensibilitate, *per hyporhesin*. Jam quæso quid est *dolor*, manifesto in visceribus aliisque partibus adfectis, vulneratis, præsens. An forte alia, adhuc & nova fibræ proprietas dolor absque irritabilitate, sensibilitate? An inanes sunt rationalium chirurgorum dogmata de periculo vulnerum & læsionum partium tendinosarum, aponeuroticarum &c. V. *Platner. Chirurg.* §. 426. 428., an omnino vanæ morborum historia? an tantopere fallax experientia? An solum ex adfectis, una, cum tendine, membrana, nervis, dolor? an inflammatio, gangræna, a sola sanguinis extravasatione circa læsas exsanguis partes? Sed sanguinis adfluxus oritur, & inflammatio, absque læsione sanguiferorum vasorum, irritatis tantum dictis partibus; & cessat, his ab irritante objecto liberatis. Certe serio attendendum est hujus irritabilitatis statoribus, ne ex hac doctrina minus periti medici & chirurgi conclusiones deriverent, in *praxi medica & chirurgica*, in *medicina legali*, minus salutares. V. Minime nova jactanda est irritabilitatis proprietas. Quam enim vocem, sæpiusculum autem synonyma, jam olim usurparunt, cujusque notionem in explicandis partium solidarum phænomenis adhibuerunt, ea novitate quadam sese amplius

commendare vix potest. Longus admodum catalogus foret, si a *sesta methodica*, quæ perpetuo stricti & laxi mentionem facit, conf. *Stolæ Histor. med.* p. 526. 527. neque obscure jam contractilitatis fibræ rationem habuit, initium facientes, a Galeni porro temporibus ad nostra usque progredi placeret, & omnes enumerare visum foret, qui in fibræ animalis hanc proprietatem sedulo inquisivere, quorum tamen longam seriem ipse jam Perill. Hallerus in locupletissimis accessionibus ad Boerhaav. *method. stud. med.* p. VII. sect. I. seqq. & addend. descripsit. *Oscillationis* autem & *elateris* consueti termini, ut horum tantum mentionem faciamus, certe nihil aliud indicant, quam quod per irritabilitatem explicare nunc alii satagunt VI. Neque, dum irritabilitas per fibræ contractionem explicatur, uti id in aprico est, motus negotium omne absolvitur. Si enim ex irritatione contraheretur tantum fibra, nonne sphincterum, ostiolorum actio excernendis humoribus viam perpetuo præcluderet? Intestini recti sphincter adductam sæcram materiam ex irritatione contractus perpetuo sursum premeret. Ergo opus est *alterna* fibrarum contractione & relaxatione ad motum animale, prouti diversi fines & sensationes variæ & intentiones eam exposcunt. V. *Theor. nostr. toni* §. 9. VII. Actionem fibræ ab influente liquido nerveo deducere conati sunt. Vid. de Haller *physiol.* Ed. II. §. 392. Neque id in totum nego, confirmo potius certo respectu l. c. §. XI. Sed cum sine cerebro, liquidi nervi fonte ac origine, etiam tensæ & irritabiles maneant fibræ, Vid. Haller *præl. Boerb.* T. IV. p. 615. & l. c. §. XIII. tonus partium, *vitalis* non solum ab influente liquido nerveo derivandus est, neque hæc tantum differentia eundem a *physico* satis distinguit, licet reallem tamen distinctionem agnoscat, & inde probare laudabili studio nitatur *Cel. De Gorter Comp. med.* P. I. *Trat.* I. §. 17. 18. Altioris ergo indaginis est. VIII. Cavas esse nervorum fibrillas pene certum esse credit Perill. Hallerus *Physiol.* §. 390. & cerebri medullam fistulosam §. 393. & nervosos tubulos, *ibidem*, & liquidum nerveum separari in fistulas nerveas; neque tamen has fibras vasculosasque, corticis cerebri propagines §. 387. in quibus vehatur liquidum, *solidas* vult §. 386. 387. 388. Sed *vasa*, nisi solida sunt, an liquida, vehere poterunt? An solvet dilemma, qui neque solidum, sed tertium forte aliquid constituet? An contradictionis omnino expers est assertio? sed nervorum tubulositas minime extra dubium posita est, neque soluta sunt dubia, a Gohlio in *Ged. von den Nerven. Geistern* prolata. Porosa adesse fibrarum nervearum interstitia, ad formam, forte ellychniorum, inflammabili fluido persfluorum, non negabimus; Si autem tubulositatem concedere oporteret, certe tubuli continentis actio absque continuitate & soliditate explicari nequit. Et Lecuvvenhoekius in examine nervi cyprini, si numerosissima & summæ tenuitatis vascula observavit, hæc tamen suis involuta membranulis solidis vidit. Irritabilitas porro, a liquido moto profecta, si in contractilitate consistit, neque tamen nervæ fibræ solidæ sunt, p. *hypoth.* §§. supra

supra citat. fluidum certe irritabitur. Ergo fluidum irritabit fluidum: Jam in fluido partes perquam difficulter cohærent, admodum parva vi a se invicem separandæ; p. princ. physc. unde ergo vis pendet, quæ fluida, seu mollia parum coherentia, irritet & ad contractionem sollicitet? Quis finis tandem circuli? Medullares ergo nervorum fibræ nisi solidæ sunt, solida erit membrana, filamenta cingens. Sed hujus indispensabilitatem, sit venia verbo! ad motum, monstravi in *Toni theor.* §. XI. Hæc aperte contrahitur, cum ex hac contractione in dissecto nervo medulla in tuber expellatur, licet tali ratione nervum præ laxitate paulo longiorem reddi videantur perill. Hallero I. c. §. 388. Hæc constituit una cum medulla nervum, neque sine hac nervum cogitare oportet, *theor. ton.* §. cit. Non obstat, quod vana omnia a Cel. Hallero §. 340. dicantur, quæ de motu duræ matris dicta sunt, & quod absque nervis sit. Absque nervis enim esse posset, quia illa ipsa est, quæ nervis dat complementum. In sano vel vivo homine certe, uti *trepnationis* historia docet, separabilis in multis locis est exterior ejus a cranio lamina. Interna autem, quæ non assidet cranio, facilius adhuc contractilitatis libertatem nanciscitur. Manet ea libertas, cum membrana hæc medullares fibras, e cerebro, cerebello, medulla oblongata, spinali medulla egressas, perpetuo comitatur, & ubi forte non animadvertitur, certe ejus vicem pia mater, seu tela aliqua dura cellulosa supplet. Haller §. 379. Ex solido ergo enata contractilitas in majus, meliusque procedit. Convenire facile me puto, cum Cl. Wintero Lugdunensium Professore Cel. in dissert. de motu musculorum 1736. & in aliis dissert. ad ejus mentem editis e. g. Lups de irritabilitate. 1748. Manitiis de Idiosyncrasia ex diversa solidorum corporis humani irritabilitate optime dijudicanda. 1750. Sed nondum systemati nostro ultima adnota est lima. IX. Vehementer autem miror, tantopere solam irritabilitatem in corpore humano existimari, indeque motuum rationes derivari, cum prona admodum sit hoc modo systematis D. de la Mettrie in, *bomo machina*, libello, confirmatio; quod insautum tamen systema diruere adlaborarunt merito. Et utinam sibi perpetuo constarent! Sed protestatio, facta contraria est, quando illius theoriam damnant, nihilo vero minus easdem proprietates partium, ac ille e. g. c. p. 75. 84. 85. omni ope demonstrare, & applicare nituntur. In multis quidem paginis vir doctus Cl. Tralles animam contra hominem machinam, qua medicus, defensurus, rem minus provide gessisse videtur. Aurea sane non sunt verba quæ p. 224. epist. de mach. & anim. hum. profert. Non spectat ad medicum anima. Quicquid potest medicus, id potest machinæ ope &c. Nisus forte Boerhaavii auctoritate, qui fere eadem in *Instit. med.* §. 28. 696. 697 dixerat. Sed notatum jam est effatum in *diff. nostr.* de Catalepsi. 1749. §. 7. Et contra Cl. Trallesum monuit varia anonymus in *Act. Erud. Lips.* Jun. 1749. p. 319. seq. etiam quoad statuminatam vim fibræ propriam, ex ejusdem fabricæ solum pendente. Nollem alios & magni nominis philosophos

& medicos ita fere sentire, ut consensus eorum cum rejecta De la Mettrie theoria haut difficulter ostendi posset. Facile autem accidit, si nullum inter fibrarum *physicum* motum & *vitalem* admittere, neque hominem secundum *physicas*, *mechanicas* & *animales* condiciones simul considerare placet. Si eadem illa est irritabilitas in corpore humano vivo, quæ adest in mortuo, uti id asseritur, quare statu, injectione, calore &c. suscitatus motus cordis non perdurat? quare non sequitur in irritato cadavere *Sugillatio*? V. dissert. nostr. de *sugillatione infanticidi signo*. Hic certe inter irritabilitatem & motum nulla est proportio. Inter sensationem autem & motum evidentissime adest, per superius demonstrata, quoniam in sensatione longe aliud quid adest, quam ad irritabilitatem habilitas. Sensationem vero absque representatione rei in *mente*, varia tamen, hinc absque mentis cum corpore unione, cogitare, nisi per jocum, impossibile est. Monendi autem mihi medicinæ cultores jure meritoque videntur, ut dum propagari & defendi videant talia dogmata, hæc non statim sua faciant. Magni æstimanda est sentiendi libertas. Ridicula mihi semper & acerrime perstringenda opera visa est, quodsi anxietas, inter suspiria sæpe, & studio terribiles elicitæ sunt ex nonnullis principiis consequentiæ. Sed sponte ex adductis fluentis consulto prætereo. Negandum autem merito duco, & jure pernego, ad medicinam nullo modo pertinere animam. Medicina, ex eleganti Heurnii effato, non in solius corporis, sed *hominis*, qui ex animo & corpore constat, cognitione versatur. Mallem ergo cum Aristotele sentire, & uti ille medico suo olim dixit: *Cura me ut hominem*, sic illud medicis inculcare, ut, ægrotos etiam *homines* esse, non obliviscantur. Licet enim *medicina* in solum corpus agere videatur, tamen neque hoc plane verum est, exemplo narcoticorum, inebriantium, & *phantasticorum* medicamentorum, uti peculiarem horum classem constituit Cel. Linnæus *mat. med. prolegom.* neque hoc minus *medicus*, philosophus præcipue, positive partim & psychologicè nexum veritatum, operationum demonstrando, adhortando, persuadendo, excitando, pathematum animi prudenter rationem habendo, remote partim, obstacula morboſa, mentis functiones impediencia, removendo, mentem curat. Licet porro etiam hoc per medicamenta in corpus agentia, effici videatur, irrita tamen sunt omnia, quodsi ipsa mentis attentio medicamentorum effectum minuit, eludit, voti scilicet compos tantum fieri cupientis. Mœrore pressum, utut spisso sanguine & partium atonia laborantem, V. Dissert. nostr. de *vena cava plena malorum*. Certe nulla resolventia, roborantia, analeptica resistunt, quod facile potest fortuna redux. *Deliriosorum*, *melancholicorum*, *maniacorum* tumultus admodum attentum medicum faciant, ex his enim, uti quoque ex *insomniis*, sæpissime corporis statum cognoscet. Sed deliria, insomnia, sunt mentis adfectiones, ergone ullo modo ad medicum pertinet animæ consideratio? *Pulsus amoris* in febre hæcticoidea medico rationali iustas subministrabit indicationes, atque dum

--- nullis amor est sanabilis herbis

is

is certe misellos ægrotos nullis Galenicis neque chymicis excruciat phar-
 macis. Sed restituet etiam consuetas animi functiones, tollendo
 peccantes materias, eo quidem ordine & gradu, quo hæc per animi
 pathemata productæ sunt. Venereor certe Boerhaavianos cineres, &
 a virro summo conditum systema; sed quo minus, præter alia, cum
 eo plane eadem *Instit. med.* §. 696. 697. & prælect. Tom. VI. p. 13.
 14. sentire possim, res ipsa docet.

§. XIX.

Prurigo voluptati adfinis est. Et voluptas & dolor in eo conve-
 niunt, ut in utrisque sit major nervi irritatio. Perill. de Haller *physiol.*
 §. 551. Adfinēs ergo mutationes, diversas tamen sensationes produ-
 cunt. Sed vis contractilis, ad quam omnis motus in homine perti-
 net, ne requirit quidem animæ præsentiam, ex sententia & ipsissi-
 mis verbis *ill.* Halleri l. c. §. 562. Ergo dolor & voluptas non am-
 plius requirunt animæ præsentiam. Ergo conscientia voluptatis &
 doloris, grati & ingrati, erit forte in ipsa fibra. Ergo -- sed odio-
 sa sunt consuetaria, &

præstat componere finctus.

An vero ideo materialissimi suspicio inde deletur, si, irritabilitatem
 a minimis fibræ partibus pendere, statuere malunt? ultima autem,
 corporum elementa, *monades*, ex Leibnitii sententia, entia simplicia
 sunt, & vi quadam gaudent insita. Hinc irritabilitatem ex functione
 monadum forte derivant, ita ut per universam naturam, in regno
 præcipue vegetabili & animali, ea regnet, & gradus tantum admit-
 tat, qui fortassis in homine supremi vel maximi sint. Sed nondum
 licet hisce calculum addere, vel *irritabiles animas*, & *irritabiles fibras*
 habere pro iisdem.

§. XX.

Sæpiuscule, sed non ad nauseam usque, disputatum est de ma-
 teria, ob quam animadversiones hæc exaravimus. Neque recoquere
 omnia quæ disputata sunt, vel addere quæ disputari possent judicavi-
 mus. Facile litem neque a nobis, neque a sæculo plane componen-
 dam fore, prævidemus. Sed in re tam ardua & nobili & magnæ mo-
 lis & eximii fecundissimique usus omni ope niti decet, ut notiones
 nobis conciliemus, quantum fieri potest, distinctas & adæquatas &
 completas. In verbis autem faciles quatenus esse possimus, quilibet
 videt, quando in re ipsa conventum prius est, neque notionum ori-
 tur confusio, & turbatur conclusionum flumen. Non *Pilaris*ni reos
 esse eruditos, illud ο γεγραφα γεγραφα perpetuo repetendo, decet,
 si sufficientes adfuerint rationes, neque obstat electæ & receptæ hy-
 potheseos præjudicium, ad mutandam sententiam. Non autem aliud
 fuit laboris & consilii mei institutum, quam quid verum rectumve
 sit investigare. Verum ea propter veniam me impetraturum esse con-
 fido, quando a magnorum virorum, quos omni mea laude superio-
 res

res merito judico, sententiis recedere minime illicitum fore mihi persuasi. Hoc est in votis, ut omnia ad rectæ rationis dictamen evoluta & dilucidata & apposite satis, dicta essent. Non natura naturæ, non virtutibus virtutes contrariæ erunt. Nunquam aliud natura, aliud sapientia dicet. Æquos & ingenuos judices spero. Primus autem ero, qui sententiam mutabo, & melioribus lubentissime assensum præbeam, si nulla amplius dubia animum vellicabunt.

T A N T U M.

Præcipua in Halleri irritabilitatem Argumenta deprompta ex lib. Animadversionum in Doctrinam de Irritabilitate &c.

HENRICI FRIDERICI DELIJ ERLANG. MED. PROF.

- I. **V**iolentia fere semper in experimentis adhibetur. Ergo inde ad naturalem mutationem non tuto concluditur.
- II. Negari nondum debet nonnullarum partium irritabilitas, etiamsi fibras aperte in his contrahi non videas; imo inflammatio, gangræna, quæ in his partibus aliquando oriuntur, adnotant & has quoque partes posse irritari.
- III. Halleriana hæc irritabilitas nova non est, sed jam olim ab Hallero ipso Auctores plurimi hujus rei inventores designabantur.
- IV. Ab influxu fluidi nervei eandem pendere jam olim ipse Hallerus docebat.
- V. Hac ipsa data irritabilitate proprietates partium a D. De la Mettrie inventæ, jamque ab aliis destructæ reviviscunt. Ergo cum erronea secta consentit Hallerus.
- VI. Si irritabilitas ab anima non pendet, cur homo mœrore diuturno pressus, quem nulla resolventia, roborantia, analeptica restituerunt, facile adeo fortuna reduce sanatur?
- VII. Dolor quoque, & voluptas, quoniam ab irritabilitate pendent, minime juxta Hallerum animæ præsentiam postulabunt. Quod tamen absurdum est.

EX DISPUTATIONE
JOSEPHI VILLES AVOYE
ARGENTINENSIS

SUB TITULO

OBSERVATIONUM MEDICO-CHIRURGICARUM

PENTAS

Habita &c. Preside

D. HENRICO FREDERICO DELIO

OBSERVATIO V. DE PROMPTA

Magnum circa tibiam vulnus cum dolente admodum periosteo.

Triginta annorum miles, robustus, temperamentum sanguineum, jam operarii vice fungens, cum in principis horto tectum aliquod, quo hyemali tempore, citræ, aurantiæ, aliæque complures arbores exoticæ ad avertendam frigoris injuriam, obtegebantur, una cum alijs operariis dissolvere, atque vernali tempore, remove vellet, ex improvviso XV. asseres, tecto solutas & descensu proximos animadvertit, quos retinere volens genibus comprehendit. Ita autem constitutus, rumpitur infortunio ejusdem gradus. Jam ex proprio pondere oriundum lapsum effugere, genuaque novo fulcramento firmare volens, asseres, resistentia, quæ genuum opera fiebat, sublata, genu miseri nostri feriunt, & ad tibiam voluntur. Hic integumenta communia cum musculis gastrocnemiis & solæo ita a tibia solvebantur, ut ab ejus superiore ad mediam usque partem, & ad transversos binos digitos ultra, ubi plaga terminabatur, X. digiti transversim numerari possent. Intra os, & musculos spatium, quod manu vix repleri poterat, oriebatur. Ab ipsa quoque tibia periosteum, prope circa hujus ossis spinam, ad trium transversorum digitorum latitudinem solutum, atque os nudum erat. Hæc periosteæ portio cum reliquo illaso in inferiori plagæ parte adhuc cohærebat. Hæc erat vulneris conditio, cum ad ægrotum, qui interea in nosodochium translatus erat, vocarer. Actum tum vulnus spiritu frumenti tepido eluere, atque complures sanguineos grumos remove jussi. Deinde ulterius inquirebam, utrum arteria tibialis sanguinem funde-

Suppl. Part. II.

K

ret,

ret, unde postea forte hæmorrhagia periculosa metuenda sit. Hoc autem non eveniente separatos musculos adducebam, ipsumque largum vulnus suturis tribus revinciebam. Os periosteo orbatum, & casu jam jam alteratum, ne amplius corruptioni redderetur obnoxium, plumaceolis aqua vulneraria imbutis, reliqua autem tibiæ pars splenis spiritu camphorato madidis tegebatur, atque omnis apparatus fascia uniente seu incarnativa firmabatur. Porro venæ sectio instituebatur, & potio temperans præscribatur. Versus decimam horam vespertinam pulsû ægroti pleno & celeri reperto, vena iterum secabatur, & splenia discutiente spiritu denuo irrorabantur. Altero die, hisce non obstantibus, plagam admodum inflammata, tumida & dolorosa reperiebatur. Tertia itaque vice vena pertundebatur. Versus vespèram, eadem de novo instituebatur cum pulsus frequentior fuerit, enema injiciebatur, & *Ptisana emulsiva nitrata* propinabatur. Dolebat autem vehementer vulnus, præsertim ex iterata ægroti relatione, *ea periostei portio, quæ ab osse soluta fuerat, atque cum reliquo adhuc cohebat*. Jam factas per tractam acum suturas dissolvebam, cum plus vulnus irritare, quem opem ferre animadverterem & fascia contentiva utebar. Quinto & sexto die in tabum fere vulnus præ supuratione disfluebat. Cutis autem colore naturali destituebatur, nigricans evadebat, quæ, uti in incipiente sphacelo legis est, tractabatur, quo factò dolores, præcipue periostei magis remittebant. Os autem nudum, bis per diem provide deligabatur, & tinctura e *spiritu vini rectificatissimo, ess. aloes, myrrb. fovebatur*. Cum collisa ossa veluti rostrum, facilius exfoliationem admittant, in casu præsentis applicationem perforantis instrumenti alicujus, vel trepani, minus necessarium duxi. Sola dicta tinctura sufficiebat. Intra enim, quattuor hebdomadam spatium collisæ ossis partes extolliebantur, os novo periosteo, novisque carnibus tegebatur, jam vero ægrotus Deo benedicente plane restitutus est.

EPICRISIS.

NOstris temporibus sensibilitatem nonnullarum partium corporis humani negatam esse constat inter omnes. Inter has periosteum numeratur, quod omnino pro indolente reputatum est. Vir. Ill. de Haller Comment. Soc. Scient. Gotting. Tom. II. pag. 114. & seq. Multa contra hanc opinionem monita sunt, veluti a D. Præside, in *Animadvert. de irritab.* Erlang. 1752; deinde a Cel. le Cat in *dissert.* qui a remporte le prix proposé per l'academie royal de Berlin 1753. dans le memoire pag. 112.; porro a Cel. Bianchi *Taurinensi* in epistola sulla sensibilita, ed irritabilita delle parti negli uomini, e ne' bruti, in risposta d' altra lettera scrittali del D. G. B. Bassani Prof. med. Romano; & nuperrime a D. C. C. Kravse in der *Abbandl. des H. v. Haller, verdeutsetzt und gepriest.* &c. Lipsi. 1756., neque proposita dubia sublata satis sunt, quamquam id Cl. Tissot in versione galli-

ea dissertationis Hallerianæ Laufann. 1755. ex parte, sed minus rite, tentaverit. Certe unicuique, qui inspicendis, diligandisque vulneribus quotidie occupatus est, permulti casus obveniunt, ex quibus compluribus nostrum recentiorum modo elegi, qui contrariam sententiam confirmant. Atque merito iudicamus, omnem sensibilitatem partium membranarum, tendinosarum, aponeuroticarum &c. negare velle, idem esse, ac in tot casibus chirurgicis & medico forensibus, oculatos observatores cœcutientes appellare, ac tot in hisce medicinæ partibus rixas & dissensiones arti, artificio, & ægrotis periculosiores stâtuinare. Alius membranosæ partis *fascia lata* scilicet, sensibilitatem nova observatione. D. Præses confirmavit in *Fraenkischen sammlungen* Vol. I. P. III. pag. 256. & seq. Posito vero, sed non plane concesso, sensibilitatem hisce partibus propriam non esse, sed a nervis advenire, sufficit, si sensibiles sunt. Cutem sensibilem admodum esse, nemo negat. Nec foret forte, nisi tot nervi eandem percurrerent, quos tamen scalpello detegere & demonstrare vix valemus, cum eos, ut ipse Ill. Hallerus fatetur. *Physiol.* §. 425. ægre conspiciamus. Tantum.



CLARISSIMO VIRO
JO. MICHÆLI LAMBERTO
CHIRURGIAE LECTORI

*Alexandria Liguria, atque Chirurgo ex Collegio
Regiæ Universitatis Taurinensis.*

DOMINICUS VANDELLIUS

S. P. D.

Opuscula de sensitivitate, atque irritabilitate a Clarissimo D. Hyacintho Fabri collecta, & Bononiæ typis edita ad me pervenere; inter quæ elegantem tuam epistolam firmis rationibus extensam, & validis doctrinis ornatam mihi inscriptam perlegi. Id mihi admirationem attulit; animo enim & cogitatione percurrebam maximum honorem, quem mihi præbuiſti, postquam tuam primam epistolam celeberrimo Jo. Baptistæ Blanco in alma Taurinensi universitate P. P. inscripseris: Qua de re tanto condecoratus honore gratias ago quam possum, maximas tibi, & nunquam mihi tui aut collendi, aut ornandi voluntas deerit.

Responsiones, quæ in hac tua epistola leguntur contra tuum oppositorem, ita comprobata & rationibus confirmata sunt, ut ulterioribus justis objectionibus locum haud faciant. Epistola vero latino sermone conscripta tuæ simul juncta contra quasdam Theses de irritabilitate clare præstantissimi auctoris sapientiam atque eruditionem ostendit.

Intenso animo, ac summa voluptate postea legi tuas diligentes observationes de sensitivitate, supra homines institutas; quæ manifeste quæstionem sensitivitatis persolvunt, atque distincte rei veritatem demonstrant: unde unusquisque, cujus juditium ratio dirigit, ac moderatur, hanc veritatem intelliget, neque curabit tuas convincentes observationes in hominibus tactas comparare cum illis supra canes, hædos, felles, aliaque animalia institutas, quæ non semper queruntur, neque semper doloris indicium afferunt; ut assidue in animalibus mortiferis vulneribus confossis, atque transfixis accidere, conspicimus. Et nihilominus aliqui erunt, qui sicut Pyrrhonii, facta negabunt; & quamvis ab experientia & veritate convicti in contrarium adhuc sentiant: Hi conspicientes lac sugere hædos eodem tempore, quo Achillis tendo irritatur, illico de tendinum insensitivitate

vitare decidunt: Forſan animalia vulnere affecta & dolentia amplius cibo non veſcuntur? Sæpius ægri homines non edunt cruſtulum vino cretico madefactum eodem tempore, quo eis brachium aut crus amputatur? Hirudines cum alicui animali ſe affigant, ac acriter ſanguinem ſugant, quamvis per medium ſcindantur; attamen ſanguinem exſugere non deſiunt: forſan hirudines ſunt inſenſibiles? minime; nam quotieſcunque hirudines animali affixæ non ſint, ac ſanguinem non attrahant, ob parvam irritationem ſe ſe contrahunt, atque contorquent, quod ſenſus indicium eſt. Sed hæc res, quomodo ſe habet? ego opinor hanc inſenſitivitatem ſuam originem ducere ab anima rationali in hominibus, & a ſpiritu (1), ſeu ab anima ſenſitiva in brutis animalibus, quæ dum maxima cupiditate & aviditate ad cibum incumbit, dolores corporis partium abſque ulla commotione fert; eodem fere modo quo in animi vehementioribus pathematibus, atque intento nimium ſtudio perſæpe corpus parum aut nihil ſenſile remanet; (2) ut aliquanto in duabus meis epiſtolis demonſtravi, quæ etiam editæ fuere inter opuscula collectionis Bononiensis (3); quod pariter ab Ariſtotele (4), a Franciſco Gliſſonio (5), a Brinnio (6), & a celeberrimo Paulo Valcharengo (7) confirmatur.

Quomodo in ſtatu naturali ſenſus partibus animalis negari poteſt? Dum tu doctè animadvertis omnes ejusdem animalis partes a nervis formari, quod inconcuſſis Malpighii (8), & Lanciſii (9) experimentis inniſtitur; quam ob rem nullæ animalis partes ſenſu careant; ſed aliquæ ſenſu majóri, aliæ minori pollent, ut ad animalis œconomiam opus eſt, ut ſapienter Thomas Campanella adnotavit (10), ait enim „Tactus in corpore eſt univerſe, magis autem ex „quiſitus, ubi ſpiritus ad externorum bonorum, malorumque vires „diſcernendas opus habet magis. Itaque manus perbelle ſentiunt, „magis autem pudendum, ubi vas generationis dignoſcendum; maxime autem lingua, nam poroſa eſt aditum ſenſibus admittens. „Oculi vero & aures longe ſenſibilia percipiunt antequam lædant „percipiendi facultatem; quare oſſa, capilli vix ſentiunt... etenim „ubi ſpiritus copia non eſt, & caro dura, craſſaque, & additum „ſpiritibus non ſinat, minima ſit ſenſatio „ Sed ego fuſior & copioſior

-
- (1) *Amuſement Philoſophique ſur le langage des Beſtes* de P. Bougeante. Pariſ. 1739. (2) *Cujus ratio a nervorum in arteriis imperio repeti poteſt, de quo nervorum imper.* Vid. *Diſput. Mat. Lud. Berckelmann Gating.* 1744. (3) *Sulla inſenſitività &c.* Opuscoli di varj Autori raccolti da Giacinto Bartolomeo Fabri. Part. 2. pag. 213. 243. Bononia 1757. (4) *Phyſ. lib. 8. de ſenſu & ſenſibilibus* cap. 8. pag. 707. (5) *Tractatus de natura ſubſtantie energetica &c. ad lectorem* §. II. (6) *De ſpirit. animal. inſquiſ. n.* 136. (7) *Diſſert. de ſaxis, acubusq. &c.* pag. 90. (8) *De formatione pulli in ovo.* (9) *De motu cordis & aneurysmatibus* prop. 24. (10) *Lib. 2. in compendio de rerum natura pro philoſophia humana.*

piofior fui in fcribendo de his rebus, quas tu præclare & egregie fciſ; unde a te maximopere etiam, atque etiam peto & quaſo ut excuſatum me habeas, atque accipias pro obſervantiæ meæ ſpecimine erga te, tres meas obſervationes, quarum una ad ſenſum corneæ lucidæ, aliæ duæ ad ſenſum duræ meningis ſpectant.

Id. April. huius anni noſocomium S. Franc. Patavii petivit homo annorum 43. temperamenti ſanguinei ophthalmiâ laborans in ſiniſtro oculo, cujus cauſſa fuit vulnus corneæ lucidæ ab acuto ligno inſiſtum. Æger certiore me fecit poſt corneæ vulnus ei dolorem acerrimum manſiſſe per horæ intervallum: ego nihilominus ſuſpicabar, huiusmodi dolorem a violenti totius oculi globi compreſſione oriri poſſe; ideoque ſpecillo leviter corneam ſæpius tetigi ubi vulnus ad cicatricem tendebat, & tunc æger toties graviter querebatur. Æger iſte poſt 10 dies, jam in vulnere cicatrice conſecta, & deſicta medicamenti ophthalmia convaluit, & è noſocomio exivit.

Pridie idus ſimul cum Gaetano Frizzo perito chirurgo quamdam mulierem inviſi annorum 65. temperamenti phlegmatici, quæ menſe Martio huius anni in ſincipite ſiniſtro prope ſuturam ſagittalem & lambdoideam gummâ celticâ laboravit, quæ ad ſuppurationem Julio menſe venit, atque ulcus putridum produxit cum ipſius oſſis ſincipitis carie; cujus fruſtum figuræ rhomboideæ latitudinis unius, & longitudinis dimidij pollicis, a ſupradicto Frizzo ablatum fuit; quare detecta dura mater apparebat; attamen parum inflammata, qua, ſilis aut goſſipio vellicata, mulier acriter lamentabatur; quod non eveniebat, quum ulceris, aut cutis labra etiam ipſa inflammatione correpta eadem levi preſſione irritabantur; qua propter dici poſſet, quod dura mater inflammata ſenſibilior ſit, quàm ipſa cutis pariter inflammata: quæ experimenta per plures dies eodem cum ſucceſſu iterata fuere. Ulcus Septembri menſe ad cicatricem tendebat, atque dura meninx aliquatenus carne tegebatur; quum ægra febre continua correpta fuit, quæ poſt 14. dies eryſipelas produxit, quod ab ulcere initium ſumebat, atque per totam faciei ſiniſtram partem ſe extendebat, quod in ſuppurationem ſuum finem habuit: Aliud pariter eryſipelas partem dexteram faciei occupavit, quod in ſuppuratione ſecum traxit parotidem dexteram, quæ adhuc magnam quantitatem humoris lymphatici, & icoroſi emittit. Inviſi igitur ægram ac illico ſincipitis ulcus obſervavi, in cujus medio dura meninx detecta etiam apparebat per unius digiti tranſverſi ſpatium cum aliqua fungoſa carne. Dura meninx pulſabat; ideo in ſiniſtro carpo mulieris pulſum examinabam, & eodem tempore attente oculis obſervabam duræ matris motum, qui exacte congruebat illi arteriæ carpi, non jam reſpirationi ut aliqui autumant (1). Poſtea ſpecillo fungoſam carnem

(1) *Conf. Sebliſtingium. Acad. Roy. des ſcienc. à Paris. To. 1. obſ. 9. pag. 113. & ſeq. Walſtorf. diſſert. inaugural. med. ſiſtens experimenta*

nem tetigi absque mulieris dolore. Deinde accepi subtilissimam argenti laminam duas lineas Parisienses latam & duos pollices longam cum laterum extremitate obtusa, atque levi manu, incisa muliere, intra cranium & duram meningem per duarum linearum spatium versus occipitis os intromisi; & illico infelix mulier graviter ingemiscebat, & lamentabatur; quod experimentum per duas vices repetitum introducendo laminam tum versus aliud sinciput, tum versus os petrosum partis sinistrae maximi doloris ægræ causa fuit.

Id. Martij una cum Roncono chirurgo, quamdam mulierem invisi annorum 50 temperamenti pituitoso sanguinei, quæ decem ab hinc annis lue celtica infecta fuit; ad quam curandam, præter decocta stibiata, adhibita fuere diversa mercurialia medicamenta, ut frictiones mercuriales, & mercurius dulcis per os acceptus, nec non ipse mercurius sublimatus corrosivus, ea methodo, quam Celeberrimus Wanssvietenus docet (1): nihilominus, nunquam convalescit; immo

menta circa motum cerebri, cerebelli, duræ matris, & venarum in vivis animalibus instituta. Gætting. 1753. De la Mure. Commentarius de causa motus cerebri, qui observatur, cranium hominis vel animalis modiolò exciso. Hist. de l' Acad. Royal. des scienc: année 1749., tiré des registres de cette Académie à Paris. 1753. pag. 541. Hallerum prima linea Physiol. n. 292. & 297. Conf. Cberovalier, quæstio medica quodlibetariis disputationibus discutienda a scholis medicorum &c. An a diversa causa moveantur cerebrum, & dura meninx. Parisiis. 1737.

(1) De Mercurio sublimato corrosivo, methodus Wanssvieteni, epistola duæ ad Jo. Benvenutum. Luccæ 1755.

„ Ego una cum sociis nostræ Academiæ Patavinae inter experimenta,
 „ quæ in vivis animalibus qualibet hebdomada instituuntur, sequens
 „ experimentum feci. Mercurium sublimatum corrosivum in viri ca-
 „ telli venas simul cum tepida aqua per sex dies injeci usque ad do-
 „ sim 9. granorum; quæ injectio nisi primis diebus principii atrophie
 „ causa fuit; sed postea sanus, & alacer evasit, & fere per duos
 „ menses vixit; deinde experimenta de respiratione supra ipsum in-
 „ stitui. Hunc mercurium sublimatum corrosivum in morbis incu-
 „ rabilibus valde comendat Boerhaavius: in element. chemic. T. 2.
 „ operat. chem. part. 3. in Fossil. Proc. 198. p. 269. Venet. 1749.
 „ & in lue celtica præter celeberr. Wanssvieteni uberrimas observa-
 „ tiones, nuper clariss. Jo. Bona 8. observationes cum felici succes-
 „ su palam fecit“. Historia aliquot curationum mercurio sublimato
 „ corrosivo perfectarum Veronæ 1757. Carolus Fridericus Hundertmark
 „ de mercurii viri, & cum salibus varie mixti summa in corpus hu-
 „ manum vi atque efficacitate, ejusque vim sulphure laxius vel ar-
 „ tius conjuncti virtute &c. liber singularis 1754. Lipsiæ S. 4. pag.
 „ 25. seq. m. ait e contra mercurius hic sublimatus corrosivus vel ad
 „ unum,

immo omnes dentes mandibulæ inferioris ei exciderunt, & morbus multa & diversa symptomata semper produxit. Hinc factò abcessu in capite, & corrupto cranio, frustulum ossis sincipitis sinistri divisum & sejunctum fuit, & ibi dura meninx, quæ detecta erat, ab integumentis paulatim cooperta fuit. Eodem tempore magnum ulcus fere totum os frontis detexit a sutura nempe coronali, usque ad dorsum nasi principium, & ad supercilia: os frontis vero prope supradictam suturam a carie corrolum, & ita divisum erat, ut specilli ingressum permittebat, quod a me in medio intromissum, inscia muliere, vix ad duram matrem pervenit, quàm ægra valde queri cœpit; ego tamen in dubium revocans, num aliquem parvum nervum tetigissem; tunc specillum versus supercillium dexterum & sinistrum introduxi; at semper mulier acriter, querebatur. Neque hic suspicari licet cerebri compressionem doloris causam fuisse; cum jam celeberr. Laghius experimentis demonstraverit, cerebrum usque ad sex lineas comprimi posse absque doloris signis (2).

Si mihi fors concederet in posterum alias observationes de sensitivitate instituere, illas tibi transmitterem, ut meum erga Te studium, & observantia mea magis pateat. Vale.

D. Patavii Nonis sextilis 1757.

P. S. Legendo Cel. Halleri elementa Physiologiæ &c. T. I. Lausannæ edita anno 1757. præter alias evidentes contradictiones cum recentioribus suis operibus hanc animadverto, quam Tibi breviter patefacio. Laudatus Vir ait in suo opere, cujus titulus est *Deux mémoires sur le mouvement du sang &c. à Lausanne an. 1756. Chap. VI. des causes du mouv. du coeur pag. 146. ait, inquam, Il est sûr, que l'on trouve des nerfs considérables près de la carotide & de ses grandes branches, mais l'on ne peut pas prouver qu'ils y demeurent, ou qu'ils se distribuent dans la substance des artères. Quando in suis elementis Physiologia sect. I. arteria pag. 70. §. XII. Nervi, è contra probat arterias habere nervos; & in eadem sectione §. XI. Arteriola arteriarum p. 67. dicit, Ergo arteriis sua arteriola sunt, sua venula, sui nervuli.*

LET-

unum, alterumque granum deglutitus, fibræ solidam erodens, atque lacerans, nervos, acerbissimo adfectos dolore, diffundens, fluidas partes coagulans, inflammationem procreans vehementissimam, continuo in gangrenam, spaciolum, mortem proximè subsequituram, abeuntem, teterrimum letale venenum est. De quo vid. Frid. Hofmannum in med. rat. system. T. 2. in Opp. Genevensis edition. T. 1. insect. par. 2. cap. 2., schol. §. 15. pag. 197. de venenis, eorum natura, viribus, & modo agendi: & Joan. de Gorter in med. compend. par. 2. Tract. 88. §. 14. pag. 143. Idem porro Hundermark l. 6. pag. 28 subiungit... humoribus corporis animalis quocumque modo injectus, idem acrimonia lædit vehementissima, ut L. Astruc. adserit in lib. de morbis vener. T. 1. lib. 2. cap. 7. pag. 169.

(2) Sermo alter. pag. 6. Bononia 1757.

LETTERA TERZA

Dell' *Illustrissimo* Sig. Dottore

GIOVAMBATISTA BIANCHI

All' *Illustrissimo* Signore

CLAUDIO NICOLA LE CAT

Secretario perpetuo dell' Accademia di Roven.

Illustrissimo Signore, Signore, Padrone Collendissimo.

Giusse ben opportuna la seconda vostra stampa, Chiarissimo Signor Le Cat, proseguita da una lodevole del pari, che si è quella del dotto ed ornato Signor Dottor Giacinto Fabri, pel mezzo della quale esso comunicò al pubblico quella pulita sua osservazione sulla sensitività del tendine, che non ha guari avea diligentemente fatta, con tutte le cautele possibili, ed accuratamente: ed in vero, io debbo credere, che questa vostra consumatissima produzione, e quella del testè nominato Signor Fabri, che formano un sì eccellente supplimento alle altre già esposte, sieno per finir una volta questa lite sulla sensitività, ed irritabilità animale. Il Chiarissimo Signor Haller non mancando di fino ingegno avea ridotta la questione della insensibilità ad un tale come insuperabile sutterfugio, che senza la perspicacia, il buon sapere, e la maturata sperienza de' vostri lodevoli prodotti non finivasi mai più la bisogna: erasi il Signor Haller incantonato sopra una circostanza da ogni altro fuori che da voi insolubile; non poteva egli più negare, che le continue sperienze dimostravano, che le parti animali da lui predicate per insensibili, all' occasione sentivano; ma diceva, che i tendini, le membrane, e i legamenti pajono qualche volta sentire, perchè il dolore viene dalle parti vicine veramente sensibili, che si toccano negli sperimenti, o dalle guaine nervose di dette parti, che nelle operazioni si tagliano, e si staccano. Ora dalle dimostrazioni d' entrambi è stata evacuata quest' ultima tanto sottile, e studiata obbiezione; mercecchè veder fate colle medesime chiarissimamente che i tendini, le membrane, ed i legamenti staccati, e staccatissimi dalle parti vicine, e da qualunque loro involto, o guaina sentono, si risentono, e dolgono, quantunque aveste potuto dire, che le guai-

Suppl. Part. II.

L

ne

ne di queste parti essendo loro proprie, e portandole appunto i nervi per sentire, non dovevano escludersi dal comune interesse, massime inventando gli Halleriani guaine immaginarie anche alla stessa dura Madre. Voi dunque esperimentissimo Signor Le Cat nella vostra stampata memoria, che è solo un' estratto di un gran corpo di moltissima quantità d' osservazioni sì vostre, che de' vostri amici di ogni nazione Europea in fatto d' operazioni anti-halleriane fatte con la maggior cautela, che a suo tempo darete poi fuori, dimostrate appunto, che irritate, o solamente toccate con ogni maggior circospezione Halleriana la dura madre, e la pia, negli uomini ed ogni altra membrana, i tendini, e i legamenti &c. chiaramente si risentono, e dolgono, e che il senso delle parti animali va in ragione della lor maggiore, o minore densità, o durezza in modo, che sentono più le membrane che i tendini, i tendini, che i legamenti, e questi più, che le cartilagini, come le cartilagini finalmente più, che le ossa; dappoichè più duri, e compatti divengono i nervi nelle parti che sono più dense, e compatte, e si calcano essi in modo, e fortemente condensansi, che impedito il giuoco delle loro fibrille, ed il corso del lor liquore speziale, questi nervi come istupidendosi, e cambiando di natura, si scemano ancora nel loro original senso, e quallora il Signor Haller avrà a leggere le sperienze da voi in questa memoria riferite e gl' impareggiabili vostri raziocinj, ed insieme l' osservazione del Signor Fabri, che sembra di niuna eccezione sul da lui scoperto tendine del braccio „del „ tutto fuori saltato, e bello, e bianco, e sfoderato agli occhi d' „ ogn' uno esposto „ ch' e' riconobbe essere ad ogni tocco sensibilissimo, ed anche tale ebbe a provarlo collo strignerlo colla tanaglietta secondo le leggi e come richiede che facciasi egli il Signor Haller, che credete Voi possa restarvi più a ridire ed a lui stesso, ed a suoi seguaci? Io per me penso, che più non v' abbiano il mezzo. Finalmente, Signor Le Cat mio stimatissimo, impiegando voi anche un' articolo sulla irritabilità Halleriana, vi stupite, che questo gran letterato abbia scritto in quella forma sopra un' ignota proprietà, quando che nella vostra fisiologia, e nella vostra memoria premiata dall' Accademia di Berlino nel 1753. ne avevate scritto con tanta precisione, e chiarezza: dite perciò in questo articolo esser precipizio di ragionamento, che irritata la parte vivente dell' animale, senza questa l' irritazione per lo principio della sua naturale sensitività, e poi irritata, non più viva ma morta, la senta per un altro principio ben differente, che chiamasi irritabilità, e qui provate a pennello collo stesso sentimento degli avverfarj l' impossibilità, che la causa seniente seconda, sia diversa dalla seniente prima, e provate, che lo stesso spirito vitale, che fa la vita sensitiva, che nel cuor del vivo s' irritava allo stimolo, s' irriti nel cuor del morto, finchè parte di esso vi rimanga, e dimostrate, che non si può dare irritabilità senza senso, non bastandoli una certa meccanica

nica struttura; in appresso dite, che questi novatori non vogliono che esperimenti, e non sistemi, e frattanto si rivolgono ad una di quelle nuove proprietà, o per meglio dire rinnovate, delle quali si dispensano dal darne alcuna ragione, o causa d' operare, e confessano di essere virtù occulta, ed incomprendibile, conciossiachè, chi dice irritabilità, dice facoltà d' essere irritato, cioè d' essere posto in collera: or la collera essendo una passione, e un sentimento, perciò secondo la loro propria espressione, questa loro occulta virtù è una sensazione, o una conseguenza di una sensazione; e quindi egregiamente dimostrate cosa sia quel rimasuglio di senso, che resta per qualche ora nel cuore, ed altri pezzi cavati dall' animale, senza il detto principio sensitivo da voi dimostrato, l' Halleriana irritabilità resta un puro entusiasmo metafisico, ed una irritabilità senza irritazione, e per una soi prova, fra tante, del buon effetto di questa nuova irritabilità nello spiegare i fenomeni della Medicina pratica, la date sull' operazione dell' oppio, che merita d' esser letta, e noi nella nostra seconda lettera ne avevamo toccata una come simile. Ora pensando io, e ripensando su questa benedetta irritabilità nelle parti morte dell' animale, distinta dall' irritabilità delle di lui parti vive, che il celebratissimo Signor Haller dice essere sua propria invenzione, e sulla natura, e modo del suo adoperare, in sempre maggiori difficoltà, oscurità, e contraddizioni imbattendomi, mi sono immaginato, che alle volte i grand' ingegni si fanno piacere di servirsi del loro credito per esporre qualche cosa a letterati della professione in forma di enigma, o indovinello per loro aguzzare lo spirito, e darli trattenimento, ed esercizio, comechè sappiano, che le cose esposte sieno immaginarie, e figlie d' una bizzarra fantasia. E se così è, lascieremo una volta ad altri lo sciogliere questo indovinello, che sorte dal nulla, e tuttavia fa in questi di maggior schiamazzo, che la porpora, la tela incombustibile, ed il lume perpetuo degli antichi. E non farebbe assai più glorioso ad un grand' Uomo, che ha tanta volontà di scrivere sulle teorie mediche di adoperare il suo raro talento piuttosto nella ricerca delle tante cose sostanziali, che mancano ancora ne' detti studj, e ne debbono essere il loro fondamento, come quelle molte da noi menzionate nella seconda lettera al capo sesto, e le moltissime ommesse, che volere edificare una nuova fisiologia, che sia nulla più, che un recrivere quanto da altri già si è scritto, oppure fondare questa fisiologia sopra le invenzioni immaginarie, e su freddiccio paralogismo di parti animali, delle quali vuolsi che altre sieno sensibili, ed irritabili, ed altre no, quando è certissimo, che le parti dell' animale sensibili, sono anche irritabili, e che tutte tutte sono sensibili secondo l' arrivo di qualche malattia, massime infiammatoria, o spasmica, o corrosiva, in modo che, le stesse parti, le quali da cadauno si credono realmente insensibili si scoprono per detti casi sensibilissime come le ossa più dure, le ugne, gli stessi capelli, testimonio facen-

done la Plica Polonica? In fatti tralasciando per ora come cosa certissima le vive sensazioni delle ossa anche più dure nelle corrosioni della spina ventosa, alle altre sole due malattie appigliandomi, cioè all' affetto spasmodico, e infiammatorio, segnerovvi qui in appresso dottissimo Signor Le Cat quanto mi paja impossibile anche in queste due affezioni morbose l' adottare il sistema Halleriano, e quindi mi farete cosa gratissima se sul pratico raziocinio che passo a mettervi sott' occhio voi mi dichiarerete il sincero vostro parere, qualunque egli sia per essere; Voi che ammiro tra i primi nella Medica Oligarchia, che insegna ed opera in una professione, della qual sola lasciò memoria, e lode l' Altissimo a pro, e sollazzo dell' Uman genere, ristretta ad un certo poco numero di soggetti, che spiccano in qualunque secolo ed in qualunque nazione superiori agli altri, e luminarj degli altri; Voi dico, che vedete ogni dì il fiore delle mediche cose.

La pratica assidua da me esercitata quasi sessant' anni, mi ha posto in chiara dimostrazione molte cose, le quali mettonsi in dubbio da un Uomo, che a tanto esercizio non attende. Ho dunque veduto al letto degl' infermi, che qualunque parte, che in questi infiammata si fosse, sempre si riconobbe dolente, e di varj generi di dolore afflitta: così ne' cadaveri di parecchi morti di mal di testa continuo con febbre acuta, ho ritrovato la sola dura madre infiammata, in altri il sol pericranio, ed in questi sane tutte le altre parti del capo: mi sono incontrato a vedere gli involti, o cuffie ligamentose degli articoli o superiori, o inferiori sole, e veramente infiammate, ed erano sempre dolenti: così mi si sono affacciati i tendini in ogni parte del corpo infiammati, ed incessantemente dolorosi, senza che alcuno mai degli astanti ai fatti se ne richiamasse, o fiataste in contrario. Nelle operazioni dell' enterocoele, tagliati gl' integumenti, e scoperto il membranoso sacco sporto fuori dell' inguine, o anche disceso nello scroto, che si è pur propaggine, continuazione, e sostanza medesima del peritoneo, ho questo riconosciuto a qualunque leggerissimo tatto del cerusico operante, non solo estremamente dolente quando si trovava infiammato, ma eziandio quando non dimostrava infiammazione. E quel foro scavato nella parte inferiore dell' aponeurosi de' muscoli obliqui discendenti dall' addomine, che porgesi all' inguinalia degli uomini e porta volgarmente il nome di anello, anello tendinoso, che con viva forza l' incarico sostiene, e la protrusione delle viscere al basso per la respirazione, quando viene superato dalle erniose cadute, quanto è doloroso per se, e negli altri annessi suoi, sia nel farsi dell' ernia, come in questa nell' operazione del taglio, e ciò tutto l' avrete ben voi mio stimatissimo Signor Le Cat veduto più d' una volta! Non mi sono stati invisibili le infiammazioni de' peristij in parti del corpo anteriori, posteriori, superiori, ed inferiori, che sempre, e in tutto il corso della malattia acuti incessanti do-

lori

lori recarono all' indisposto, e ditelo che il Ciel vi salvi, se qualunque viscera veramente infiammata dolga, o nò: quanto a me non solamente dalle esterne visibili infiammazioni, ma dalla più parte delle interne da me vedute per lo incredibil numero delle dissezioni mie anatomiche di ciò assicurato sempre mi sono. Chi crederebbe che nel corso degli anni miei, in mezzo alle continue pratiche, e cattedratiche occupazioni, abbia io aperto, o fatti aprire delle centinaia di cadaveri estinti per ogni sorte di mali, oltre de' cadaveri sani de' giustiziati, che dannosi a Teatri Anatomici per le incisioni, non parlando de' tagli de' bruti, che pur mi furono innumerabili? Nel principio dell' anno 1709. sempre memore per l' eccessivo freddo, che d' allora in poi non fu più in qualche modo imitato, abbenchè mai nello stesso grado, se non che dagl' inverni del 1739. e 1740., assistendo io in que' tempi agli spedali militari de' soldati, in un sol reggimento di più di mille uomini, che chiamasi quel di Savoia, morirono di freddo circa cinquecento uomini, e tutti, o la più parte per legittima pleurisia, avvegnachè molti guariti dal primo attacco, e ritornando a fare gelatissime sentinelle di que' giorni, si riportavano allo spedale con simile affezione di petto, onde alcuni in pochi giorni ne morivano, ed i guariti la seconda volta esponendosi di nuovo nel rigidissimo freddo delle notti all' aere scoperto per le solite custodie, per lo più ricadevano la terza volta nella stessa infiammazione pleuritica, e ritornati all' Ospedale, non vivevano poi più, che poche ore: di tutti questi, che nel corso della malattia avevano sempre gridato del dolor puntorio laterale, gettando sputi copiosi sanguigni, e marcidi, fattane per ordine Regio apertura di corpo, non ritrovai mai infiammazione vera, o sia idiopatica di pleura, nè tampoco de' muscoli intercostali, ma sempre primaria infiammazione si espone nell' uno, o nell' altro lobo del polmone, o in tutti due in quegli, che fra poche ore morivano dall' invasione del male. Lo stato morboso di questi polmoni era in generale una pienezza, e durezza come di fegato, e più de' lobi infiammati, con colore o caricato rosso, o livido, o piombino; la tonaca della viscera affetta, spessa, dura, con rosso livido carico, e qualche volta mucosa, o purulenta, non di rado rosa, e stracciata; ascessi, e tubercoli più o meno infiammati e purulenti, e diffuse marcie, e liquami nella sostanza polmonica, e sangue eziandio stravalato ne' bronchj, e trachee, e qualche fiata i polmoni aridi, secchi, e neri come combusti, e bruciati, ma sempre duri, e massicci, se non che, in alcuni pochi, cui era l' indisposto polmone più pieno, e farcito, e di maggior volume, s' affacciò la succingente membrana pleura rossigna, con aspetto di vassellini rossi distribuiti in forma d' arboscelli, che in naturale stato non compajono, il perchè pareva aver questa attaccato dal polmone per lo suo stretto contatto, e compressione una sorte d' infiammazione simpatica, o secondaria, ma si stava non-
per-

per tanto questa membrana, come in istato naturale, tersa, ed asciutta, e se uomo avvi, che ritroso, e pregiudicato a tante, e ben diressimo geometriche dimostrazioni delle dissertazioni de' polmoni sulle di lui malattie infiammatorie, ed anche altre, ad acchetarsi ancora stia in billico; non cerchiamo più oltre, che il caso frequente degli empiemi, i quali nelle legittime infiammazioni de' polmoni, o più presto, o più tardi addivengono. Intendo per legittima, o squisita infiammazione de' polmoni quella, che è veramente da flemmonoso tumore accompagnata: or questo phima, o flemmone sia nella infiammazione nominata semplicemente pleurisia, quale, preso per ordinario un lobo de' polmoni sta ivi fisso, e stabile; sia nell' appellata pleuripneumonia, nella quale pare, che il flemmone nel polmone divenga mobile, ciaschedun sa di fatti, durare il dolore pleuritico nel primo genere dal principio sino al fine del male; ma nel secondo genere esservi il dolore veementissimo nel principio, ma a poco a poco l' infiammazione portandosi verso l' interno della viscera, nell' aumento del male non sentirsi più, bensì crescere gli altri sintomi, e d' ordinario farsi malattia mortale: in tale stato d' infiammazione, suppurì il flemone, e la postema per entro la cavità del petto si rompa, ed ecco fatto il travasamento, vale a dire l' empiema, cessar del tutto il dolore pleuritico, ma quindi l' ammalato gravarsi subito di respiro, ridursi ortopnoico, e per lo più morir suffogato: e chi direbbe mai, che que' prevj dolori pleuritici non fossero nei polmoni, quando che nei defunti aperti si ritrova illesa la pleura, illesi i muscoli intercostali, ed i nervi, che a questa parte appartengono, soltanto rotta la membrana del polmone, e questo più, o men pieno, ed umido, e più, o meno infiammato, o tirante al necrotico, e la stessa marcia, che si gettava fuori per via di sputo della medesima natura, e qualità di quella, che si ritrova nel polmone, e nella cavità del petto, più, o meno fetente, e consistente, ed in varj siti di varj colori, come appunto le varie tinte sulle tavolozze de' pittori, per lo comune petto, o verdemezza, o livida, o piombina. Vi aggiungo qui per rilevante osservazione pratica, che quelle pleurisie, o pleurimonie, che arrivano piuttosto ne' principj d' aumento del male, a suppurare in empiema, come sulla terza, o quarta giornata, riuscire più fortunate, e curabili, di quelle, che accadono dopo la settima, e maggiormente dopo l' undecima; in secondo luogo guarire ancora alcune di queste, se l' empiema si faccia propriamente nella cavità anteriore, o sia immediatamente sotto lo sterno, ed incominci da una spezie di tumoreto, o turbercolo, che s' innalza fra una costa, e l' altra delle più inferiori, onde ad un piccol tocco di scalpello aperto quel bernocolo, si fa una saliente fontana di marcia, che in conseguenza tutta si va evacuando per lo foro con tutta la necessaria declività, per cui anche s' introducono de' balsami bianchi, e deterfivi &c. Che se il travasamento si fa alla parte posterio-

re del petto ancorachè si faccia ne' principj del male, si è certamente mortale, tra perchè la natura non insegna abbastanza il luogo da derivare la marcia, e tra perchè ancora tale derivazione, procurare, e reggere abbastanza non si può; e principalmente per essere il posto della rottura nel concorso, ed intralciamento de' più cospicui vasi di questa parte; e mettendo tutti insieme gli empîmi, che si procreano dalle pleurisie, si è osservato in pratica, ch' egli è assai, se di venti empîmatici, uno perfettamente se ne salva, avvegnachè quegli, che non muoiono dentro pochi giorni, o ore dal travasamento purulento soffocati, e strozzati, la finiscono poi fra poche settimane, o pochi mesi tabidi, consunti, ed in un compiuto marasmo: ma de' varj dolori del polmone, che precedono gli empîmi, chi mai di sana mente potrebbe ancor credere, che del polmone non sieno? non è egli evidente, che il dolore fino allora durato, cessa al rompersi internamente della postema pel motivo, che da tale rottura, ed effusione si rilassa quell' empimento, e tensione nel polmone, ch' era la cagion del dolore? di fatti si è così subita la cessazione del dolore, che sovente gli stessi ammalati si credono d' essere guariti, ed al curante medico lo impongono, s' egli non. è un soggetto ben perito che riconosca dal peggiorato stato del polso, e dal più oppresso respiro, maggior periglio di vita. Che se la natura non sente presto lo scarico purulento come dicemmo, e la consolidazione della viscera, i poveri indisposti col maggior aggravio di respiro con tetentissimi sputi, con incessanti *rossi sonore* se ne muojano, e se ne muojono principalmente con i dolori interni, che ritornano nell' affetto polmonare lobo, il quale appunto, perchè non può bene scaricarsi del suppurato marciume, si fa più turgido e teso, in somma si rende d' intensissimo dolore, ed aperti poi i cadaveri non solo si trovano i detti marcidî travasamenti nel petto, ma il lesò polmone parte roso, e cavernoso, parte duro e tubercoloso, e parte aderente alle coste, e massime nella posteriore sua regione, cioè nel luogo de' suoi legamenti membranosi, che rispondono alla biforcazione tracheale, o sia alle prime distribuzioni bronchiali, dove appunto in questi afflitti sentesi più vivo, e continuo il doloroso senso. Di più, chi crederebbe, che in alcuni timpunitici certe scosse spasmodiche ben dolorose, che arrivano di tanto intanto, e durano qualche spazio tutto intorno all' addomine con singolar convulsione, dimostrassero la sensazione radicale delle membrane di detta cavità, che per lo più stassi nascosta? e chi avrebbe creduto, che in Monsieur Smits gran giureconsulto di Franconia, ch' era professore di leggi nella nostra università di Torino, morto si fosse da un dolore Sarcomatoso del rene destro, che rese questa viscera così deforme di mole che occupava quasi lei sola tutta la cavità dell' addomine, avendo fino sloggiato il fegato dal suo nicchio del destro ipocondrio, ed essendo tutta di sostanza come parenchimatosa, cioè come un rene sano, nella quale tuttavia sentiva di tanto in tanto un' acuta

cuta spasmodia di dolore, tuttochè in parenchimatoso sarcoma, che credesi indolente, ed aperto il cadavere si trovò una sostanza come calcolosa, grossa come una nocciuola, alquanto ineguale, e spinosa, che infissa nella pura sostanza di detto parenchima, era lo stimolo in detta massa di quel periodico spasmodico dolore? e del pari (dappoichè giova nella nostra professione il riandar oltre una fiata le materie più rilevanti) chi si darebbe a credere, che gli empiemi del polmone appuntino dimostrassero essere certi dolori proprij, ed indivisibili di questa viscera? Oh vadino i Medici pseudo-pratici, o soltanto Teorici a declamare, che il polmone, la sua membrana, ed altre viscere non sentono, e che la pleurisia sia sempre nella pleura: osservazioni, che confrontano con le nostre sulla pleurisia malattia di polmone, e non di pleura sono recate dallo industrioso Signor Haller al foglio 13. degli ultimi opusculi patologici, ma al solito non sono sue, perchè imprestategli da buoni pratici. So, che i veri Medici m' intendono, ch' io parlo delle legittime infiammazioni, che consistono in uno stato fervido, ed acceso di una parte in quel grado, che da Greci si chiama *phlogosis*, per l'ordinario con febbre, ed impeto di sangue, e non di quelle apparenti infiammazioni, eziandio con tumore, e con color di rosso carico di qualche parte, che procede da puro ristagno di sangue, senza impeto, o fervore, e che per lo più termina in *necrosis*: Sono per altro persuaso, che i buoni pratici fanno distinguere la vera infiammazione dalla spuria e soltanto apparente, e che perciò per conoscere tale affezione non hanno bisogno di consultare la metafisica meditazione di certi Moderni sull' infiammazione, che si è del tutto alla pratica inutile, e che anzi la chiara, e semplice idea dell' infiammazione confonder può; come dice il dotto Signor Haller nella osservazione 43. de' suddetti opusculi patologici sopra la natura dell' infiammazione, cioè, *non quod vascula sanguinea unice distendantur, sed quod cruor secundum totam longitudinem arborescens, in vasis circumpositam efficiat*, e nello stesso luogo dice, che l' infiammazione, *fit a sanguine in cellulosa telam secundum effusum*, quantunque nella stessa osservazione poi si discorda, scrivendo, che nell' infiammazione degli occhi i vasi unicamente si distendono dal sangue: *Inflammationes in oculis frequentes fiunt utique non adeo a globulis sanguineis in aliena loca transfusis, quam ab iisdem majori numero impulsis in vasa rubra quidem, verum ideo pellucentia, quia unicum globum rebus.* Io non aveva mai lette altre opere del Signor Haller, se non per grande impulso quelle circa l' irritabilità, e sensibilità delle parti animali, e qualche cosarella sul suo mostro: capitatimi però un giorno detti di lui Opuscoli patologici di ultima stampa, ed aperto tosto il libro, per vederne di fuga qualche saggio, m' incappai dopo d' aver veduta l' osservazione accennata di sopra portata al fol. 13. in quest' altra posta al num. 43., e let-

è lettavi tale contraddizione, terrai il libro, nè per allora velli più altro leggere di quest' Autore, dubitando anco di errore di stampa. Quanto diffi del dolore non mai mancante in qualunque parte umana daddovero infiammata, lo dico ancora nello stato veramente spasmodico di dette parti, che tutte sempre portano seco qualche specie di trista sensazione.

Or contentatevi Signor LeCat riveritissimo, che grado facciamo all' altra famosa novità del nostro sempre infaticabile Signor Haller, e dato sulle prime uno sguardo al poc' anzi riferito anello tendinoso inguinale, chi si da a considerare quanto in questa forza non solamente vi sia di naturale sensitività, ma insieme di ben grande irritabilità, e chiaramente lo vegga dalla irritazione, che si fa in molti uomini erniosi su questo anello nel passaggio, e caduta per questo foro degl' intestini, o dell' omento, o di tutte due le parti, talmente che con violenza serrandosi, e restringendosi le pareti dell' anello nella prima distensione delle cadute viscere fortemente dilatate, con tale forza premono, strangolano, e soffocano dette trascorse viscere, che intercetti i corsi de' liquidi non solo queste s' infiammano, ma cadono altresì facilmente in morticino, e cancrena; quindi chiara cosa è non andar disgiunta in questo anello inguinale l' irritabilità dalla sensazione, e ciò che in questa parte manifesto si rende, creder debbesi, che in tutte le altre parti animali ugualmente riesca, cioè, che in queste sia lo stesso, o almeno collegato sempre insieme l' essere sensibile, e l' essere irritabile, siccome non de' più moderni soltanto, ma si fu eziandio di alcuni antichi sentimento laudatissimo, e resosi finalmente fra Medici frequente viepiù il nome d' irritabilità da un secolo a questa parte, varj variamente alle animali parti la applicarono. V' ebbe chi disse essere solo i nervi irritabili, e veramente tagliato il nervo, da se stesso, quando dal vincolo d' altre parti impedito non venga, s' accorcia, e s' arronciglia; alcuni, che piuttosto nelle membrane segga l' irritabilità, confermandosi, che queste tagliate nell' animale, se libere sono, palesemente si contraggono; ed altri in altro modo per le parti animali l' irritabilità distinsero, come parmi d' avere in altre mie lettere significato. Non per tanto l' ornatissimo Signor Haller solo ne' muscoli ha voluto l' irritabilità confinare, e poi da questa particolar determinazione ha disteso questa qualità ad ispiegar generalmente tutte le funzioni sì naturali, che morbose dell' uomo; quindi tutta la fisiologia pare, che fondar voglia sull' irritabilità, e tutta ancora la patologia, onde chiamasi, e fassi chiamare Autor nuovo, e riformatore non solo della fisiologia, e patologia, ma anche della stessa chirurgia; oltrechè manifesto essendo, che nè gli elementi, nè i temperamenti, nè le parti solide, nè gli umori, nè la generazione animale, nè la nutrizione, ed incremento, nè le secrezioni, nè il calor del sangue, nè le altre animali funzioni dipendano immediatamente da muscoli, aspettiamo da questo sottile Autore, che que-

sto grande enigma, o mistero di tutte le cose naturali animali, dall'azione de' muscoli ci spieghi, ed illumini: così intorno al patologico dimostrandosi nella lettera latina scritta al Signor Lamberti, e stampata nella raccolta delle cose anti-halleriane, che quasi tutte le malattie dell'uomo in niun modo non dipendono da muscoli, mi son fatta premura, o mio eruditissimo Signor Le Cat, che intenditissimo siete nella pratica perfetta, di sapere da voi cosa mai intendiate di simile precisione, non meno ancora che siate per credere dell' altro capo di dominio universale dell' irritabilità sulle cose naturali dell' animale vivente, affinchè veder io possa se mai il corto mio intendimento m' inganni: in oltre vi pregarei a dinotarmi se pure nella sì prolissa vostra speranza aveste mai riconosciuto parte alcuna o membranosa, o tendinosa, o legamentosa veramente caduta in forti spasmodie, o infiammazione che nulla, per se sola, di dolore, o molesta sensazione sentisse: vi giuro, che ad assicurarmi di questo fatto ogni diligenza hovvi adoperato, ed ho in più tempi, e in più modi spinti, e fischeggiati Medici, Cerusici, Barbiere, Flebotomisti, e fino Mammane, ed altre donniciuole, che potevano aver pratica sul veder parti dolenti, o spasimanti, o infiammate, e tutti mi hanno alla buon' ora assicurato, che sempre per loro si è veduto arrivar con dolore tali malattie in qualunque generi di parti umane: che vorremmo di più? Per le quali cose, tutte, caddemi il dritto, veramente dottissimo Signor Le Cat, di con Voi pronunciare, che chi ricerca le mediche verità (non già dalle ideali meditazioni su i tavolini, ma su i letti degl' infermi, da' fatti reali delle malattie, senza pretender condur dietro a suoi raziocinj la natura, ma come quegli, che dietro a questa quelli conforma) non sia per badare a certi troppo studiati, ed insieme bambi parti d' ingegno, fatti per sostenere certi non ben fermi sistemi, e ritrovati di fondamento esauisto; così non dobbiamo aver riflesso alcuno a quanto dice il nostro celebratissimo Autore, che le osservazioni sulla sensitività delle parti animali non si fanno con le dovute precauzioni di rimuovere con ogni diligenza altre parti veramente sensibili, che o le passano adosso, o le circondano col far credere poi, che il senso, che porgesi, sia di dette parti, e non delle contenute, le quali a suo credere non l' hanno, e che così di senso non suo, ma de' loro involti, ed altre parti, sentino i tendini, legamenti, membrane &c. al mentovato anello non vi passano nervi sensibili, e di altre parti, nè al di dentro, nè al suo di fuori, ed il nudo, e semplice anello pur sente, come vedemmo; dunque da nervi propri interni invisibili, che con altre fibre, e stami la stessa loro composizione intimamente ne fanno: così pensate, se in tutte le parti o infiammate, o convulsivamente tese, nelle quali ho ritrovata effettiva, e distinta sensibilità, non ho saputo riconoscere, se tale procedeva da' nervi estranei, ed esterni, e non suoi, oppure da' suoi propri, ed interni, e che più? Se a ragion veduta abbiamo, e

pro-

provato nella prima nostra lettera, che in qualunque parte massime molle dell' animale, non può ingerirsi la sottil punta di uno spillo, che non incontri propri nervi di detta parte, così le questioni sottili sull' irritabilità, che sia, o che non sia moto contrattile o altro, a noi che importa? Il Signor Delio professore a Erlangia, chiarissimo, fu il primo, che dando piè fermo alla ricerca, dimostrativamente refusò l' irritabilità presa nell' Halleriana significazione con più, e più fortissime ed incontrastabili ragioni, e parimente molte altri, quali lascio a curiosi di leggere, non volendo io per ora cogliere ne' pensieri di questo Grand' Uomo, e degli altri. Voi forse mi chiederete non sia io per anche a pensare su questa controversia: no, son sicuro, che la lite è finita, e poi trattasi di una materia, che ad altro più non serve per i Professori della medicina, che a fargli perdere il preziosissimo tempo, e solo affinchè sulla briga si dica quel più, e quel tutto, che dire si possa, mi son fatta la maggior premura di riscuotere da voi i gravissimi vostri riscontri pelle di sopra segnatevi cose. Ma finalmente credete Voi, Chiarissimo Signore, che lo stimatissimo nostro Signor Haller sia per meco offendersi, che qui, ed altrove abbia io esposte verità, ed esperimenti sugli uomini, che non poteva tacere, quando nella di lui prima dissertazione, e nelle altre in appresso sull' irritabilità, ed insensività, gli ho passato senza alcuna difficoltà tutti, e a più centinaia gli sperimenti, ch' egli ha fatto su Bruti, ed alcuni anche su gli uomini? Tuttavolta a Voi mio Signor Le Cat non ha più da replicare, se non con sofismi: la vostra maggior raccolta, che preparate farebbe in ora soverchia, se non che accoppiata alla fisiologia, che già avete stampato con tanta gloria, potrà produrre un rinnovellamento di fisiologia veramente, soda, utile, e dimostrata, sicuro che io sono, che coteste vostre memorie trovansi piene di que' gran tratti maestri, e di quelle, che tutte vostre sono peregrine cose, che per tutto senza accorgervene dalla penna uscendo vi vanno. Non ritardate dunque di recare questo bello aspettato frutto in dono alla professione nostra, e frattanto amatemi al pari dell' amore, che per Voi conservo, che per tante vostre virtù al maggior grado è montato. E molto più mi si accresce verso la persona vostra di particolare dilezione, dacchè intendo da miei amici di Bologna, che a quel Celebre Istituto delle Scienze da essi con tutta mia soddisfazione siate stato di recente aggregato, onde per l' avvenire oltrecchè per vero amico, avrò così il contento di considerarvi per un' collega di merito, e degno perciò di ben distinta estimazione nella nostra società letteraria.

DI V. S. ILLUSTRISSIMA.

Torino 12. Aprile 1758.

Devotiss. Obbedientiss. Servitore
Giovambatista Bianchi.

M 2

LET.

L E T T E R A
DEL SIG. DOTTORE N. N.

Al Chiarissimo Signore

G I A C I N T O F A B R I

Medico Filosofo ec.

C H I A R I S S I M O S I G N O R E .

AVendo letto, e riletto nella prefazione del libro stampato dal Signor Alberto Haller nell' anno 1755. a Lofanna col titolo *Dissertazion sur les parties irritables, & sensibles des Animaux*, che le due grandi scoperte di questo chiarissimo Autore, vò dire dell' irritabilità, e della insensibilità di alcune parti negli animali erano almeno di egual vantaggio al genere umano di quel che sieno l' attrazione de' corpi, la gravità, ed elaterio dell' aria, e gli altri recenti gran ritrovati, e che in oltre esse fossero per insegnare il vero modo di conoscere, e curare le malattie del corpo umano, e come adoperino in esso i rimedj ed essendomi in appresso caduto sotto l' occhio nel corpo del libro, che queste novità e principalmente l' irritabilità tendono a riformare la fisiologia, la Patologia Medica, e la Cirugia, Ella può credere se m' invogliai di bene studiare su questi ritrovati per far profitto ne' miei studj; ma dopo avere con ogni diligenza cominciata ad esaminare l' irritabilità, le dico il vero Signor Fabri mio stimatissimo, che non ci fu mai caso, che il mio rozzo ingegno potesse capire cosa s' intenda il rinomatissimo Signor Haller per quest' irritabilità, la quale indifferentemente inseguendo la definizione, che le dà, a principj differenti si può di per se stessa riferire: pure avendo fatta riflessione, che l' anzidetto Signor Haller ha pubblicato per Collega, ed approbatore della sua scoperta il Signor Gian-Giorgio Zimmerman suo attinente ed allievo promettendone da questi maggior lume, appoggio, e credito per detta sua irritabilità, mi son messo ad esaminare la dissertazione del suddetto Signor Zimmerman su quest' argomento, riprodotta in italiano da' PP. Tossetti, e Petrini in Roma, giacchè non mi è capitato l' original latino, e sentite, riveritissimo mio Signore, come concordino insieme questi due discopritori

tori sulle pretese novità. Sul bel principio della sua dissertazione riferita in detta raccolta Romana il Signor Zimmerman chiama irrlabile quel corpo, il quale per l'irritamento si contrae, ed in un altro luogo, cioè alla facciata 28. della medesima, dice che l'irritabilità si è una proprietà tale de' corpi specialmente animali, che contiene in se medesima la cagione del suo movimento, e che rende in conseguenza questi corpi privi affatto d'inerzia: nè altro più aggiunse per somministrare qualche notizia di questa irritabilità, ma dice però ingenuamente, che in molte parti dell'animale l'irritabilità, è sì grande, che ancora dopo la morte vi resta, comechè apertamente non iscorgiamo cagione veruna d'irritamento; ed altresì avanza alla facciata prima della dissertazione, che si è la 71. della traduzione succennata, che l'elasticità semplice viene da lui detta propriamente irritabilità; poi dicendo, che l'irritabilità è proporzionale alla quantità de' nervi, viene a non accordarsi col Signor Haller suo Maestro, che vuole i nervi non irritabili.

Afferisce in oltre, che nella dura madre non vi sono nervi, e pure il vostro dottissimo Sig. Laghi nell'eruditissima sua lettera indirizzata al Padre Cesareo Pozzi apertamente, e conchiudentemente dimostra il contrario, siccome tanti altri grandi Anatomici avanti di lui li avevano dimostrati procedenti dai pari quinto, e settimo, cioè Vieusseno, Munix, Valsalva, Winslow, Eustachio, ed altri, e lo stesso Signor Haller non li nega assolutamente.

Alla facciata 77. dubita della sensibilità del peristio, e delle membrane, e si risolve ad ammettere questa quando non avessero nervi; ed alla medesima facciata dà il pericranio per pienissimo di nervi, e perciò lo dichiara di un senso acutissimo, e questo va del tutto in opposto a quanto il Signor Haller maestro di esso Signor Zimmerman ha scritto.

Alla facciata 78. confessa pure sensibilissima la tonaca adnata dell'occhio, e quest'asserzione contraddice al suo Maestro.

Sul finir della facciata 80. e principio della 81. ammette i malori frequenti, che sopravvengono ad un infausto salasso, nel quale ci laghiamo per lo più della ferita del tendine.

Alla facciata 82. e 83. accorda la convulsione dall'offesa del nervo, e che dallo strignimento de' nervi s'impedisca il corso del sangue, e da queste ne nasca la cancrena. Or lo strignimento de' nervi fa contro l'Ipotesi del Signor Haller.

Alla medesima facciata 83. vuole altresì, che spesso volte sia tale la struttura del braccio, che riesca impossibile slentare la vena, senza traforare l'aponeurosi, e che si è cosa certa, che quindi ne nascono le risipole, e qualche volta le cancrene, e la febbre, dunque contro il parere del suo Maestro dà per sensibili le aponeurosi, e che queste sieno tendini ognuno lo sa; soltanto alla facciata 88. confessa, che la vera causa della contrazione de' muscoli si deve cercare nei nervi, e così con questa confessione pare, che non ammetta

ta l'irritabilità per cosa differente dall' influsso de' nervi nè muscoli.

Alla facciata 100. e seguenti, reca molti sperimenti, con i quali contro gli asserti del suo precettore, dimostra, che i nervi sono fortemente contrattili, e così pure replica alla facciata 102. che tutti i nervi sono irritabili, ed altresì alla facciata 104. pare, che ammetta, che le membrane si sollecitano.

Alla facciata 108. in opposto del Signor Haller dimostra con sperimenti la irritazione, e contrazione del condotto cistico, e della borsetta del fiele, e del condotto comune, o sia coledoco, in oltre degli ureteri, e dell' uretra.

Alla facciata 113. e seguente va annoverando oltre quegli, che riferisce il Signor Haller molti autori, che dopo alcuni antichi avendo riconosciuto, che il cuore, e i muscoli degli animali anco dopo morte, e staccati dal corpo continuano per più, o men di tempo a muoversi eziandio senza concorso di nervi o di sangue, o di qualunque stimolo, come Galeno, e poi Baccon di Verulamio, Arveo, Pejero, Brunero, Ardero, Veptero, Lovvero &c. ed alla facciata 124. Woodvvard, l' Eistero, Hartley, e per asserzione dello stesso Signor Haller Severini, Igmoro, Croom, Langrisc, Pareson, Oeder, Scharas, e Caldesi, hanno perciò riconosciuto, restare in detti muscoli anche dopo morte una certa proprietà incognita, e distinta da tutte le altre cause, d' onde vengono tali reliquati di movimento, ed alcuni di questi, e parecchi altri hanno chiamata tale incognita proprietà sotto nome d' irritabilità, quantunque detto nome torni a nulla, nulla sapendosene più dello stesso nome, e come direbbero gli antichi, non essendo, che una qualità ignota: così non si fa intendere come al Maestro del Signor Zimmerman s' attribuisca l' essere novatore su questo nome, non avendo egli agli altri aggiunto di più su tale nome d' irritabilità cosa alcuna, che importi maggior chiarezza, avendo anzi soltanto dedotto il bisogno di quest' irritabilità dal movimento de' muscoli fuori del corpo; oltracciò lo stesso Signor Zimmerman di lui Scolare alla facciata 118. reca un passo di Glissonio nella di lui opera *de ventriculo, & intestinis*, che molto meglio di nessun' altro ha parlato di quest' irritabilità, e dice, che il Signor Haller ha poi in fine adottato il sentimento del detto Glissonio; dunque accorda il Signor Zimmerman, che il suo maestro non sia il primo autore dell' irritabilità: s' aggiunga all' anzidetto, che il medesimo Signor Haller adduce molti altri, che dopo lui hanno parlato dell' irritabilità, cioè il Signor Whytt, sotto nome di contrattibilità naturale, Stuard, Gorter, Vinter, Oeder, la Mettrie, Lups, la Motte, Demagni, ed altri toltone Bellini, e Baglivi che l' avevano sotto altro nome, vale a dire di contrattabilità naturale prima di lui fatto, e non avendo nulla di più dimostrato sulla irritabilità e sulle di lei cause, e modi, di nuovo mi fa recare in ammirazione, che di questa irritabilità voglia il Signor Haller esserne il primo autore.

Alla facciata 123. il nostro Signor Zimmerman asserisce con il Signor Haller, che la membrana dell' aspera arteria è insensibile, e ne scorgo ben dimostrarli il contrario dalla sua grande irritabilità in occasione di tosse, ed altre distillazioni di petto: alla medesima egli parla del plesso nerveo intimo mezzo-colico, dunque conviene che io dica, che il mezzo-Colon, che si è parte del mesenterio, dove si distribuisce detto plesso, o sia gruppo nervoso, farà contro il sentimento del di lui Maestro manifestamente irritabile, e sensibile; quindi poco in apresso avanza di non sapere il costitutivo dell' irritabilità, e qual sia la cagione del moto del cuore, che riman dopo la morte, e donde abbiano origine le oscillazioni spontanee de' muscoli, e per fino va egli a cercare una virtù forse attrattiva del genere delle elettriche, facendo alla facciata 125. come constare, che la parola irritabilità sia del genere della parola attrazione, e siccome il Signor Zimmerman vuole, che la parola attrazione a nulla rilievi condannandola (tuttoche erroneamente) per una sol dottissima ignoranza; che cosa diremo della parola irritabilità, che poi niente affatto spiega, ed insegna? ed alla facciata 126. aggiunge il nostro Signor Gioan-Giorgio, ch' egli giammai non direbbe, che l' irritabilità della fibra muscolare sia bastante pel movimento del cuore, e de' muscoli; asserendo pure alla pagina 128. che a molti quesiti, che egli medesimo si va proponendo quali poi non iscioglie, non ha difficoltà di rispondere ciò, che hanno spesse volte risposto uomini eccellenti, cioè, che non è a noi permesso di scoprire le cagioni delle cose, ma indagarne soltanto i fenomeni in quella guisa, che il fisico cerca i fenomeni, e non le cagioni dell' attrazione, della gravità de' corpi celesti &c.

Alla facciata stessa, e 129. egli è per dare l' irritabilità a certe piante, e per credere, che questa sia una specie d' elasticità, e ciò sul parere di Svammerdamio, ma contro sempre al sentimento del suo precettore.

Finalmente è pur anco contrario il Signor Zimmerman al suo Maestro, perchè non dà egli il muco per principio, e sede dell' irritabilità siccome ne lo assegna il Signor Hallero; per le quali cose, che con tutta fretta ho quinci accozzate insieme, pensate, mio riveritissimo Signor Fabri in quanta maggior oscurità mi ritrovai dopo questo confronto, quasi disperando di non poter rinvenire, lume o guida per cavarmi da queste tenebre, ed in vero che ritrovati sono mai cotesti dove gli inventori si contradicono in radice sull' invenzione? e qual nuova legge potranno pretendere di stabilire nel metodo curativo questi novatori, quando tra loro entrano in sì aperto disparere i legislatori? A voi dunque io ricorro Signor Fabri eruditissimo, affinchè colla comunicazione al pubblico de' giudizi di qualche d' uno de' grand' Uomini del nostro secolo, che io vi sono alla mano prevenuti vogliate compiacervi di toglierli di mezzo queste tanto stucchevoli novità, e dannose, che ingerir si preten-

tendono nella nostra facoltà, e vi prego caldamente a volerne procurare la chiestavi edizione quanto più presto si possa, sia per mio particolar documento, che ben desidero, come per beneficio di tutta la Medica Repubblica, e decoro di cotesta Patria, e compromettendomi dalla Vostra innata, ed a me ben nota amorevolezza fausto accesso alla Vostra stimabilissima Persona, comechè ignoto io mi vi sia, con perfetto ossequio, e stima passo a qualificarmi.

DI VOI CHIARISSIMO SIGNORE.

Li 23. Febbrajo 1757.

Devotiss. Obbedientiss. Servitore
Dottor N. N.

LET.

L E T T E R A

DEL SIG. DOTT. GAETANO ROSSI

Medico Collegiato, Lettor Pubblico nella Università
di Modena, e dimostratore di Piante nel
novello Estense Orto Botanico

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNORE

FERDINANDO MARCHESINI

Professor pubblico di Medicina nella Università di Bologna,
e Dottore Collegiato.

AMICO STIMATISSIMO.

DAl momento, in che io ricevei l' ultima vostra lettera, ho sempre avuto a cuore l' obbligazione di rispondervi, massime ove mi comandate di dirvi il sentimento mio intorno alla controversia, la quale sul proposito delle moderne Halleriane scoperte tiene divisi i due celebri, e valorosi Professori colleghi vostri, i Signori Laghi, e Caldani: Ma le mie occupazioni seriosissime non mi hanno giammai permesso di compiacere a me stesso nel desiderio vivissimo di obbedirvi. Sussistono tuttavia, anzi per novella onerosa cagione s' accrescono le medesime mie occupazioni: Ma sieno pur quant' esser si vogliano, non potranno certamente differirmi più lungamente la soddisfazione di compiere a un dovere, cui avrei però sempre preferito a qualunque altro impegno, se non avessi avuto a fare con esso voi, che per essere pieno di bontà per me, sò, che vorrete avermi sempre per iscusato.

La maniera di pensare, e dello scrivere del dottissimo Signor Laghi non mi riesce punto nuova. Ne ho in altri tempi avuti saggi, ed hò ricevute dello stesso avidamente le dottrine; e però quanto ho io letto, nella sua Lettera scritta l' anno passato al P. Pozzi non ha fatto che assodarmi nella buona opinione, nella stima, e nel rispetto, che hò sempre avuto d' un Professore di un merito non ordinario (1). Nuovo bensì affatto mi è stato il nome del Signor

Suppl. Part. II.

N

gnor

(1) Lettera quarta del P. Urbano Tosetti scritta li 2. Novembre 1756.
e Stampata in Roma dal Zampel l' anno corrente alla pag. 1.

gnor Caldani; e la lunga sua Lettera scritta al Signor Haller ha riscossa tutta la mia ammirazione; trovandosi difficilmente accoppiata tanta dottrina in giovanile età.

Veramente il partito da esso preso a seguitare, sebbene in confronto dell' opposto, che per il numero de' seguaci è incomparabilmente minore, sembri dover prevalere, io non farei però le maraviglie, se dovessi vederne un giorno rallentata la forza, con che in oggi sì vivamente si sostiene.

Voi vedete quanto diversi sieno stati i risultati degli esperimenti sopra le parti, che voglionfi, o nò sensitive. Lo stesso Signor Caldani, che ha trovato insensitivo il Tendine d' Achille, la dura Madre, il Pericranio, il Peritonèo, la Pleura &c. non è stato senza esempi della sensitività di alcune di queste parti: talmente che in difesa del sostenuto halleriano ritrovamento gli è convenuto ricorrere alle anatomiche dissemine, ed a quelle ragioni, le quali da lui sonosi credute più in acconcio, non solamente per farlo reggere a fronte de' stessi dubbiosi esperimenti, ma bensì ancora per abbattere che che ne abbiano detto, o scritto que' pochi, ai quali è sembrato ragionevole il dover dubitare della verità di tali scoperte. In vero egli è sommamente ingegnoso nel sostenere il suo impegno, e il metodo da esso lui tenuto nello sperimentare sul tendine d' Achille toglie al Signore Laghi ogni difesa, quando pur voglia far sussistere le proposte difficoltà sopra la maniera praticata in addietro. Questo metodo abbraccia due cautele, le quali accortamente dal Signor Caldani osservate si sono. La prima cioè di tagliar il tendine per traverso, e vestito della propria vagina, e l' altra di compiere, e perfezionar sollecitamente l' esperimento. A queste due cautele corrispondono due vantaggi singolarissimi: alla prima cioè quello di assicurarsi di non render stupido il tendine in conseguenza di quella troppo severa preparazione, per la quale spogliandosi il tendine medesimo si verrebbero a lacerare que' nervi, che dalla vagina allo stesso passar si vogliono, e diramarfi; ed alla seconda quello di non temere che possano indebolirsi, o perdere la facoltà sensitiva quelle parti, le quali preparate prima dolorosamente, e poi vestite di fascie, e munite conservansi per i susseguenti tentativi. Il pensiero del Sig. Caldani non poteva certamente esser più adattato alle circostanze; ma per validamente sostenere, e difendere il partito Halleriano da lui preferito, e seguitato, sarebbe veramente stata desiderabile la costanza, e uniformità de' risultati dagl' esperimenti in cotale guisa tentati. Voi avrete letta la di lui Lettera, dove rapporta i fatti molto fedelmente, sicché non mi rimane sopra di ciò veruna cosa a soggiugnere: solamente vi prego a voler compatire una conghiettura, che mi pare sopra questo proposito di poter azardare.

Il cercare, dice il P. Urbano (1), se una certa parte degli animali

(1) Lettera quarta suddetta §. XXI. pag. 15.

malis sia sensibile è lo stesso che cercare se ricevà de' nervi. Dunque, soggiungo io, saranno sensitive tutte quelle parti, che saranno dotate di nervi. Questi nervi sono stati osservati nel tendine d' Achille dal Vieussensio, dal Signor Laghi (1), e delineati ancora dal Signor Borghi. All' incontro si negano dal Signor Caldani, dal P. Urbano, in una parola da tutti quelli ai quali piace di sottoscrivere all' oracolo del Signor Haller. Dunque non saranno così facilmente visibili, altrimenti il negarne la palpabile esistenza sarebbe una pervicace cecità, che non ha esempio. Le ricerche, le quali sonosi fatte di questi nervi aggiransi tutte sopra quelle propagini dello sciatico; le quali si sono bensì vedute poggiar sulla vagina del tendine, e prolungarsi verso il calcagno, ma dagli halleriani non si sono però vedute nè in tutto, nè in parte penetrar la sostanza del tendine. Io non ho capitale, che basti per decidere fra questi due anatomici partiti, e però lascio a voi, e a chiunque altro la libertà di appigliarsi a quello che più gli vada a genio. Dimando solo: se questi nervi poggiassero su per la vagina del tendine non lo penetrassero veramente esso, pure non si potrebbe per avventura pensare, che d' altronde introdur vi si potessero? Vediamolo un poco. Il tendine non è altro, che lo stesso muscolo (2), le di cui fibre sonosi prolungate, e ristrette in un fascio o sia volume meno esteso. Il muscolo non è senza nervi. Perchè dunque nel prolungarsi, e restringersi in tendine non potranno essergli compagni que' nervi, che per entro la sua sostanza gli ha costantemente la natura distribuiti? Qual cosa ripugna mai a questo, che pure può dirsi ordine di natura? Non scorrono forse per entro il tendine i suoi fluidi, ivi condotti da proprj vasi (3) e differenti? perchè non potranno dunque insinuarsi ancora di que' canali, che portano in se racchiuso un fluido, ch' esser debbe il più sottile di quant' altro mai contener si possa in un corpo animale? Mi risponderete per avventura col Signor Castell (4), che la stretta, e soda tessitura de' tendini sembra contraria alla virtù sensitiva, ricercandosi nelle parti destinate alla sensazione flessibilità, e mollezza: in oltre, che sebbene i tendini nascan da muscoli, e ne' muscoli si portino molti nervi, questi però si distribuiscono nella carne del muscolo, ivi si perdono, nè giungono fino al tendine (5): e conchiuderete esser questo il sentimento de' Signori Albino, Haller, e dello stesso Boerhaave appoggiato ad esatte, e reiterate osservazioni. L' obbiezione è veramente di forza, e tanto maggiormente, quanto che

(1) Nella sua Lettera sopracitata verso la metà. Quando si citerà il Sig. Laghi s' intenderà sempre questa medesima sua Lettera.

(2) Dissert. del Sig. Castell nel Lib. tradotto dal P. Pettrini §. XXXVII. fol. 149. (3) La medesima Dissert. §. XXXVIII. fol. 150. (4) La medesima, luoghi detti. (5) La medesima, luoghi detti.

viene avvalorata dalle anatomiche osservazioni d' Uomini grandi, diversamente dai quali sembra che sentir non si possa senza taccia di temerità. Pure senza fortire da que' limiti di venerazione dovuta ad Autori cotanto insigni ardisco replicare, che la stretta, e soda tessitura de' tendini non è tale, sicchè si debbano essi con fondamento suppor privi di quella sufficiente flessibilità, e mollezza alla virtù sensitiva necessaria. Non sono i tendini i calli, del P. Urbano (1), cioè parti estinte, e inutili; sono parti viventi, essenziali, le quali hanno i loro vasi, e molto probabilmente i loro nervi ancora, i quali sebbene non sieno stati osservati a passare dalla sostanza muscolare alla tendinosa, esser però nondimeno possibile un tale passaggio, e propagazione. Da questa potenza, o possibilità si passa facilmente a tenerne per ferma la reale esistenza, sempre che accada di poter produrre esperimenti, che alcuna volta sensitivo abbiano dimostrato il tendine; giacchè, ove è senso, ivi è pure infallibilmente nervo ancora: Ma siccome appunto fra gl' esperimenti tentati sopra il tendine d' Achille possiamo contarne di quelli, che lo hanno mostrato sensitivo, così conchiudo la mia conghiettura coll' asserire, che dunque d' altronde, e specialmente dai muscoli ai tendini i nervi propagare si possono.

Può darsi che questa mia conghiettura non sussista; ma la maniera da me tenuta in pensarla, io la credo la più sicura. Io non dico che nel tendine vi sieno nervi, e per illazione meno probabile, che dunque vi sia senso ancora: Anche la cute è di sottilissimi nervi pienissima, e però di una sensitività squisitissima, pure non è senza esempj d' insensitività (2). Dico bensì, che dove è senso ivi debb' esser nervo. Nel tendine d' Achille si è trovato senso: dunque in questo medesimo tendine dovrà esserci nervo ancora.

Con questa stessa maniera d' argomentare si può passare a dubitare della sostenuta insensitività di tutte quelle parti ancora, le quali messe alla tortura non ne hanno dati segni costanti. La dura madre, a cagion d' esempio, la quale sperimentata dal Signor Laghi sotto del cranio è stata sensitiva, tale non è però creduta dal Signor Caldani, benchè nello sperimentarla, solleticandola anche, gentilmente nella sua faccia concava abbia veduti spesse volte agitarsi gl' animali agli esperimenti sottoposti, malgrado i riguardi suggeriti, e praticati (3) dalla mano maestra del celebratissimo Signor Molinelli, per non doverli rimproverare di non aver garantito il

(1) Lett. quarta §. XIII. fol. 8. (2) Immò ne ipsa quidem cutis perpetuò sensitiva videtur. Lettera del Sig. Laghi. Leggete ancora fra l' altre cose la nominata Lettera quarta del P. Urbano al §. XV. fol. 10. e anche la Lettera del Sig. Caldani §. V. nell' Esperimento II. sopra il Cervello, e nel §. 54. (3) La detta Lettera del Sig. Caldani all' Esperimento IV.

to il cervello da qualunque dolorosa pressione. Favoriscono la sensitività di questa membrana le autorità rispettabili dell' Heistero, e del Winslov, i quali hanno insegnato, che alla dura madre trasferisconsi delle propagini di nervi provenienti dal quinto, e settimo pari; e la testimonianza del Signor Dottore Ignazio Vari, il quale nell' esperimento sopra questa membrana ha avuta la fortuna di vedere (1), che qualora il botton di fuoco si applicava a qualche ramo, o filo nervoso a bello studio ricercato l' animale dava segno di acuto senso. Ciò non ostante viene l' esistenza di questi nervi talmente combattuta dal Signor Caldani, e dalle bellissime osservazioni del sapientissimo P. Urbano (2) che parerebbe non dovesse restar scampo al partito contrario, se gl' esperimenti non comprovassero, che la dura madre può essere dotata di nervi tali da poter egualmente nascondersi alle più diligenti ricerche, valevoli a renderla suscettibile di quel senso, che pure si è osservato.

Penso, per non esser soverchiamente prolisso di lasciare a voi la briga di andare avanti con tale maniera di argomentare in questa parte di scoperta che riguarda la insensitività, là dove si estende a tutte le altre parti, le quali sottomesse al cimento, non hanno perfettamente secondati gli osservatori nelle intenzioni, per le quali hanno cotanto sudato. Solamente aggiungo, che il Signor Caldani e con esso tutti gl' altri sostenitori dell' Halleriano sistema, non dovranno ormai più recarsi a torto, se tal' uno, fra i molti, che su tal materia alcuna cosa hanno detto, siaci che non ami di militare sotto le per altro sempre onorevolissime insegne Halleriane, dopo che lo stesso Signor Haller nel suo libro uscito dalle stampe di Losana; il di cui primo Volume contiene una seconda edizione corretta della sua dissertazione sopra l' irritabilità, parlando del Perioftio; e del Pericranio non ha avuto riguardo, o difficoltà di asserire: che nella incertezza di tali cose sarà miglior consiglio quello di nulla dire di positivo sopra la insensitività del pericranio; e di rimetterne la decisione agl' ulteriori esperimenti. Ma passiamo a dir brevemente alcuna cosa sopra l' altra scoperta.

Questa proprietà fu nota per sino agl' antichi sacrificatori, i quali videro palpitare le viscere staccate dai cadaveri delle vittime, recentemente imolate. Non è dunque ritrovamento nuovo: e lo stesso Signor Haller con ingenuità, e modestia da suo pari lo ha già detto (3). Nuova bensì può dirsi la causa che di questa proprietà il medesimo Signor Haller assegna. Ma gli esperimenti fatti per dimostrar-

(1) Leggete questo caso in una Lettera del detto Sig. Vari inserita nella Lettera terza del P. Urbano, stampata colle Dissert. tradotte dal P. Pettrini alla pag. 214. (2) Lettera quarta suddetta §. XXVII. e seguenti, fol. 20. cc. (3) Dissertaz. dello stesso tradotta dal P. Pettrini fol. 59.

strarla, siccome non corrispondono perfettamente, e come necessario sarebbe, così sono persuaso, che i fenomeni della irritabilità si dovranno spiegare con i soliti principj già universalmente ammessi nelle Scuole. Il Signor Caldani ha molto diligentemente, e con tutta la precisione, ed esattezza imitato il Signor Haller nel ripetere i più essenziali esperimenti su questa materia: Ma non è perciò arrivato a poter far cessare da i suoi ritmi il cuore semprechè, o col taglio delle Cave, o colle altre cautele usate abbia procurato di sottrargliene col sangue la causa, che si produce, e sostiene: e se allora, quando per consiglio del Signor Verati (1) si facevano le incisioni longitudinali nell' aorta cessava il moto del ventricolo sinistro, sembra certamente, che non fosse da stupirne, poichè dopo un taglio così mortale ogn' un ben vede, che venendo istantaneamente defraudato il cervello del sangue, che gli somministrano perpetuamente le Carotidi debbe rilasciarsi l' incompressibilità del fluido nerveo, e cessar debbono conseguentemente col cuore medesimo tutti gl' altri movimenti vitali ancora, e voluntarij. Il Signor Laghi, cui non sono riusciti più felicemente i successi, non è inclinato ad aderire a questa nuova sentenza; e credo benissimo che se avrà osservato il fenomeno dell' estratto cuore dalle rane, il quale è solito a muoversi da se, cessare dal moto, e ripigliare i suoi ritmi (2) avrà abbandonato affatto il pensiero, se mai l' avesse avuto di seguitare gli Halleriani; per attenersi ai suoi animali spiriti. Questi spiriti si vorrebbero in casi simili escludere, a cagione del difetto della continuazione dell' influsso de' medesimi, necessario (3) a ripararne l' egresso, e perdita: ma non mancano per mio avviso ragioni da opporre a tali difficoltà. Egli è bene desiderabile che nell' Halleriana sentenza si renda conto delle convulsioni di quelle parti, i di cui nervi sieno stati punti (4), o elettrizzati (5): Che se i nervi non sono irritabili (6), e se dai medesimi l' irritabilità non dipende, qual farà mai la strada, per cui le punture de' nervi, e la materia elettrica saranno pervenuti ai muscoli per eccitar loro le convulsioni? Ma è egli poi vero che questi nervi non sono irritabili? Il Signor Zimmerman, scostandosi dal sentimento del Maestro, dice che lo sono. Come v'adunque la facenda? Io non voglio inoltrarmi nella questione, perchè comprendo, che inciamperei facilmente. Vi dirò solo, che se l' Halleriana irritabilità resti evidentemente dimostrata, tutti i principj della moderna fisiologia faranno un giorno svelti da loro fondamenti: e si potrà allora

(1) Letter. del Sig. Caldani nell' *Esperim. XVI.* sopra l' Irritabilità. (2) Lo stesso Sig. Caldani *Esperim. detti al num. XVII.*

(3) Lettera detta del Sig. Caldani §. *XCVIII.* (4) Haller. *Diff. et tradotta dal P. Petrucci Sez. 3. f. 41.* Zimmer. *Differ. §. 37.*

(5) Caldani. §. *XCIV., XCVI.* (6) Haller luogo suddetto.

allor far camminar l'irritabilità del pari coll' attrazione dell' immortal Nevvton, dicendo col Signor Dottore Tissot d' esser debitori agli Svizzeri della Fisiologia, siccome lo siamo all' Inghilterra della fisica (1). Intanto la patologia sembra incominciare a godere il frutto della scoperta insensitività, ed il coraggio, che il Signor Vespa (2) ha dedotto da questa scoperta medesima, potrà servire d' esempio, e rincorare i più paurosi. Con tutto ciò, io consiglierò sempre qualunque Professore ad esser ben cauto nel maneggiare gli strumenti chirurgici; e nel caso massime di trattar il tendine d' Achille aver sempre presente l' avvenimento funesto riferito dal nostro Signor Morando Morandi (3). Non è da temersi la ferita d' un tendine, quand' anche venga dimostrato sensitivo: In tal caso debbono camminar del pari la ferita d' un tendine, e quella della stessa cute. Temer devesi la puntura d' alcuno di que' nervi passaggieri (4), che scherzano sopra la vagina del medesimo tendine; e nella operazione della paracentesi all' Addomine refterà sempre il pericolo di pungere mortalmente alcuno di quei, che variamente poggiano sul Peritonèo. Ma egli è ormai tempo, che dia termine a questa mia noiosa diceria.

Voi avrete per avventura, anzi che questa lettera, aspettata più tosto da me la relazione di qualche sperimento, che sopra l' insensitività, ed irritabilità d' alcune parti degli Animali, possa essermi venuto talento di tentare. Ma sappiate, che dopo d' aver letti quei, che sono riferiti dagli Autori sopraccitati, ho creduta inutile, e superflua occupazione quella d' impegnarsi a farne de' nuovi; sebbene dica su questo proposito molto acconciamente il Signor Caldani (5), che per ricercare la verità del nuovo sistema Halleriano sia ottimo consiglio, sapendo farlo, lo sperimentare di propria mano. Io non sono temerario a segno di voler trovar a ridire sopra gli esperimenti degli altri, e sopra la maniera da loro tenuta in tentarli: anzi mi compiaccio di crederli tutti rettamente istituiti, e fedelmente riferiti. Questi medesimi esperimenti hanno diretti i pochi, e malconci miei raziocinj, e nella mia lettera non mi sono punto scostato dai sentimenti gravissimi sparsi per entro le scorse Opere di questi medesimi Autori, valendomi di loro per meditar sopra fatti, e scoperte di tanta importanza, e per dar quel peso, che hò creduto convenire alle poche ragioni, le quali fra i diversi sentimenti de' Signori Laghi, e Caldani m' avete eccitato co' vostri comandi a pronunciare. Non mi faceste dunque la ingiustizia d' ascrivermi a pigrizia la fatica risparmiata d' esaminar per lo mezzo

(1) Discorso preliminar. nella Traduzione del detto P. Petrini fol. 6.
 (2) P. Urbano Lett. quarta §. XXIII. f. 17. (3) P. Urb. Lett. terza del detto Libro alla pag. 215. (4) Detto P. Urbano Lett. quarta suddetta §. XXII. fol. 15. (5) Lettera suddetta al §. XI.

mezzo delle sperienze questa causa; e se non mi è piaciuto di mettermi colli Halleriani, non vorrei, che me ne faceste col Signor Dottore Tissot (5) un delitto d' invidia, per non rendere l' onor dovuto all' immortale, al grande Signor Haller. Le poche, ma salde ragioni del Signor Laghi mi hanno persuaso a fronte di tutta insieme la congerie di quelle degli Halleriani, che sono per altro piene di una sublimissima dottrina, e massime quelle del P. Urbano Toffetti, la di cui lettera quarta, più volte memorata passerà sempre per la più forte Apologia del Signor Haller contro del Signor Laghi.

Persuaso finalmente d' aver così in alcuna maniera soddisfatto al dover mio, che è d' ubbidirvi, nulla più mi resta, che il rinnovarvi le mie scuse per la soverchia tardanza mia, e l' assicurarvi, che sono sempre con pienissima stima.

DI VOI AMICO STIMATISSIMO

Modena 29. Novembre. 1757.

Devotiss. Servit., ed Amico Affezion.
Gaetano Rossi.

DELLA

(1) Nel detto Discorso preliminare tradotto dal P. Pettrini. Ediz. di Roma del Zempel dell' anno 1755. alla pag. seconda.

DELLA SENSIBILITA', ED IRRITABILITA'

Delle Parti del Corpo Umano

L E T T E R A

DI GIUSEPPE BERTOSSI

FILOSOSO, E MEDICO

*In risposta a richiesta fattagli da un Amico
sopra tale Argomento.*

A M I C O .

LA tardanza in rispondervi non provenne da trascuratezza, o da qualunque altra colpa che mia si possa dire, anzi provenne da premura di servirvi, e per non dare alla richiesta vostra una risposta vacua, o almeno poco concludente. Per assicurarvi di questo dirò, che dovendo io, per soddisfare a quanto voi da me chiedeste, esporvi il mio sentimento sopra ciò, che è stato scritto da varj, e celebri uomini circa le parti del corpo umano da loro credute, e predicate altre sensibili, ed altre insensibili, altre irritabili, ed altre non irritabili, mi si conveniva avere esaminato quanto sopra di questo essi aveano e detto, ed sperimentato, il che non avendo io per anche fatto in allora, dovetti dopo la vostra richiesta farlo, se volea formar quell' idea, che m' era necessaria per esprimervi il mio sentimento. Ed eccone la cagione di mia tardanza. Se poi la ragione bramate sapere, per la quale dopo essere usciti tanti Scritti, replicate tante esperienze, ed insorto tanto strepito nel mondo erudito, io ne fossi ancora del tutto all' oscuro, se è lecito parlare liberamente, dirò, che al solo udire da alcuni in confuso, e per discorso di passatempo la proposizione, che nel corpo dell' uomo vivente, ed in perfetto stato di sanità vi sieno delle parti insensibili, e non irritabili assolutamente, giudicai *ex abrupto*, che l' asserir ciò, fosse un gagliardissimo assurdo, nè volli altro udire in tal proposito, persuaso di già, che tutto ciò, che si potea dire in favore di tal proposizione, non potesse da altro dipendere, che, o dal non intendere i termini sensibilità, ed irritabilità, o da raziocinj fondati sopra esperienze mal intese; e di questo mio precipitoso giudizio la colpa attribuisco a quella parte di filosofia, che ai principj delle fisiche cognizioni m' ha indirizzato.

Suppl. Part. II.

O

Questo

Questo accadde mentre io inteso a Studj di grave importanza dimorava in Padova: essendo poi passato per qualche tempo ad altri Studj in Bologna, ebbi occasione di conoscere fra quei celebri, e rinomati Professori, chi avea esaminato, e col raziocinio, e con le esperienze quanto importava tale materia, e conchiuso aveano, non esser poi tutto vero, quello che da tali Scrittori si pretendeva dimostrare. Da questo fui maggiormente confermato nella mia risoluzione, nè da questa altro potea distogliermi, che la premura di servire un amico qual siete voi, e perciò senz' altro indugio mi procurai in parte quei libri, che credetti necessarij a tal impresa, e che nella brevità del tempo, che io potei impiegarvi, mi vennero alle mani.

In leggendo questi, mi s' offerse prima di tutto le definizioni della sensibilità, e dell' irritabilità, dichiarando per parti sensibili nell' uomo quelle, le quali toccate trasmettono all' anima l' impressione di questo contatto, e negli altri animali quelle, l' irritazione delle quali cagiona in essi segni evidenti di dolore, e d' incomodo; insensibili al contrario quelle, che essendo bruciate, tagliate, punte, ferite, ammaccate, e contuse fino ad una intera distruzione, non producono alcun indizio di dolore, incomodo, convulsione, nè cambiamento nelle operazioni del corpo: irritabili poi quelle parti del corpo umano, che divengono più corte, quando qualche corpo straniero le tocca alquanto gagliardamente, manifestandosi la maggiore, o minore irritabilità delle parti dall' accorciarsi più, o meno sotto una forza uguale di contatto; le non irritabili quelle, le quali per qualunque forza di tatto esterno niente del tutto s' accorciano.

Dopo questo vi ritrovai una quantità innumerabile d' esperienze, per le quali furono con inusitati modi afflitti, e trucidati animali in gran numero, e di varie specie; di modo che la setta de' Pitagorici non potrà a meno, di non risentirsene gagliardamente contro chi tali esperienze à istituite.

Tutte queste esperienze ad altro non le fanno servire, che a dimostrare una real differenza tra la sensibilità, e l' irritabilità ne' corpi di tutti gli animali viventi, e che in questi vi sieno delle parti, altre sensibili, ed altre insensibili; altre irritabili, ed altre non irritabili, dichiarando per parti sensibili il cervello, i nervi per la loro midolla, e le parti seguenti pei nervi, cioè la pelle, i muscoli, lo stomaco, gl' intestini, la vescica, gli ureteri, l' utero, la vagina, il pene, la lingua, la retina, il cuore, ma questo meno, che gli altri muscoli, e dicendo, che le viscere, e le glandole non hanno, che pochi nervi, e in conseguenza poca sensibilità: per parti insensibili poi l' epidermide, la tessitura cellulare, il grasso, i tendini, le membrane tanto quelle, che ricuoprano, e fasciano i visceri, quanto quelle, che sono intorno alle articolazioni, la dura, e pia madre, i legamenti, il perioftio, il pericranio, gli ossi, la midolla,

la cornèa, l'irride, le arterie, e le vene, in quei luoghi soli però ove non ricevono nervi: per parti irritabili il cuore, i muscoli, il diaframma, il ventricolo, gl'intestini, i vasi lattei, il canal toracico, la vescica, il seno mucoso, l'utero, e le parti genitali: indi per parti non irritabili i nervi, l'epidermide, la pelle, le membrane, le arterie, e le vene, la tessitura cellulare, e le viscere; soggiugnendo, che i condotti escrettori non hanno se non una irritabilità estremamente debole, e che richiede una molto forte irritazione; e dichiarando per ultimo parti sensibili insieme, ed irritabili tutte quelle, ove si trovano nervi, e fibre muscolari, cioè i muscoli, il cuore, il canale dell'alimento, il diaframma, la vescica, l'utero, la vagina, e le altre parti genitali. Fra quelli, che le sudette esperienze hanno instituite, vi ritrovai qualche discordia nell'asserire la sensibilità, e l'irritabilità d'alcune parti: ma questo poco fa al caso. Dopo aver letto ogni cosa, cominciai a fare quell'esame, e quelle riflessioni, che tal materia sembrava richiedere, nella seguente maniera.

Parte sensibile nell'uomo vien chiamata quella, la quale toccata trasmette all'anima l'impressione di questo contatto. Ecco il termine sensibile da loro spiegato. Io cerco, il senso, qualunque egli siasi, o di piacere, dipende egli da altro, che da una variazione dello stato nel quale una data parte dell'animale prima di questo si ritrovava? Se egli da altro non dipende, la parte, che vien variata per produrre questo senso, o ella sente per se stessa, ed in quanto è corpo modificato in quella data maniera, senza che l'altro principio, del quale ogni animale è talmente composto, che questo disgiunto dal corpo si toglie l'essere d'animale, ed è quello, che io chiamerò spirito animale incorporeo, lasciando in libertà a chiunque, il chiamarlo come vogliono; o ella sente in quanto per essa s'aggira questo dato spirito: se ella di per se stessa sente, gl'istessi segni di sensazione ci deve dare nell'animale morto, che nell'animale vivente, il che è contro il fatto: se poi sente in quanto lo spirito per essa vi s'aggira, ella non si può più considerare come soggetto di sensibilità, ma come mezzo, e strumento, ed il soggetto in tal caso diventa lo spirito animale; adunque nessuna parte corporea nell'animale anche vivente ha per se stessa sensibilità, ma di questa è solo strumento, e perciò solo si chiama sensibile. Ora se la parte sensibile dell'animale non sente di per se stessa, ed in quanto alla propria struttura, e se è vero, che il soggetto di sensibilità sia lo spirito animale, o questo spirito si diffonde solamente nelle parti che si vogliono chiamare sensibili, o si diffonde anche in quelle, che si pretendono per insensibili: se si diffonde solamente nelle parti sensibili, dipendendo la vita, e la nutrizione dell'animale dall'irradiazione di questo spirito, e non potendosi senza questo aver vita, o nutrizione, le parti insensibili dovranno restare per conseguenza prive e dell'una, e dell'altra, almeno dalla sua prima formazione

in poi: ma qual è mai quella parte in verun animale, che tale si possa dire? Se poi anche nelle parti pretese insensibili lo spirito animale si diffonde, o egli perde nel diffondersi la virtù sua, o egli non la perde, e resta come prima: volendo dire, che perda la virtù sua, si distrugge il suo essere, e perciò non si potrà più dire, che per quella parte s'aggiri lo spirito animale, il che è contro il di già provato: resta adunque qual era prima: Se resta qual era prima, deve poter essere anche in queste parti soggetto di sensibilità non men che nelle altre: dunque quando s'abbia variazione anche in queste, perchè non s'ha d'aver sensibilità, dipendendo la sensibilità anche delle prime da questa variazione?

Gli autori della insensibilità risponderanno, perchè nelle esperienze da loro fatte, non anno avuto dagli animali quei segni di dolore, quando sono state variate le parti dichiarate per insensibili, come quando sono state variate le sensibili. Io per me ad una tale risposta non m'acquieto, ma bensì cerco in prima da loro, qual sia quella parte esterna del corpo umano, che non trasmetta allo spirito animale una benchè minima sua variazione, cagionatala da un benchè minimo contatto? a me certamente una tal parte non dà l'animo di ritrovarla, e se loro m'opporanno esservi la cornea, dirò a loro d'aver fatta l'esperienza sopra me stesso, e d'aver provato una sufficientissima sensazione.

In oltre cerco, se le esperienze da loro instituite sopra le parti interne predicate per insensibili, le anno instituite senza lacerazione d'altre parti, per la quale l'animale abbia dovuto provare gagliardo senso, ovvero se abbian dovuto fare una qualche lacerazione? per certo che senza lacerazione di parti di grave senso, particolarmente nelle esperienze fatte sopra tendini, membrane, legamenti, perioftio, ossa, pia, e dura madre non le anno instituite: se dunque l'animale non dava indizio di sensazione nell'irritare queste parti chiamate perciò insensibili, si dovrebbe più tosto arguire, che il senso, che provava per lacerazione delle parti prime fosse maggiore, e che perciò non gli lasciasse campo di poter conoscere una minor sensazione, essendo cosa troppo nota, che una sensazione maggiore non lascia sentire una minore nel tempo stesso, non potendosi perciò dire, che quella parte irritata, non possa aver particolare sensazione, quando le si tolga l'ostacolo d'una sensazione maggiore; nè vale qui il rispondere d'aver lasciato acquietare l'animale dopo la lacerazione dell'altre parti, poichè questo non toglie l'oggetto, che anche dopo acquietato le seguiti una grave sensazione, essendo questa cosa nota ad ogn'uno, che abbia un benchè minimo taglio provato. Se poi le desse l'animo d'assicurarmi che quando essi anno instituite queste esperienze, l'animale non provasse più alcuna sensazione per la lacerazione delle altre parti, il che credo impossibile, allora farò un'altra ricerca, e dirò, o sono state irritate quelle parti, mentre erano nel loro stato naturale, ove

ro mentre erano fuori del loro stato naturale. Se nello stato naturale, dovea v. g. il tendine esser coperto dalla sua vagina, e dagli altri integumenti non inutilmente fattigli dalla natura, non dovea essere alterato dall' aria esterna, non dovea perdere quel vapore, che tutte le parti interne perdono, quando sono all' aria esposte; così le membrane facilissime ad esser in un istante alterate dall' aria, non doveano essere a questa esposte, e così anch' esse perdere gran parte della sua più necessaria sostanza vaporosa assegnatali dalla natura; l' istesso diremo della dura, e pia madre, pericranio, perioftio, legamenti, e di qualunque altra parte: ma tutto questo è contro il fatto: adunque sono state irritate queste parti, mentre erano fuori del loro stato naturale: adunque se furono insensibili fuori del loro stato naturale, lo anno da essere anche nello stato naturale? tal conseguenza non mi pare certo ragionevole. Perchè questa conseguenza potesse avere almeno apparenza di verità, converrebbe in prima provare che gl' integumenti di queste parti a nulla servissero, e che fossero puramente accidentali: in oltre, che quella sostanza vaporosa, che esse perdettero dopo levati gl' integumenti, non le servisse in alcun modo a mantenerle in istato di vita naturale; di più, che nella perdita, che fecero di una tal sostanza, non perdessero anche quella parte di spirito, che per esse s' aggrava, e che la pressione dell' aria non abbia fatto in modo restringere, ed otturare quei minimi seni per i quali il già perduto vapore unito allo spirito per esse parti si diffondeva, e perciò ristretti, ed otturati non permettessero una nuova insinuazione di parte di quel vapore, e spirito, che a queste dalle altre parti nel stato naturale potea provenire: ma, e chi farà mai quello, che possa tali cose asserire, e provare? chi ci dimostrerà, che la midolla stessa de' nervi spogliata dalle sue tuniche non perda anche essa la sensibilità, colla perdita di questo spiritoso vapore, che da essa ne parte? veggiamo con costante sperienza, che ogni nervo esposto per qualche spazio di tempo in modo, ch' ei venga circondato dall' aria, in poco tempo si dissecca, e perde in uno e la nutrizione, ed il senso: lo stesso vediamo negl' intestini, nella vescica, negli uretri, e in tutte le altre parti ammesse da loro per sensibili, a proporzione però della loro grossezza, e del vapore, e dello spirito, che in esse si ritrova.

Così dunque dopo tali riflessioni si potrà dedurre dalle loro sperienze? altro io non vedo, si possa dedurre, se non se, che le parti dell' animale quanto più sono di loro natura tenui, come le membrane, le miningi, pericranio, perioftio ec. tanto più presto perdano quello spirito, che loro dà vita, e senso, quando o tutto il corpo principia a perderlo, o qualche esterna causa permette, che se ne voli. Un' altra conseguenza si può cavare, ed è, che gli estremi di qualche parte dell' animale perdano lo spirito vitale prima della parte media, e che questa sia una delle cause, per le quali i tendini, ed i legamenti nelle loro esperienze non abbiano cagiona-

ta sensazione nell' animale, tutto che il muscolo la cagionasse; queste sono conseguenze, che mi sembrano ragionevoli.

Due ragioni di troppo valide, e convincenti, dal fin qui detto appariscono, per le quali, nel caso delle esperienze, le sopraccennate parti sono state trovate insensibili. La prima il continuo dolore, che l' animale prova per la lacerazione d' altre parti, la seconda per essere stati le parti irritate fuori del loro stato naturale, e perciò in allora considerate si possono come parti morte, tutto che però sieno in istato di ricevere nuova vita, levando loro le cause, che gliela contrastano.

Queste stesse ragioni vengono confermate dall' esperienza ancora. Che una sensazione maggiore ne impedisca una minore, la comune, ed universale esperienza ce lo addita. Che nel loro stato naturale, anche le parti, che a tutta forza si vogliono insensibili, abbiano senso, l' esperienza d' un infinito numero di Chirurghi ce lo insegna: poichè tutti i Chirurghi, co' quali ho potuto parlare, m' anno accertato, che s' avviene, che essi profondino la lancetta in modo, che la punta d' essa tocchi il perioftio, il che non di rado avviene ne' salassi, che fanno sopra il malleolo, ed essi se ne accorgono dalla resistenza, che provano, succedendo loro tal volta ancora di spuntare la lancetta, se avviene, dissi questo, il salasso si rende assai più doloroso dell' ordinario. Un' altra esperienza, che costantemente s' osserva, e da me fatta coll' occasione, che l' ingegnosissimo Sig. Dott. Domenico Vandelli, faceva le sue esperienze sopra la sensibilità della dura madre, ce lo conferma. Si doveva perforare col trapano il cranio ad un gatto, io feci la trapanazione, ed essendo il cranio sottile di troppo, accadde, che la punta, che serve di perno al trapano, arrivò a ferire leggermente la dura madre: il gatto allora diede gagliardissimi segni, e di senso, e di convulsioni: si proseguì con altro stromento l' operazione, per levare quel pezzo di cranio, che s' era di già cominciato a separare: levato questo, ed irritata la meninge con la punta d' un ferro, e lacerata con la forbice non dava più segni di senso, nè di dolore, ma internato nel sito della lacerazione un sottilissimo stiletto, e vellicata al di sotto, dava di nuovo segni di senso, e di dolore gravissimo: lo stesso pure succedeva, se tra il cranio, e la meninge stessa si faceva la vellicazione. Questo s' osservò ancora in un cane, ed in altri animali, facendo l' esperienze con sollecitudine.

Dall' accennata esperienza s' osserva, che la dura madre coperta ancora dal cranio, e non alterata dall' aria, prova un grandissimo senso, essendo allora nel suo stato naturale. S' osserva, che levatole l' integumento del cranio, e perduto quel suo naturale vapore esteriormente, e provata l' alterazione, e la pressione dell' aria, non dà più segni di senso. S' osserva, che vellicata al di sotto, ove per la sua, benchè poca, grossezza, ma pur maggiore delle altre membrane, ove dissi, non avendo del tutto perduto il suo vapore,
come

come nella parte interna, e per conseguenza non ancora alterata dall'aria, sente gagliardamente. E che maggiori prove si possono desiderare in conferma delle antedette ragioni?

Quel che sia sufficiente per ispiegare, e dimostrare, che le meningi, le membrane, il perioftio, ed il pericranio debbano essere sensibili nello stato naturale, insensibili nel caso delle sopracitate esperienze, già apparisce; se qualche dubbio potesse restare, sarebbe sopra i tendini, i legamenti più grossi, le ossa, e la poca sensibilità delle viscere. Vero si è, che per concludere di questa quello che s'è concluso delle prime, le antedette ragioni dovrebbero bastare, ma pure buona cosa farà, o l'indagarne delle altre, ovvero spiegar meglio le di già addotte. S'è detto per ispiegare l'insensibilità de' tendini nel caso dell'esperienza, che la sensazione, che prova l'animale per la lacerazione delle parti, che gli servono d'integumento, impedisce la sua particolare sensazione. S'è detto, che l'alterazione cagionatagli, e per la perdita del vapore, e per la pressione immediata dell'aria esterna, toglie ad essi il soggetto di sensibilità, che è lo spirito animale. S'è detto che lo spirito animale si diparte prima dagli estremi, che dalla parte media di qualunque parte del corpo, e che perciò essendo i tendini estremi del muscolo, possano questi divenir insensibili, restando il muscolo ancora sensibile. Per rendere quest'ultima ragione più chiara, riflettere si può, che quando l'animale è gagliardamente inteso ad una qualche sensazione, tutto lo spirito diffuso per il corpo procura ricorrere alla sua sede, e quelle parti dell'animale, che prima delle altre possono restar prive di questo spirito, restano in tal caso prive di senso. Questo s'osserva negli uomini, i quali improvvisamente colpiti da qualche annunzio, che a loro apporti o un troppo funesto, o un troppo giocondo successo, restano in un tempo ed immobili, e privi affatto di senso, di modo che, alcun segno non danno per qualunque irritazione, gli si faccia nel corpo; e s'avviene, che per rimettergli da un tale stato, gli si apran le vene, si scorge, e dal quasi nessun moto, e dalla qualità del sangue, essere in allora i fluidi non meno, che i solidi privi di spirito vitale: lo stesso in tal caso ci viene indicato dalla mancanza quasi totale del polso. Se dunque in caso d'una gagliardissima sensazione le parti tutte del corpo perdono il senso, perchè non si potrà dire, che in caso d'una, benchè minor, sensazione, gli estremi delle parti non possano restar privi di spirito; e in conseguenza anche di senso per lo concorso dello spirito alla sua sede in quantità maggiore di quello, che prima della sensazione vi era? qual meraviglia che in un cane, o in qualunque altro animale egli siasi, che ad altro non tende, che ad isfuggire da quelle mani, o da quei lacci, che afferrato lo tengono, lo spirito animale non ricorra alla sede, e che perciò gli estremi delle sue parti non restino privi e di spirito, e di senso? A me è accaduto d'osservare in un cane alla presenza di più astanti, che non solo non dava segni

di

di senso nell' irritargli il gran tendine, ma nè pure gli dava abbruciandogli la cute, i muscoli, e l' istesso nervo crurale o col fuoco, o con altri caustici. In tal caso farebbe ella stata conseguenza ragionevole il dire, che tutte queste parti in quel cane dovevano essere state prive di senso, anche quando in libertà si trovava, prima di fare tale speriencia, e quando queste parti erano nel loro stato naturale?

Altro non resta per quello riguarda i tendini, se non se, a rintracciar la ragione, per la quale non dieno gli animali segno di grave senso nel ritorno dello spirito a queste parti. Per conoscere questa ragione, basta il riflettere, che i tendini non ricevono lo spirito immediatamente dai nervi, ma dai nervi ai muscoli, dai muscoli a questi si trasfonde. S' osserva nella ricisione o di poche fibre d' un tendine, ovvero anche del tendine tutto, che le parti si contraono di modo, che vi resta non poco spazio tra l' una, e l' altra parte: Si toglie adunque la comunicazione non solo dello spirito, ma eziandio degli altri fluidi, tra le parti recise. Ora dovendosi diffondere lo spirito prima per quella parte del tendine, che resta annessa al muscolo, nell' arrivare che fa lo spirito al sito della recisione, trovandosi in libertà nello spazio, che resta tra l' una, e l' altra parte recisa, nè si può diffondere nella parte inferiore, quale perciò non può cagionar sensazione, nè può ritornarsene a portar la sensazione alla sede, mancandogli la direzione per i suoi propri sensi, perciò fermato nel detto spazio divien causa della cicatrice, che si trova poi ai due estremi delle parti recise: ma se avviene, che il tendine sia fornito di nervi particolari, come contro il volere d' alcuni succede di vedere ne' cadaveri umani, avendo il sopracitato Signor Vandelli due tendini umani preparati, ove all' occhio di chiunque i nervi si rendono visibili, se avviene, disse, questo, dovrà il tendine aver senso non men, che il muscolo; non essendovi più il caso di poterlo considerare come estremo di parte, ma come parte stessa, ed in tal caso l' alterazion sua può cagionare una tal sensazione, che produca dei gravissimi effetti. Da questo però non si può arguire, che sempre debba lo stesso succedere, e che alle volte non possano produrre una grave sensazione anche quei tendini, che sono privi di nervi particolari: poichè se accade, che l' umor, che cola insieme collo spirito dalla parte recisa, sia di cattiva crasi, questo può impedire, e le cicatrici, e variare l' altra parte intiera del tendine, per la quale seguentemente lo spirito si diffonde, e così cagionare una alterazione, che produca quei gravi effetti, ai quali pur troppo la misera umanità alle volte soggiace, e che qui non fa d' uopo rammemorare, per essere di già a chiunque noti. Quello che si dice de' tendini, deveasi ancora dire de' legamenti, e di qualunque altra parte che cada sotto tal classe.

Delle ossa non trovo registrata alcuna esperienza, ma solo trovo, che a queste si nega il senso. Se si volesse dedurre, che le os-

sa sieno prive di sensibilità, perchè nel caso della separazione di qualche parte di queste il paziente non senta, dico, non esser questo un argomento sufficiente, per cavare una tal conseguenza: imperciocchè in tal caso, conviene in prima considerare, che l'osso il quale si deve recidere, ha da essere spogliato di tutti gl' integumenti, per la qual cosa i fluidi, che in esso si trovano, devono patire una grande alterazione dal loro stato naturale, cagionata loro, o dalla ristagnazione, e congelazione degli umori, per la perdita del calore, che devono soffrire, in passando in un ambiente diverso dal suo naturale, o dall'esser loro tagliate le vie, per le quali esse ricevevano lo spirito, e perciò in mancanza di queste non potere trasmettere alla sede quella sensazione, che produrrebbe lo spirito, che nell'osso si trova, avendo continuità: indi considerer si deve, che quel maligno umore, che ha cagionata l'infermità in una data parte dell'osso, può essere diffuso anche nel resto tutto dell'osso, ed averlo alterato in modo, che non sia più capace di senso, se da quell'umor maligno, che ha preso strada per la parte affetta, non si purghi. Che ne nasca la ristagnazione, e congelazione degli umori più sottili quando le ossa subentrano in un ambiente nuovo, ci viene indicato dall'esperienza di quel sottilissimo umore, che trasfuda, levata la cuticola, da qualunque parte del corpo, quale essendo nell'atto della trasfudazione fluidissimo, appena esposto all'aria quale per esso diventa ambiente nuovo, si congela, e si fissa a consistenza d'una asciutissima gomma. Lo stesso s'osserva in quell'umor sottilissimo, e fluidissimo, che trasfuda dalla cima di quei tubercoletti, che sogliono apparire sulla faccia, ed in altre parti del corpo; lo stesso pure in molte malattie della testa, che sogliono accadere a più teneri fanciulli. Se dunque questo succede in umori sottilissimi, quando sono esposti ad ambiente diverso dal loro naturale, perchè non può succedere lo stesso ne' fluidi delle ossa, che sono appunto sottilissimi, quando esposti vengono con l'osso stesso ad ambiente diverso? perchè non può produrre lo stesso, la mortificazione della parte cagionata dalla malattia?

Che possano esser tagliate le vie, per le quali lo spirito dell'osso avea comunicazione, ed accesso alla sede, ce lo indica la recisione, di tutte le parti annesse all'osso stesso, che prima di venire alla separazione, s'istituisce.

Che il maligno umore, che cagiona il morbo in una data parte dell'osso, possa alterare ancora le altre parti vicine, ed ancora l'osso tutto, di modo, che possa divenire insensibile, ce lo indicano quelle flussioni, per le quali alle volte succede, che alcune parti delle più sensibili, restano affatto prive di senso. Quello dunque, che in molte altre parti succede, perchè succedere non può nelle ossa ancora, essendo il soggetto della sensibilità lo stesso da per tutto? Questo s'è detto per addurre qualche ragione, oltre le già addotte, per la quale le ossa alle volte possano restar prive di senso,

non per mancanza di ragioni, e prove che le ossa in istato naturale, non sieno anche esse dotate d' un senso particolare, imperciocchè qual maggior dolore può provare un uomo, che quello d' un dente che s' incominci a parlare? e pure sembrerebbe, che se l' uomo abbisognasse di qualche parte insensibile, per il gagliardo uso, che ei ne deve fare, fosse appunto questa. Quel prurito, e formicolamento, che sentono quelli, che soggiacquero a qualche frattura d' ossa, quando la frattura stà per riunirsi, non ci indica forte, essere questa una sensazione particolare delle ossa? Molte malattie delle ossa, per le quali gl' infermi soffrono un tormento indicibile, non ci indicano forse lo stesso? troppo lungo farei, se più volessi estendermi sopra questo: perciò passo a riflettere qualche poco sopra le viscere.

Se dalla poca sensibilità delle viscere si volesse arguire esservi in queste delle parti insensibili, basta il considerare la struttura di queste, per conoscere l' insufficienza d' un tale argomento. La struttura delle viscere ci viene indicata dal loro officio, qual è di separare dal sangue, che ad esse in quantità assai maggiore, che alle altre parti proviene, un fluido di diversa natura del sangue stesso, il quale o come escremento debba per i condotti apprestatigli dalla natura scaricarsi, ovvero per altri condotti si distribuisca, per servire all' economia animale. Questa separazione, o ella si faccia per minimi vasi, o per glandolette, o per cribrazione, certo si è che ella indica una tale struttura delle viscere, che le parti solide di esse sieno, e d' una grande tenuità, e che tra esse vi sieno de' continui interstizj ripieni o di quel fluido, dal quale si deve fare la separazione, o di quello, che è di già separato. Posto questo, dipendendo il senso di qualunque parte dalla variazione dello stato nel quale era prima, viene per necessaria conseguenza, che queste debbano esser suscettibili di poca sensibilità, e lo dimostro. La variazione si deve fare, o per l' estensione della lunghezza, o per l' estensione della larghezza, o per la profondità di queste parti. Se irritando un viscere vogliamo dire, che la variazione succeda per la lunghezza, questa variazione non può estendersi, che in una brevissima distanza dai punti, dove termina l' irritazione, venendo questa impedita dalla resistenza de' fluidi, de' quali il viscere è in ogni parte ripieno, ed in modo tale, che la massa fluida supera di gran lunga la solida. Se vogliamo, che succeda per la larghezza, la variazione, ancor qui non può estendersi, che poco lunghi dai punti, dove termina l' irritazione, o per la disunzione delle fibre, se vogliamo considerare i visceri come cribri, o per il continuo intersecamento o de' minimi vasi, o delle vescicole, quali per non aver continuazione con quelli, che s' irritano, non possono nè esser cagione, che le fibre de' primi, soggiacciono a maggior variazione di quella, che la minima loro larghezza può essere suscettibile, nè esser riceverne, che quella, che la compressione de' primi può lor cagionare.

re, qual certo deve essere minima per l'impedimento del fluido, che scorrendo per essi fa loro resistenza. Resta, che la variazione si faccia per la profondità, qual pure non può essere, che proporzionata alla tenuità delle parti, delle quali son formati, e in conseguenza, minima: se dunque i visceri non sono suscettibili, che di poca variazione, non è maraviglia, che questi abbiano poca sensibilità, nè perciò si può dire, che ne' visceri vi sieno delle parti insensibili. Quello si dice de' visceri si deve ancora dire delle glandole, e di qualunque altra parte, la cui struttura, a quella de' visceri possa assomigliarsi.

Per quello si aspetta alla sensibilità, questo basti: ora passiamo all'irritabilità.

Per dar a divedere che cosa importi il termine *irritabilità* applicato alle parti del corpo umano, viene spiegato ciò, che per parte *irritabile* si debba intendere, dicendo, *che quella nell' uman corpo sia parte irritabile, la quale toccata da qualche corpo straniero alquanto gagliardamente diviene più corta*. E da una tale spiegazione, e da quello, che gli autori di questa, procurano dedurre dalle loro sperienze, l'accorciamento della parte, vogliono, che ei provenga da una forza insita nelle fibre di essa, quale dal contatto del corpo esterno venga eccitata ad agire; e questa forza è quella, che chiamano *irritabilità*.

Compresa in questa maniera la significazione del termine *irritabilità*, io cerco dagli autori di questa, se nelle parti, che essi dicono irritabili, dopo irritate, ed accorciate, ritornino le loro fibre nello stato di prima per forza dell'irritabilità, ovvero se restino sempre accorciate, fin a tanto, che da qualche forza a loro esterna vengano rimesse. Che ritornino nello stato di prima per forza dell'irritabilità, la spiegazione, che essi danno del termine, non lo permette, poichè in tal caso dovrebbe produrre allungamento, e non accorciamento come essi vogliono. Che restino accorciate, fin a tanto, che da qualche forza a loro esterna vergono rimesse nello stato di prima, questo è contro il fatto, poichè in queste parti dopo aver loro cagionata l'irritazione col tatto, o altra causa esterna, s'osserva per qualche tempo un successivo accorciamento, ed allungamento, senza apporvi alcuna causa esterna, che ve lo ecciti: dunque se l'irritabilità non può produrre questo allungamento, e se questo si ha senza una causa esterna, converrà per necessità dire, che in queste stesse fibre vi sia un'altra forza insita, che successivamente all'accorciamento produca l'allungamento: ma siccome queste sarebbero due forze tra loro del tutto contrarie, così non vedo come nell'istesso soggetto si possano concepire: imperciocchè o queste saranno due forze uguali, o l'una sarà dell'altra maggiore. Se come uguale vogliamo considerarle, in tal caso, non si potrà avere nè accorciamento, resistendo a questo la forza, che agisce per l'allungamento; nè allungamento, resistendo a questo la forza, che agisce

per l'accorciamento: dunque queste forze dovranno stare sempre in perfetto equilibrio, il che è contro il fatto. Se l'una dobbiam considerarla maggiore dell'altra, la maggiore sempre prevalerà, nè lascerà agire mai la minore, il che pure è contro il fatto: adunque mi sembra potersi dedurre per legittima conseguenza, che questa forza d'irritabilità, secondo la spiegazione, che essi ne danno, non sia, che un ente immaginario, e una forza contraria alle leggi della natura.

Se non fosse cosa certa, che quelli, che s'anno ideato una tal forza, non l'avessero fatto per la molteplicità, e costanza di esperienze, mediante le quali essi anno osservato, che le parti da loro dichiarate per irritabili si contraevano, all'incontro le altre non davano sotto il tatto alcuno, o almen minimo segno di contrazione, per il che con fine di giovare al pubblico, si sono serviti della detta forza, per ispiegare un tal fenomeno, se questa dissi non fosse cosa certa, sospettare si potrebbe, che taluno per desiderio di singolarizzarsi col merito di qualche nuovo ritrovato, s'avesse ideato una tale forza, sopra la quale poi lavorare un qualche nuovo sistema in medicina, vedendo che gli altri sono ormai di troppo invecchiati, e comuni, perchè al delicato gusto de' moderni filosofi riuscir possano piacevoli, e grati. Se con attenzione però risletter si voglia alla struttura delle parti, chiara apparirà la ragione dell'accorciamento, che in esse necessariamente succeder deve, o toccandole, o altramente irritandole, senza ricorrere, per ispiegare il fenomeno, ad alcuna forza ignota, o contraria alle leggi della natura.

Dalla notomia abbiamo, che tutte le parti del corpo umano, non sieno, che un composto di fibrille, altre delle quali disposte sono secondo la direzione longitudinale d'esse parti, ed altre trasversalmente, e che di queste in maggior quantità ve ne sieno, delle prime, che delle seconde: abbiamo che da queste fibrille vengono continuamente formati de' piccioli seni, per i quali vi scorrono quei fluidi, che altri servono a nutrirle, ed altri a tenerle morbide, e flessibili, vale a dire, ad impedire, che i minimi corpiccioli, che le formano, non entrino in contatto maggiore, di quello richiede l'ufficio al quale son destinate le parti, che esse costituiscono: abbiamo, che questi seni s'estendono più per la lunghezza delle parti, che trasversalmente, e che anno maggiore capacità nel loro mezzo, che negli estremi: abbiamo pure, che le fibre, separatamente dai fluidi ancora, sono elastiche, il che ci viene concesso dagli autori stessi dell'irritabilità, ove pretendono dimostrare la differenza, che che passa tra questa, e l'elasticità. Poste queste nozioni, facile si è l'idearsi una macchina, per la quale cada più facilmente sotto il senso ciò che per la struttura delle parti del corpo umano, in esse necessariamente succeder debba, quando sopra queste si facciano i tentativi dell'irritabilità.

S'abbia dunque una macchina composta da una serie di varie
ves-

vesciche di figura ellittica ripiene di un qualche fluido, e disposte in modo, che gli assi di loro formino una linea sola, retta, o curva ella siasi. Si comprima una di queste vesciche, da una qualche forza esterna in due lati opposti v. g. anteriore, e posteriore: da una tale compressione succede, che il fluido, che era nelle parti de' lati anteriore, e posteriore che restan compresse, passa ne' lati destro, e sinistro, i quali per acquistare capacità maggiore si rendono più arcuati, e la figura ellittica, che prima descrivevano, accostandosi maggiormente alla figura circolare, fa, che l'asse della vescica necessariamente s'accorci, e in conseguenza la linea ancora, che dalla continuità degli assi viene formata altrettanto s'accorcia; dal che ne segue, che se più d'una vescica venga compressa, l'accorciamento della linea formata dagli assi tanto più sarà maggiore. Questo accade, se le vesciche costituenti la macchina non abbiano comunicazione l'una con l'altra. Ora a queste vesciche si dia comunicazione, e di nuovo nel modo di sopra detto, venga compressa una di queste: da questa compressione succede, che parte di quel fluido, che era nelle parti de' lati, che restan compresse, passa ne' lati destro, e sinistro, e quindi nella maniera, che sopra s'è detto, s'accorcia l'asse della vescica compressa, e parte del fluido passa pel luogo di comunicazione nelle altre vesciche; dal che poi ne nasce, che queste per acquistare capacità maggiore, dalla figura ellittica, vanno accostandosi alla sferica, e quanto più alla sfera s'accostano, tanto maggiormente gli assi loro s'accorciano, e in conseguenza anche la linea, che dagli assi viene formata; se poi senza comprimere in alcuna di queste vesciche, si voglia introdurre forzatamente maggior quantità di fluido, ovvero in quello, che esse contengono, si ecciti una qualche fermentazione, per la quale il fluido contenuto occupi maggiore spazio, lo stesso succede, non potendo le vesciche acquistare capacità maggiore, se non se, accostandosi maggiormente dalla figura ellittica alla sferica. Ora l'accorciamento, che succede in questa macchina è egli forse qualche cosa di nuovo, qualche cosa di straordinario in natura? v'è d'uopo forse, per ispiegare un tal fenomeno, di ricorrere ad una qualche forza non per anche scoperta da tutti i meccanici? Ma se tutte le parti del corpo umano non sono appunto, che un' amassò di piccole macchinette affatto simili a questa, e se facendo gl' istessi tentativi sopra quelle, che sopra questa, succedono i medesimi effetti, perchè dovremo noi servirci di principj non solo diversi, ma eziandio assurdi per ispiegare effetti simili, dipendenti da cause simili, in una macchina simile?

Nella descritta macchina non solamente s'osserva l'accorciamento, che nasce, o dalla pressione, o dalla schizzatura, o dalla fermentazione, ma s'osserva ancora, che togliendo, o la pressione, o il fluido schizzetato, o scemandosi la fermentazione, nasce nel fluido delle vesciche una specie d'oscillazione, per la quale vi succedono de'

de' reciprochi accorciamenti, ed allungamenti, fin a tanto, che il fluido torna in perfetta quiete. Di questo pure ogn' uno, che sia appena informato delle leggi meccaniche, ed idrostatiche, ne fa rendere la ragione. S' osserva ancora, che secondo le varie posizioni, o stati della macchina, vi vogliono ora più, ora meno gradi di forza comprimente per ottenere un uguale accorciamento. Da tali osservazioni chiare appariscono non solo le ragioni, per le quali dopo compressa, o altramente irritata una qualche parte, ne succeda quella specie d' oscillazione nelle fibre, e quindi un reciproco accorciamento, ed allungamento, ma eziandio le ragioni appariscono, per le quali in alcune parti, quantunque con maggior forza irritate, succeda l' accorciamento assai minore, che in certe altre, le quali ad ogni minima irritazione grandemente s' accorciano.

Dopo queste riflessioni, ed osservazioni, da che altro mai ripetere si può l' accorciamento, che segue toccando, o altramente irritando una qualche parte, se non se, da un moto impresso ne' fluidi contenuti, per cui passando questi da un sito in altro, cagionano variazione di figura, e quindi per la struttura della parte un necessario accorciamento. Che la cosa infatti sia così, ce lo dimostra il vedere, che o congelatisi i fluidi in una parte, o questi in altra maniera tolti, l' accorciamento non si rende più sensibile, per qualunque irritazione gli si faccia: ma se così è, e se la forza, che cagiona un tale moto dobbiamo chiamarla irritabilità, qual sarà il soggetto, al quale in istato naturale debba appoggiarsi una tal forza nell' uomo, e negli altri animali viventi? quello per certo sarà, che in essi è principio di moto: ma se principio di moto è lo spirito animale, questo sarà il soggetto irritante, e da esso dipenderà la forza d' irritabilità; che se dallo spirito animale dipende anche la sensibilità, essendo questo il soggetto sensibile, come sopra s' è dimostrato, la sensibilità, e l' irritabilità non potranno essere tra esse realmente distinte. Nè giova qui l' opporre, che s' abbia l' accorciamento anche dopo morto l' animale, e restato privo di senso, e che vi sieno delle parti, anche in istato naturale, le quali irritate non s' accorcino; imperciocchè dopo morto l' animale, l' accorciamento non s' ha senza una qualche causa esterna, ed in allora la forza irritante, è di quello che irrita, essendo il principio di moto esterno, e perciò non si può più dire, che quella parte abbia in se stessa irritabilità. Che poi vi sieno delle parti, le quali anche in istato naturale irritate, e compresse non s' accorcino, questo resta a provarsi da chi facesse una tale opposizione: che se pretendessero arguire una tal cosa, dall' aver osservato, che i nervi, l' epidermide, la pelle, le membrane, le arterie, e le vene, la tessitura cellulare i visceri, ed i condotti escretorj per una irritazione, anche gagliarda non s' accorcino, dirò, da questa osservazione non potersi cavare un tale argomento: e la ragione si è, perchè la particolare struttura, e posizione di queste parti non permette, che, abbenché

in fatti vi succeda l' accorciamento, si possa questo rendere all' occhio sensibile. Per conoscerne di ciò la verità, basta il riflettere, che tanto i nervi, quanto le arterie, e le vene, ed i condotti escrettori, e le membrane ancora anno le loro fibre continuate secondo una retta direzione dal principio al fine, e queste in ogni luogo della medesima indole, e qualità; di più riflettere bisogna, che tanto nel loro principio, che nel loro fine mettono capo in parti suscettibili di grande accorciamento ad ogni minima irritazione: se dunque nell' atto, che queste parti vengono irritate, accorciar si debbono, necessariamente ne' loro estremi stirar debbono ancora le parti alle quali sono annessi, quali, da tale stiramento irritate, s' accorciano, e quindi stirano poi esse le prime, non lasciando discernere quel picciolo accorciamento, che dall' irritazione fatta in quelle, deve necessariamente succedere; dico picciolo accorciamento, poichè quantunque la forza irritante sia grande, dovendosi questa estendere per tutto l' asse della parte irritata, essendo l' asse in tali parti assai lungo, quanto più s' estende, tanto più la forza si diminuisce: ne' condotti escrettori però, i quali sono assai più brevi, se loro si faccia una gagliarda irritazione, apparisce sensibile l' accorciamento. Per quello s' aspetta all' epidermide, alla tessitura cellulare, ed ai visceri, basta riflettere alla struttura loro, ed all' intersecamento delle loro fibre, ed alla quantità di fluidi, che in essi raccolgono, per conoscere chiaramente, non poter essere sensibile il loro accorciamento, come s' è dimostrato al caso di far conoscere la poca sensibilità, che queste parti debbono avere.

Ecco o Amico quanto io esporvi dovea, perchè conoscesti, qual sia il mio sentimento circa la sensibilità, ed irritabilità, delle parti del corpo umano, e circa ciò, che sopra queste è stato scritto, e si va forse ancora scrivendo. Da detti miei rileverete, che io non ho difficoltà, nè dubbio veruno sopra la verità delle esperienze, che vengono proposte al pubblico esame dagli autori dell' insensibilità, ed irritabilità: ma le difficoltà, e i dubbj miei cadono sopra le conseguenze, che da queste dedurre si pretendono, conciossiachè da fatti particolari, non credo si possano dedurre conseguenze universali. Non credeste però, che ammettendo queste esperienze vere, io considerassi quelle, che mostrano il contrario per false, (essendone state proposte al pubblico anche di tali) ma ugual fede, e credenza presto e all' une, e all' altre, persuaso dall' esperienza stessa, che la diversità, che tra queste, e quelle s' osserva, non dipenda che dal modo, e dalla celerità di tentare le parti, procurando farlo pria, che sieno del tutto fuori di stato naturale. Non mi sono esteso a provare la validità delle ragioni da me apportate contro l' insensibilità, ed irritabilità, perchè nè in una lettera si potea farlo, nè il tempo me l' avrebbe permesso.

Da quanto agevolmente raccoglierete, da questa mia lettera, e molto più da quello, che da altri in favor della sensibilità, è stato con

con sommo discernimento, ed applauso scritto, avrete bastevoli dati, per potere sopra ciò formare un retto giudizio; credo però, che voi pure non vorrete perdere il tempo ad esaminare più oltre tale materia, e che questa impresa la lasciarete a quelli, i quali anche nelle scienze al pari delle femmine ne' vestiti, e negli abbigliamenti, seguono, come moda ogni stravagante idea: che se abbadar si volesse a tutte le novità, che mettono alla luce quelli, che vogliono sforzare la natura ad ubbidire à loro sistemi, d' uopo sarebbe impiegarvi l' età di più d' un uomo solo in iscoprire continue falsità, pria d' arrivar a conoscere alcuna verità. Iddio però volesse, che l' arte nostra libera fosse da tali pregiudizi, che così, e più utile all' uman genere, e più decorosa per chi l' esercita riuscirebbe.

Se all' aspettazion vostra la risposta mia non corrisponde, l' insufficienza mia ne incolperete.

Aggradite la mia sincerità, e conservatemi il vostro amore. State sano.

Padova li 15. Ottobre 1756.

Vostro sincero Amico
Giuseppe Bertossi.

Celui

Celui, qui à envoyé cette lettre à l'Auteur du recueil de la célèbre question Hallerienne, lui à temoigné qu' il auroit à gré qu' elle se imprimât en le langage même, qu' elle a été écrite.

L É T T R E A MONSIEUR BIANCHI

Primier Medecin du Roy de Sardaigne, Membre des principales Academies de l' Europe &c.

P A R
MONSIEUR LE CAT

Docteur en Medecine, Chirurgien en Chef de l' Hotel-Dieu de Rouen, Professeur demostateur Royal en Anatomie, et Chirurgie, des Academies Royales de Paris, Londres, Madrid, Berlin, des Academies Imperiales des curieux de la nature, et de Petersbourg, Secretaire perpetuel de celle de Rouen.

M O N S I E U R.

P Ermettez moi de regarder les choses trop avantageuses, que Vous me dites de mon memoire sur la *sensibilité, et irritabilité &c.* plutot comme un encouragement, que comme un éloge meritè. Vous demandè un supplemant a ce memoire, et Vous en êtes tres-presè. Vos exhortations, Monsieur, sont des ordres pour moi; mais le torrent des affaires ou je me trouve, et la precipitation de vos ordres, rendront ce supplemant plus court, qu' il ne l' auroit été dans d' autres circonstances.

1. Vous trouverez, Monsieur, dans le premier volume de la collection in 4. des dissertations Medico-Chirurgicales, mises en ordre par M. Haller memè, l' observation d' un champignon sur la dure mere qui causoit les plus violents maux de tete; les quels ont été gueris par l' extirpation de cette tumeur. *Dissert. IX. pag. 169.*

2. M. Morand dans la lecture qu' il fit a le sceance publique de l' Academie de Chirurgie le 21. Avril 1757. de l' observation d' une carie penetrante dans l' interieur du crane, remarque, qu' en faisant dans cet interieur des jnicctions vulnèraires où entroit le baume de Fioravanti; la malade en ressentoit les douleurs les plus vives, elles furent suivies, ajoute-t-il, d' une espee de fureur, qui dura
Suppl. Part. II. Q quel.

quelque tems. L'irritation des parties exterieures, dit l'auteur de l'extrait, ne peuvent causer vn effet aussi violent: M. Morand imagine qu'un peu d'injection pouvoit s'être communiquée a quelque partie membranuse de l'interieur de la tete, et la sonde verifia cette conjecture elle entra d'un ponce dans cette interieur. Les parties molles exterieures étant enlevees, il parvint a mettre dans les issiues vne canule, qui penetroit jutque dans le cerveau, et ce qu'il y a d'admirable, dit M. Morand, c'est, que le Malade se portoit bien d'ailleurs, qu'il suivoit une partie des exercices de la maison (c'etoit un Religieux); plusieurs personnes, qui ne vouloient pas croire, ce que je leur en disois revenoient de son Monastere fort etonnés de ce qu'ayant demandé à voir le Religieux, qui portoit une canule dans le cerveau, on estoit obligé de le chercher dans la Maisón, il monroit la playe, on otoi la canule pour satisfaire leur curiosité, et on la remettoit. M. Morand, ajoute l'auteur de l'extrait, tires de phenomenes de ce fait de pratique des preuves, qui confirment les idees qu'on a de l'insensibilité du cerveau, et de la sensibilité des meninges.

3. M. de Salerne Chirurgien a Bonnebosq en Auge, rapporte dans le journal de Medecine de Novembre 1757 l'observation suivante. „ Au mois de Juin de l'anné 1753, je fus appelé dit-il „ chez vn huissier a Bonnebosq pour y voir son fils agé de 8 ans. „ Cet enfant avoit reçu vn coup de pied de cheval a la partie droite, et superieure de l'occipital: le fer qui avoit porté le coup, avoit pénétré jusqu'a le dure mere. J'aperçus sur le crane un trou presque rond, a travers du quel je passai mon petit doigt; le meninges estoient a decouvert, et je distinguai tres bien le mouvement de sistole, et de diastole des arteres. Le Malade étoit sans fievre, sans assoupissement, sans envies de vomir sans hemorrhagie, et je lui trouvai le jugement sain, et l'esprit tranquille.

„ Je Commençai par razer la partie, je lavai la playe avec du vin chaud, je tirai quelques petites esquilles, qui faisoient des irritations tres-vives sur les membranes du cerveau &c.

4. Extrait d'une lettre, qui m'a été écrite de Doccum en Frise (hollande) par M. Snip. vn de mes eleves, et docteur en medecine, le 5 Avril 1757.

„ Un jeune homme de 21 an, tomba sur la tete; il survint vne apoplexie complete; l'on me demanda l'huitieme jour avec M. Ouvrens Professeur a franker en Frise. Il estoit pendant ce tems là sans parler, sans manger, sans boire &c. Il avoit un ecoulement involontaire des urines, et il survint quelque fois des convulsions. J'examinai la tete, je trouvai vn gonflement considerable sur l'os parietal gauche, causé par un amas de sang entre le crane, et le pericrane. Je fis a l'instant vne incision cruciale. Je trouvai le pericrane déchiré, mais point de fente, ni de fracture au Crane. Les symptomes subsistant le lendemain, je me determinai a l'operation du Trepan, et je trouvai sur la dure

„ mere

„ mere vn petit amas de sang extravasé. Les symptomes diminuerent peu a près jusqu' au quatrieme jour, il sortit alors vne assez bonne quantité de matiere purulente par l' ouverture, et le malade commenca a se porter beaucoup mieux jusqu' au septieme jour, qu' il survint des convulsions horribles du coté gauche du corps, elles diminuerent apres vne saignée, et un lavement; mais le huitieme jour, les convulsions recommencerent, et durerent jusqu' au 14. Dans cet intervalle nous prescrivimes des saignées, des lavements, des vessicatoires, le tout sans succès. Enfin ayant decouvert au rebord inferieur de l' ouverture du trepan vne petit eminence, nous l' enlevames avec le couteau lenticulaire: apres cette operation les convulsions cesserent, et le malade va tres-bien: c' est aujourd'hui le vingtieme jour apres l' operation.

Il est assez clair, Monsieur, que cette eminence tranchante ou piquante du rebord inferieur de l' ouerture du trepan ne produisoit ces convulsions, que par l' irritation, qu' elle causoit a la dure mere, ainsi, Monsieur, voilà des effets de l' irritation de cette membrane tels que M. Haller en exige pour etre convaincu: Il ne lui reste donc plus rien a desirer sur cette matiere.

5. Quoique j' ai peu de confiance, Monsieur, aux etats agitez ou tranquilles des animaux soumis aux experiences pour dessigner la douleur, ou l' insensibilité des parties sur les quelles on opere, cependant je n' ai pas laissé d' en faire comme les autres, & d' y trouver des preuves qui sont bonnes, au moins contre ceux, qui ont foy à ces signes.

Le 16. Juin 1755. Un chien sur la dure mere du quel on appliqua l' huile de Vitriol, fit les plus violent efforts pour s' eschapper, et des hurlement epouvantables.

Dans le même mois vn autre chien fu trepané; on lui piqua la dure mere le plus legerment, et le plus horizontalement qu' il fut possible pour ne pas toucher la pia mere; l' animal fit de grands mouvemens pendant ces piqueures. On ouvrit la dure mere delicatement avec la lancette, il fit des cris. La pie mere etant ainsi decouverte, on y porta fort legerment la pointe de la lancette, le chien donna encore des signes de douleurs par ses mouvemens; enfin apres avoir ouvert cette membrane, on plongea la lancette fort avant dans la substance du cerveau, par devant, par deriere, sur les cotés; l' animal resta immobile pendant toutes ces operations. J' en ai un grand nombre d' autres, qui reviennent au meme, et que pour cette raison je ne le rapporterai pas.

6. „ Extrait d' une lettre de M. Salomon ci-devant Chirurgien de Son Eminence Monseig. le Cardinal de Tavannes, et actuellement maitre chirurgien a Neufchatel: du 28 Novembre 1757.

„ Je me trouvai a Gailletontaine le 27 Settembre 1757 chez M. Gout Chirurgien du dit lieu, on lui amena le nommé Antoine le Tesse agé de 18 ans domestique de Madame l' Epine de la Paroisse de Condeville pres Neufchatel: Il estoit tombé de l' hauteur

teur de sept pieds, la tête avoit porté per la partie postérieure sur le bord tranchant d' une pierre, qui lui avoit coupé les tegumens. La partie moyenne et supérieure de l' occipital étoit toute a decouvert, & une grande portion des deux parietaux, ce qui formoit vn lambeau considérable: Il y avoit vne grande portion du pericrane, qui étoit totalement séparée du cuir chevelu, et des os. J' ai profité de cette occasion pour m' assurer de sa sensibilité, & j' ai pris le lambeau du pericrane avec mes deux doigts, je les lui soulevai, & avec la pointe des ciseaux, je lui les piquai, le malade a fait des cris horribles a chaque piqueure; j' ai repeté cela dix au douze fois, le malade a toujours fait des cris, en me disant que je le faisois beaucoup souffrir. J' emportai une portion du pericrane detaché, ce qui fait encore de vives douleurs au malade. Apres vne telle experience, ajoute l' Auteur, M. Haller ne me persuadera jamais, que le pericrane est insensible.

7. Extrait d' une autre lettre du meme M. Salomon, le 12 Novembre 1757, le nommé Francois Talieu garçon meunier âgé de 50 ans demeurant a la Paroisse de Lucy, conduisoit un mulet chargé de plusieurs sacs de farine: Il monta par dessus ces sacs, le mulet fit des caprioles, et fit tomber Talieu, la tête premiere sur un monceau de pierres, qui lui firent plusieurs playes a la partie antérieure du parietal droit. Il employa beaucoup de remèdes empyriques. Le sixieme jour il survint de la douleur, de la fièvre, de l' insomnie, avec un gonflement considerable de toute la tête. Je fus appelé le huitieme jour, je trouvai le pericrane separé de l' os en certain endroits, un lambeau de la grandeur d' un ponce et demi étoit separé, et de l' os, et des tegumens: Je piquai cette portion vne vingtieme fois avec la pointe de mon bistouri; Il fit des cris, des douleurs a chaque piqueure. Je calmai les accidents par le debridement, la saignée, et le regime; ensuite je repetai notre experience de la piqueure, qui continua a nous donner des preuves d' une grande sensibilité dans le pericrane.

J' aurois, Monsieur, pû rassembler depuis vn an vn plus grand nombre de ces observations dans ma seule pratique, mais en verité je regarde maintenant cette sensibilité comme une verité si bien établie, qui je me fais un scrupule de tourmenter d' or en avant mes malades par ces essais douloureux. J' e ne recueillerai donc gueres d' or en avant que ceux, que le hazard, ou la necessite de toucher a ces organes delicats pourront m' offrir. Je serois charmé, que mon attention a les recueillir me meritâ la bienveillance d' vn homme, tel que vous êtes, et celle de la celebre academie aupres de la quelle Votre recommandation fait mon principal merite.

J' ai l' honneur d' estre avec la plus haute estime, et beacoup de respect
MONSIEUR

A Rouen ce 8 Juin 1758.

Vostre très humble, et très obéissant serviteur
Le Cat. LET-

JO. BAPT. BIANCHI
CLAUDIO NICOLA LE CAT

Medicinæ, & Chirurgiæ Professori Celeberrimo

SAL.

A Ccepi novissimam Epistolam tuam, quæ novis iisdemque ineluctabilibus cum tuis, tum aliorum spectatissimorum hominum, ipsiusque in primis adversarii experimentis, & testimoniiis, membranaceam, tendineamque hominis partem, sensibilem esse ita demonstrat, atque decidit, ut jure, meritoque fatearis, te contra conscientiam acturum, si ad alia pericula infirmos adhuc tuos cruciaries. Satis a nobis observatum, satisque superque chartis mandatum est: nunc manum de tabula. Utinam reliqua, quæ nobis hæcenus obscura sunt, similem lucem fortiantur. Novis quoque, & omnino tuis, atque invictissimis rationibus recentiorum irritabilitatem in mortuorum animalium partibus, prima tua Epistola ingeniosissime refelleras. Glissonius, qui primus, ni fallor, irritabilitatis nomen in animales fibras traduxit, anno 1676. de ventriculo, & intestinis tractatum edidit, huic disquisitionem de irritabilitate adjecit, tradiditque hanc animalium fibrarum irritabilitatem non disjungi a perceptione, atque appetitu quodam, quod idem est ac animale fibram revera sentire, seu sensitivam esse. Si igitur fibrarum irritabilitas non datur nisi cum in animali vita est, ut sine animalis vita, neque perceptio, neque appetitus esse potest: cur propterea admittere posset Glissonius cum aliis irritabilitatis fibrarum patronis, vel in mortui animalis corde, aliisve musculis, aut etiam membranis irritabilitatem superesse si aliquis supersit motus? An non sententia tua, Vir Præstantissime, Glissonianæ accedit, ut pateat non nisi in viventi animali irritabilem fibram esse, cum dixeris vocabulum irritabilitatis significare proprietatem corporis, quod irascitur, si irritetur? Sed Glissoniana opinio Doctissimis Auctoribus Bibliothecæ Anatomicæ tam inanis visa fuit, ut cum tractatum Glissonii de ventriculo, & intestinis Bibliothecæ adficere vellent, neque tamen quidquam ob Auctoris honorem ab hoc expungere, caput quidem de irritabilitate reliquerunt intactum, ast ad hujus calcem hanc notulam prudenter adjicere idest folio mihi 84. tom. 1. „Hæc omnia ut & quæ in proxime subsequenti capite, Scholam magis sapiunt, quam solidam motuum corporis ejusque fibrarum doctrinam, de qua vide tractatus de motu musculari suo loco insertos., An vero hypotesim irritabilitatis in sola

sola animali musculosa fibra confirmarunt præclarissimi hujusce ætatis Scriptores, quorum alii animale irritabilitatem non in musculosa fibra, sed in vasculosa duntaxat posuere: alii solum in nerva; alique in aliis distinctis partibus? an non potius luce clarius est irritabilitatem non minus, quam sensibilitatem in animalibus omnibus fibris plus minus esse, & cum vita animalis deleri? An non si qui aliquis motus in musculis, aut membranis ab animali extractis supersit, seu donec calor aliquis, & vitalis spiritus in parte vigeat, aut vitalibus reliquiis tribuendus, aut elasticus censendus? Hanc porro vindicatam veritatem tibi certe præ aliis Physica, ac Medicina debent. Vale Vir Celeberime, meque Tui amatorem observantissimum esse pro certo habeas; iterum Vale.

Augustæ Taurinorum Kal. Julii 1758.

TOMMASO LAGHI

Lettor Pubblico di Anatomia, e di Medicina nell'Università di Bologna, ed Accademico Pensionario Benedettino nell' Istituto delle Scienze, e dell' Arti.

IL CONTE GREGORIO CASALI.

Comechè io v' abbia detto da qualche tempo, o Amico carissimo, che, mentre io già lessi la famosa Dissertazione del Signor Hallero sopra la irritabilità, e la sensibilità, mi si offerlero all' animo due tenuissime riflessioni, e di queste mi abbiate voi gentilmente chiesto parecchie volte, tutta via non mi sono mai indotto a comunicarvele principalmente per due ragioni. La prima è, che io lessi quest' Opera nella traduzione francese del Signor Tissot, e non nell' originale latino. Io so che la traduzione è celebre, ma avrei desiderato di vederne ancora l' originale. E' poi la seconda ragione il sembrarmi veracemente, siccome le ho dette sopra, tenuissime le mie riflessioni. Aggiungete appresso, che questo è per me voler entrare in una Provincia, quantunque, non solo io non conosca il cammino, che ad essa conduce, ma io non vaglia nemeno a trovare dal mio oscurissimo orizzonte a qual plaga ella sia posta. Aggiungete anche essere le mie riflessioni un po' astratte, e Dio sa come poco avran che fare con la copia delle bellissime esperienze di cui sembra che sopra tutto faccia pompa l' Hallero. E aggiungete per ultimo, (e questo è che più m' importa che aggiunghiate) che io ben ravviso la infinita distanza, che è tra l' vostro sapere ed il mio; e ravviso per conseguenza, che se le mie riflessioni sono di qualche peso, le avrete a quest' ora fatte ancor voi, e se poi nulla vagliono, non importava nemeno che le facessi' io, e non meritano di essere a voi dette. Alla nuova richiesta però, che me ne faceste sabbato mattina con quelle vostre cortesissime maniere, mi sentj venir voglia di abbandonare tutte le ragioni e i riguardi, et ecco in fatti, che io permetto subito alle mie riflessioni di venirvi innanzi. Che non possono quelle vostre belle maniere? Farebbon cedere ben altro, che riflessioni.

Ma sentite omai che cosa io abbia riflesso. Mi è paruto che il grande Hallero ci abbia insegnati bensì moltissimi fenomeni intorno alla irritabilità, ed alla sensibilità, ma poca cura siasi presa, perchè abbiamo una sufficiente idea di coteste due qualità. E vegliamo.

giamo prima com' egli ci spieghi la irritabilità. Così egli dice; *io chiamo parte irritabile del corpo umano quella, che diventa più breve, quando qualche corpo straniero la tocca un po' fortemente. Supponendo il tatto esterno eguale, l' irritabilità della fibra è tanto più grande, quanto ella diventa più breve.* Eccone, o pregiatissimo Amico, che, volendomi l' Autore definire, e nello stesso tempo mostrare come io misurar debba la irritabilità, me ne oscura l' idea. Imperciocchè io la discoro in tal modo: se la irritabilità è quella proprietà, per cui la fibra contraesi ad un esterno contatto, parmi che ella debba misurarsi dalla contrazion della fibra. Nè io vedo come la contrazione della fibra sia proporzionale al solo abbreviamento di essa. La fibra è un corpo; e i corpi tanto si dicono contraersi, quanto restringono la loro massa sotto più picciol volume; cioè a dire quanto diventa minore la loro estensione. E la estensione de' corpi non si misura da una sola dimensione, ma da tre. Così dunque la irritabilità potrà essere bensì quella proprietà per cui la fibra ad un' esterno contatto diventi più breve, ma non per questo si dovrà dire che tale proprietà sia proporzionale all' abbreviamento della fibra, salvo se la fibra non si contraesse, che per la sola direzione della lunghezza. Ma se rimanga pure un leggerissimo dubbio che la contrazione della fibra possa farsi ancora per qualche altro verso, converrà, a fine di non errare, stabilire la contrazione, e conseguentemente la irritabilità per tal maniera. Si vuole, dico io, in primo luogo, qualunque sia la figura della fibra contratta, e qualunque sia quella della non contratta, notare la lunghezza, la larghezza, e la profondità non meno della fibra nello stato suo naturale, che della fibra nello stato di contrazione. Devonsi quindi moltiplicare insieme la lunghezza, la larghezza, e la profondità della fibra naturale, per avere l' esponente del volume di essa. Il medesimo si faccia delle dimensioni della fibra contratta, e così abbiassi ancora l' esponente del volume di questa. Finalmente sottraggasi l' esponente della fibra contratta dall' esponente della fibra naturale, ed il residuo sarà poi esso l' esponente della contrazione, che è quanto dire della irritabilità. Che se poi si contraesse la fibra per ogni verso proporzionalmente, allora sì che si potrebbe dedurre la quantità dell' irritabilità dall' abbreviamento della fibra; non già perchè i varj abbreviamenti della fibra esprimano per se medesimi le varie irritabilità, ma perchè dato qualsivoglia di cotesti abbreviamenti, e paragonatolo con la lunghezza naturale della fibra, viene a trovarsene la differenza, la quale è la lunghezza della fibra contratta. E quindi fatto il cubo della lunghezza della fibra contratta, ed il cubo della lunghezza naturale della fibra, & usando dell' artificio, che sopra abbiain detto col paragonare questi due cubi, quella differenza solida, che se ne viene a ricavare, è quella stessa, che, esprimendo la quantità della contrazione, esprime nulla meno la quantità dell' irritabilità della fibra. In somma, lasciando

da parte ogn' altra cosa, voi vedete che qui si volge la riflessione mia: perchè si ha egli a prendere la misura della irritabilità dal contraersi della fibra secondo una sola dimensione? perchè piuttosto, essendo la fibra un corpo, non avrassi a prenderne la misura dal suo contraersi secondo tutte e tre le dimensioni de' corpi? E questa era la riflessione intorno alla irritabilità; vedete s' ell' era picciol cosa, e da nulla. Passiamo all' altra intorno alla sensibilità, che sarà, s' è possibile, ancor più picciola. La prima ha voluto alquanto accostarsi alla Geometria; la seconda amerà meglio ritirarsi un poco sotto l' ombra della Metafisica.

E quest' altra riflessione ancora fa, che io non possa formarmi un' idea abbastanza chiara della sensibilità. Così il celebre Hallero; *Io chiamo fibra sensibile nell' uomo quella, che essendo toccata, trasmette all' anima l' impressione di questo contatto: ne' bruti dell' anima de' quali non abbiamo alcuna certezza, si chiamerà fibra sensibile quella, per la cui irritazione essi ne danno segni evidenti di dolore, e d' incomodo.* Or via ommettiamo, che la sensibilità della fibra abbisogni di un contatto: benchè io non veggia qual contatto sia, dove taluno al solo apparire di un' oggetto spaventevole comincia a tremare, e certo allora sono in lui fibre, che movendosi trasmettono impressioni all' Anima. Lo stesso parmi di coloro, che temono il solletico, i quali cominciano a torcersi e risentirsi, tol che una mano da qualche distanza accenni di volere ad essi accostarsi. Forse mi si potrebbe rispondere, che altro non è il vedere gli oggetti, fuorchè un ricevere nella retina de' nostri occhj l' urto della luce, che dagli oggetti è riflessa: E che dove è urto, e contatto, e così può esservi ancora sensibilità. Ma le teorie, e le esperienze del dottissimo Hallero assai mostrano che, quand' egli dice contatto, non pensa a quello della tenuissima luce, e non fa verun conto di un urto, del quale appena ci fa fede un sistema. E poi ciò non ostante che si risponderebbe mai a quello, che potrebbe dirsi della infinita varietà de' sogni, che c' intertengono e fanno compagnia la notte, mentre dormiamo? Quanti movimenti in quante fibre eccitati, che tramandano all' anima fortissime impressioni! E qui dove sono questi contatti scuotitori delle fibre? Ma ho promesso di voler ciò omettere, e devo mantenere la mia parola. Manterrò anzi più, che non ho promesso. Cioè ometterò ancora, che noi non abbiamo dell' anima de' bruti alcuna certezza; quantunque quel dir non alcuna possa parer troppo, specialmente dove si voglia trattare di sensibilità; non essendo niuno al di d' oggi, trattine alcuni pochissimi Cartesiani, così scortese con gli animali, che non conceda alla loro anima almeno il sentire, e non pochi essendovi in oltre, che farebbon disposti di concedervi molto di più, se non temessero di offendere la Religione. Ometterò io dunque ancor questo, e dirò brevissimamente la riflessione mia. *Si chiamerà, dice l' Autore, fibra sensibile quella, per la cui irritazione essi, cioè i bruti, ne danno segni*

gni evidenti di dolore; e d' intomodo. Và bene; ma questo non è però, a quel che io giudico, darne idea intieramente perfetta della fibra sensibile. Se la fibra è sensibile, quando ella, siccome avverte l' Autor medesimo, trasmette all' anima qualche impressione, perchè non si dovranno ancora dir sensibili ne' bruti quelle fibre, per la cui irritazione essi ne danno segni evidenti di comodo, e di piacere? Io non posso credere che la natura abbia inventata la sensibilità per disgustare i viventi. Che se dunque il piacere nulla meno, che il dolore, sia argomento di sensibilità, io credo che i cibi, che reco ad un Cagnolino, e le carezze, che io gli fo, mi possan provare la sensibilità di qualche sua fibra, dandomi egli in tanto manifesti segni di contento, e di gioia. Queste sono esperienze, le quali finalmente non sono sì barbare come quelle dell' Hallero, e le vostre. Ma vi parerà forse che ora io scherzi con voi. Ebbene; fate conto, che io Scherzi.

*..... Ridentem dicere verum
Quid vetat?*

Per lo che pregovi di non volermi tacere quanto vi sembrano veri cotesti scherzi. E fuori di ogni scherzo, io vi dirò schiettamente, che io non capisco perchè non abbiassi a chiamar sensibile ogni fibra, al cui movimento o viene trasferita ad un' anima qualche impressione, o un corpo dà cotai segni esterni, come farebbe se racchiudesse un anima, cui fusse allora qualche impressione trasferita. Per lo che anzi parmi che si dovessero avere per effetti di sensibilità non pure il dolore, come dice l' Hallero, et il piacere, che egli non dice, e che io ho creduto che noi dobbiamo aggiungervi, ma tutte quante le modificazioni, e le forme, che si ponno imprimer nell' anima all' eccitarsi da alcuna fibra del corpo, che la circonda. Non mi mancherebbono moltissimi, e diversissimi esempj di coteste impressioni, che si forman nell' anima al moverli di alcuna fibra del suo corpo, ma io voglio terminar la mia lettera, che ben m' avveggo esser già troppo lunga. O più tosto voglio terminar di parlarvi di coteste cose Halleriane, e chiedervi qualche nuova della preziosa salute della veneratissima Signora Marchesa, presso cui siete. Che fa ella cotesta degnissima Dama? Dicesi qui ch' ella stia poco bene, il che dispiace sommamente a tutti, a me poi più di tutti. Pregovi di baciarle la veste in mio nome. State sano, ed amatemi.

Di Bologna alli 26. di Luglio 1756.

AL NOBILISSIMO CAVALIERE SIG. CONTE

GREGORIO CASALI

Pubblico Lettore di Meccanica nella Università di Bologna,
Professore di Architettura Militare nell' Istituto delle
Scienze, e dell' Arti, e dell' Istituto medesimo
Accademico Pensionario Benedettino, ed
Accademico Clementino.

TOMMASO LAGHI.

Giuntami la umanissima vostra o Signor Conte veneratissimo qui in Villa presso la nobilissima Dama, della cui preziosa salute con tanta ansietà mi ricercate, che in voi ravviso maggior desiderio di questa, che di rischiare l' idea della irritabilità, e sensibilità halleriana, hò creduto mio dovere liberarvi subito dal primo dubbio con accertarvi del suo totale ristabilimento, onde sapendomene buon grado non abbiate a sprezzare le deboli conghietture, che vengo di fare su due piedi intorno le vostre letterarie inchieste.

Consolato in tal guisa, come spero, l' animo vostro, vengo ora alla prima ricerca:

L' abbreviamento della fibra non dovrebbe, voi dite, essere misura della irritabilità di essa, mentre essendo la fibra un corpo, tanto si dirà contraersi, quanto restringesi la sua massa sotto più picciol volume; ed a dedurne la differenza in stato di contrazione, fà di mestieri aver riguardo a tutte e trè le dimensioni de' corpi nel modo da voi elegantissimamente esposto. Confesso, che il raziocinio cammina a dovere, nè temo, che il famoso Hallero sia punto per opporvisi, anzi potendo egli supporre, che la fibra contraggasi per ogni verso proporzionalmente, non avrà a tener conto, che della varia lunghezza della medesima, tosto, che sia irritata. Ma dato ancora, che la fibra non si contraesse nella supposta proporzione, basterà non dimeno riferire la quantità della contrazione all' abbreviamento, assai più sensibile di quello sia la larghezza e profondità agl' occhi de' spettatori, de quali non richiedesi altro assenso, se non se quello dimanda l' apparente accorciamento eccitato nella fibra dall' irritarla.

Così pure, passando all' altra ricerca, il grandissimo Hallero; ammesse per vere tutte le dottrine vostre in ordine alla sensibilità, può sempre esser contento della definizione sua riguardo il fine a

cui la ordina, mentre volendo egli esaminare quali sieno negl' animali le fibre sensibili, e quali prive di senso, non hà miglior criterio quanto il contatto, valevole eziandio, e specialmente ne' Brutti, o cagionare contraegni evidenti d' incomodità, e dolore, per cui meglio assicurarsi della sensazione introdotta.

Si ha qui bisogno di conoscere, e distinguere segnatamente in ciascuna parte se pure vi sia alcun senso, o no; adunque non bastano que' mezzi troppo generali, che non ci scoprono, per così dire, le proprietà d' ogni fibra; e qual altro, per mia fede, può esservi oltre il contatto, a giudicare del senso nel tendine, nel periosio, nella dura madre, nella cute, ne muscoli, e ne visceri?

Vi prego Signor Conte gentilissimo a voler essere più cortese col nostro Autore, e non richiedere tanto rigore geometrico, e metafisico in cosa, che senza oltraggiare codeste scienze, ama di esser veduta con occhio ed esperienza anatomica.

Ma io ben m' accorgo di aver fatto troppo torto sì a voi, che al rinomatissimo Signor Hallero: a voi, che di ottimo discernimento dottato, non abbisognate di alcun lume per le mie scarse, e rozze riflessioni; al Signor Hallero, avendo io ardito di interpretare la sua gran mente, quando che ad esso apparteneva soddisfarvi con dottrina degna di voi, e di lui medesimo.

Vi prego pertanto condonarmi un tale e tanto ardimento, e fare sì, che mel condoni anche l' Hallero. Tutto spero da voi, mercede questa pregiatissima Dama, alla di cui protezione mi raccomando nell' atto di baciarle la Veste in nome vostro, non solo per argomento del mio ossequio ed obbedienza, quanto per accrescere, in qual modo io possa, li meriti vostri, che sono moltissimi, presso di essa.

Fossolo li 30. Agosto 1756.

ECCE

ECCEZIONI DI N. N.

Contro la LETTERA

DEL SIG. GIAMBATISTA VERNA

Stampata in Torino nello scorso Dicembre 1757.

Quantunque il più delle volte la contraddizione rincresca; e mal volentieri si toleri da chi non vorrebbe sentirsi in alcuna cosa contraddetto; pure, quando il contraddire serva a disingannare lo altrui, e la verità messa in mezzo valevol sia a giustificare il contraddittore, non vedo come giusta non sia, e come non s'abbia per lodevole a ricevere

Da chi per giudicar guarda ben dritto

E in sua coscienza non ha alcun delitto;

Ciò posto, non farà dunque male a proposito fatto, se alla lettera del Sig. Verna, il quale

Dice le cose sue semplicemente,

E non affetta il favellar toscano

verrò facendo alcune opposizioni; imperocchè, siccome nel corso della medesima mi sono incontrato in alcuni passi, i quali per ciò che si fa, e come vedrassi non contengono verità; quindi è che ho giudicato essere necessario di porli in chiaro, acciocchè chi legge illuminare si possa, e vedere se il Sig. Verna su quello che scrive meriti tutta la fede, o no. Veniam dunque alla bisogna; giacchè

Opera naturale è ch' Uom favelli,

Quando sia il ver, che movalo a parlare

E altrui non tocchi la veste, e i capelli.

Dice dunque questo Autore, che non vi sono nervi propri nella dura madre, e molto meno nel tendine di achille: a me pare però,

rò, sebben giusto si rifletta, che nel sì dire male si apponga, imperciocchè, quanto a i primi, sono già stati con tutta evidenza dimostrati ne' tempi addietro dal celebre Vieusseno, dal Munikio, dal Duvernei, dal Winslovvio, e da altri valentissimi Anatomici; ed oggi giorno faranno quarant' anni omai, che distinti furchi nervi propagati alla base del cervello furono chiarissimamente fatti osservare, come ogni anno continuasi a fare dal dottissimo Sig. Giambattista Bianchi nel Regio Teatro Anatomico di Torino in una diligentissima figura in miniatura tre volte più grande del naturale sotto il num. 19; quale tavola, con tante altre della medesima manifattura e grandezza si conservano nel Museo del lodato Sig. Professore. Oltre gli accennati chiarissimi Uomini, tali propagini nervose, sono pur anco state descritte e chiaramente dimostrate per lo addietro dalli celebri Signori Valsalva, Morgagni, ed altri contemporanei Notomisti; ed ultimamente in Bologna dagli accurati Signori Laghi, Borghi, Vignaferro, Fabri, ec. ne, se non vi fosse, s' avrebbero in detta meninge evidentissimi segni di senso, come si hanno. E lo stesso Sig. Buzzani riferito dal zelantissimo Sig. Verna viene benissimo ad accordarlo come vedremo a suo luogo. E per andar con ordine cominciamo dall' osservazione del Sig. Verna testè nominato.

Racconta dunque il nostro degnissimo scrittore, nella storia della sua famosa operazione del Trapano fatta all' infelice muratore di Graglia nel venerando Spedal maggiore di S. Giovanni, che l' infermo non senti alcun tatto sulla dura madre; se il racconto contenga verità, e la cosa andasse tal quale la descrive, già è stato in un foglio volante stampato abbastanza dimostrato; circostanza, che m' impegna presentemente ad usare silenzio per non rifarmi da capo a dire quello che si disse; e poi sono anche vivi i testimonj, che si trovaron presenti alla descritta operazione, i quali, come credo, saranno prontissimi, richiesti che fossero, a confessare il vero, e senza inorpellare il fatto, a pronunziare, che il Sig. Verna per sostenere la insensibilità halleriana travide all' ingrosso, e traportollo

L' amor de l' apparenza e non del vero.

Ma che s' ha a fare mi suppongo che un cotale Halleriano dica: la novità è sorprendente, il ritrovato è grande, il suo Autore è luminoso, oggi giorno la sua autorità è rispettabile, e perciò anch' io mi sono lasciato abbagliare, e non ho cercato più oltre per persuadermi, che quello che spaccia co' suoi numerosi fatti sia una verità, che non admetta eccezione. Or via, sia come egli crede: in tanto passiamo un poco a vedere se in alcun' altro passo della medesima ci venisse fatto di rinvenir tanto, fuor di quello è stato detto, quanto bisogna per fare saltar fuori quella sensibilità nelle meningi, che il Sig. Verna dice di non aver trovata.

Per

Per la qual cosa fare; mi dica un poco in primo luogo cotesto Sig. Cerusico, da che pensa esso, che nascessero i gravosi sintomi, ch'ei nota dal principio della cura fino all'ultimo? Dalla tensione de' tegumenti esteriori, e del pericranio? Nò, perchè tolta a questi co' tagli fatti la resistenza, tanto e tanto non cessarono. Dallo spargimento della marcia generatasi, che stimolava e comprimeva la corteccia esterior del cervello? Nè punto, nè poco, concio sia che questa corteccia, per confessione del Sig. Haller medesimo, è di niun senso. Dunque, dove s' hanno a ripetere cotesti malagevoli sintomi? A parere del dottissimo Sig. Le Cat, ed a mio ancora, non d'altronde certissimamente, che dalla lesion della pia madre, la quale perciocchè trovavasi esposta a continui ed incessanti stimoli del marciume, che in gran quantità tra la medesima, e la superficie del cervello erasi generato, non potè a meno di non risentirsi in maniera da far nascere quello, che nacque, e per cui convenne mal grado l'operazion fatta, che il povero paziente tra i più trapassasse. Mi onori in secondo luogo, lo irritamento di questa membrana non è stato altra volta capace di eccitar convulsioni e normi ne' feriti di testa, ne' quali si trovò essa dal contatto di qualche corpo straniero offesa? In oltre la sperienza non insegna, come nelle sue dissertazioni mostra egregiamente il Sig. Le Cat, che dallo stesso irritamento sono nati contumacissimi Tetani? E perchè non si ha ora a credere, senza timor di fallare, che il non interrotto stimolo in che trovavasi una tal parte, non fosse la causa prossima e continente de' riferiti accidenti, e della morte ancora dello infelice Muratore? E la costante gravezza del capo accusata, e lo acuto dolor fitto nel luogo preciso su cui cadde il matone, non voglionfi avere per legittimi e veraci segni di sensazione? Come poteva il povero ferito lagnarsi di tutti questi penosi incomodi, e non sentirli? E come gli avrebbe sentiti, se non fosse stata offesa una parte sensibile? E quale altra parte, fuor che la pia madre nel nostro caso era quella su cui potesse la marcia far maggiore irritamento? Di più, la febbre gagliarda, da cui furono sempre accompagnati tali rincreoscevoli accidenti, non è ragionevole di attribuirli all'alterazione di quella parte, che involve tutto il genere nervoso, e per cui ne nascono tanti altri sconcerti capaci a travolger l'ordine economico degli altri solidi, e perciò ad accender febbre? Oh se si andasse un poco più riservati nello abbracciare le novità, e un po più cauti nello esaminare a parte a parte le circostanze, che accompagnano i casi; mi creda il Sig. Verna gentilissimo, che non si precipiterebbono con tanta facilità que' giudizj che si precipitano, e noi ci scansemmo da quegli inutili quistionamenti, che oggi di occupano per la maggior parte le teste degli Uomini con tanto poco profitto dell'arte. Ma tiriamo innanzi, giacchè su questo penso, che non ci sia più che piatire.

Per corredare cotesto Valent'uomo la esaminata osservazione,
altra

altra sua ne porta fatta sopra Giacomo Amaud dello stesso tenore; la quale si lascia stare, perchè dallo esame della prima, penso che cadauno possa argomentare, quanto si potrebbe dire della seconda: sicchè per mantenere la promessa, passeremo alla terza, che è del Sig. Buzzani, e procureremo di vedere un poco, se da quello, che ci vien sposto nel suo caso di testa accaduto in Gioseffo Craverio egli è vero, che venga a confessare senso nella dura madre da esso lui posta a sperienza, secondo che si disse. E vaglia il vero.

Punse egli cotesto altro maestro il centro della medesima madre membrana dopo la trapanazione fatta al poco sopra ricordato soggetto, ed asserisce non avere in essa trovata sensazione: lo tocca prima di tale puntura col dito mignolo, per esplorarne sua resistenza; indi lo interroga, se così toccandolo ha sentito dolore: sentiamo un poco ad una tale interrogazione, che risponda il povero paziente: Risponde, che non dolore; ma sentì benissimo *un po di pressione al capo*: Ciò posto, cade in proposito lo argomentare così: se in istato, che la dura madre avea ricevuta la impressione dell' aria, capacissima colla sua attività ad irrigidire qualunque parte vivente, non che dopo altre circostanze come ogn' un vede, che concorrevano a privarla della sua propria sensazione, il miserabile Uomo ferito, non ostante accusò senso di percezione; prima della caduta, e di tutt' altro succeduto dopo, quale non doveva essere il suo verace e legittimo senso? Nè quindi voglio, che per ispiegare perchè abbia sentita *un po di pressione al capo* ricorrano gli Signori Verna, Baldi e Buzzani alla compression del cervello evidentissimamente, dal celebre Signor Laghi di Bologna insussistente addimostrata, e del tutto nulla (1); amo, se loro da l' animo, che si studiano di porre in mezzo altre ragioni, le quali abbiano non solo il valor di far questo, quanto ancora di mostrare, come, e perchè essa dura madre punta, tagliata, bruciata, graffiata &c. non dia segni di senso, e poi leggermente solleticata sotto il cranio nella faccia esterna ed interna dove trovasi ancora naturalmente allo stesso attaccata, e non ha ricevuta alcuna impressione d' aria, lo animale si scuota, si smanj, gridi, e con ciò dia segni di non equivoca sensazione! questo si desidera, e allora, se figgono il chiodo, avranno ragione di far credere che la membrana in quistione non trovisi avere nervi propri: mi persuado però, che se al dottissimo e valoroso Signor Hallero non è venuto fatto di spiegare questo costante maraviglioso fenomeno; non sieno pur essi in grado di cavarla netta, e non ne faccian altro.

Che non è impresa da pigliare a gabbo....

Nè da lingua, che chiami mamma, o babbo.

Sen-

(1) Thomas Lagbius, de sensivitate atque irritabilitate balleriana. Sermo alter. pag. 6.

Sentano in oltre cotesti Signori quale novissima cosa a prò della sensazione della dura madre mi viene scritta dalla Città di Bologna da un'amico costà di passaggio, il quale si trovò presente a vedere sperimentare sulla medesima dopo una trapanazione fatta. Il caso è tutto acconcio, e viene giusto in tempo per farlo servire al bisogno. E per non dire nè di più, nè di meno dello scrittomi, porto tali quali stanno le precise parole della lettera. Aprano dunque gli occhj e leggano. „ Li 19. del corrente Mese di Ottobre 1758, se non erro, trovandom' io nello Spedale di S. Maria della Morte a veder medicare il chiarissimo Sig. Gaetano Tacconi Maestro Chirurgo, come ella fa in detto Spedale, tra li molti e varj infermi di chirurgia che gli vidi curare, ebbi la buona sorte di trovarmi presente a vederlo scoprire la testa di una Giovane di anni 18 in circa percossa da sasso, che il giorno precedente avea dovuto trapanare sull' osso temporale sinistro. Levato del tutto lo apparecchio, e scoperta la meninge, appresso se chiamommi, ond' io potei, senza ingannarmi, vedere con esso-lui quanto soggiugnerò or ora. Vidi la medesima dura membrana un po' alterata, e vicina a guastarsi dalla parte anteriore avente relazione all' osso frontale, nel quale luogo toccata ed irritata, non dette segni di senso: Osservai, che in ogni altra sua parte conservava il suo color naturale: introdotta la tenta d' argento tra il cranio e la medema, tanto dalla superiore andando verso il parietale, quanto dalla inferiore e posterior parte, e colà dentro in ogn' uno di questi luoghi leggermente solleticata, udij e con meco udirono tutti gli altri che facean corona al letto della misera, ch' ella in tempo del solletico non solo si lagnava, ma precisamente gridava, nè mai si ristette dal farlo, fin chè più non fu in cotal maniera stimolata, ed il ferro di colà dentro levato. Addomandato io il detto Sig. Professore, se l' antecedente mattina avesse fatte le medesime pruove con lo stesso successo, mi rispose che nò, imperciocchè più di un giusto e ragionevol motivo avealo sospeso a differire a quest' oggi le accennate sperienze. Il fatto è tal quale l' ho steso, e forse dal Sig. Tacconi medesimo lo vedrà più circostanziatamente scritto, e stampato. Di questa interessante notizia ne faccia quell' uso, che più le aggrada, perchè, per questo ho voluto riferircela. Intanto &c. . . „ Or vada mo di presente il Sig. Verna a pinger sulle carte, che si sono finte nella dura madre, e ne tendini alcune diramazioni nervose, quasi chè non fosse più vero quel tanto ricevuto assioma, che dove son nervi, ivi è senso, e che quelli, che le anno trovate e dimostrate, fosser tanti ciechi guidati a mano dalla sola volontà d' inventare per contraddire, e non da veraci e legittimi sensi condotti, e la natura avesse riservata a' soli perspicacissimi occhi del Sig. Haller e de' suoi dotti seguaci, la gloria di scoprir tutto, e di tutto indagare il più in essa nascoso. Ma di questo abbastanza. Passiamo ai nervi del tendine.

Riguardo poi ai nervi del tendine, non furono ancor questi veduti ed evidentemente mostrati, che che ne dicano in contrario il celebre Padre Tofetti, o chi cercolli per lui, e tutti gli altri Halleriani, nella Città poc' anzi detta dalli Signori Laghi e Borghi, i quali hannoli in rame fatti scolpire; non che dopo loro dal chiaro e diligente Signor Vandelli di Padova ed altri? A mio credere meglio fora stato, che l'intraprendente Sig. Verna avesse alla buona confessato non averli mai veduti in vita sua, che così da tutti sarebbe stato fulla sua parola creduto. Per provare poi la insensibilità del tendine d' Achille, si fa forte, e stabilisse le sue prove sovra un passo di un celebre Professore, a cui fa dire, che nelle lepri detto tendine era indolente; e bene anderebbe la bisogna, se il passo non fosse mutilato: eccolo qui intatto. *Ed in vero ho veduto qualche volta scoprire i tendini achillei delle gambe di dietro a lepri vive, ed alcune volte ho osservato questi tormentati animali nello scoprire e stendere detti tendini gridare in eccesso, ed altre volte insieme convellersi; ma altre fiate poi in niun modo far gemito, nè altra alterazione dimostrare.* Posto questo, cadaun vede, che il Signor Verna avea preso quello che faceva per lui, e lasciato indietro l' altro, che non proteggeva la sua causa. Se in questo caso sia da lodarsi un cotale Halleriano, lascio che lo decida il benigno lettore. Per me non so approvare la sua condotta, nè credo, che l' Uomo disaffascionato l' intender possa diversamente; perchè quando si tratta della verità, e che un qualunque passo vogliasi citare, v'è citato a mio giudizio tal quale sta, e non renduto storpio e mutilato. Ma pazienza, credeva il Signor Verna, o chi si è il giubbone affibbiato di scrivere per esso di aver fatto bene così contenendosi.

O mente umana, come spesso avviene,

Ch' un loda, e dannà una cosa, e la piglia

In prò, e 'ncontro, come ben gli viene.

Ma seguitiamo anche per un poco lo intrapreso cammino.

A proposito della insensibilità de' tendini, non contento del passo citato, porta in oltre due osservazioni del Signor Robbiati; la prima fatta in un Cavaliere, cui toccò più volte colla sonda, e colla punta del bistorino il tendine dello estensore del dito mignolo, che il dì 15 Novembre dell' anno scorso, per ferita restolli scoperto: la seconda in Gio: Krautvorts, al quale una Tigre con un unghia avea malmenato il pollice della mano destra, il quale pel tratto della metà della prima falange, sino alla metà della terza, era restato aperto collo scoprimento per tutto questo tratto del tendine estensore, una porzion del quale, fu mestier che levasse col ferro, perchè era inegualmente lacerata, senza che il paziente se n' accorgesse

geffe; è pretènde con queff' arme di abbattere, e tutt' altre cofe di ftruggere, che fi oppongono al nuovo fiftema della infenfibilità de' tendini. Io non voglio qui farmi ad efaminar fcrupolofamente parte per parte tutte le circoftanze, che potrebbero render dubbiofe le pruove fu i tendini fatte; concioffiachè pochiffimo parmi ci voglia per farlo da chi ha un tantino di cognizione nella materia di cui fi tratta. Solo a quefte due offervazioni, oltre molt' altre, che potrei loro metter contro e tutte d' Uomini chiari, i quali co' loro fatti hanno evidentemente mofttrato, che il tendine non fi può privare affatto di fenfo, come lo averti fino à fuoi tempi il valentiffimo inglefè Giobbe a Meckren nelle fue medico-cerufiche offervazioni pag. m. 309. dicendo *Experientia quotidiana tendinem fenfus illius baud effe docet, cujus omni tempore habitum fuit. At verò vaginam membranosam in qua tendo, pars mobilis, lavisque detinetur, fenfitem magis tendine ipfo obfervamus*. Ed alla pag. 311. foggiugne, *Et fic clare declaratum iudicamus fenfum omnem tendinibus auferre non poffe*, con quello che fegue: piacemi una recentiffima di porre in mezzo loro, la quale, perchè nel leggerla e rileggerla mi è andata a cuore, non ho potuto a meno di non fervirmene, come cofa tutt' acconcia al mio vopo: e quefta è del chiariffimo Signor Fabrí fatta in Bologna nell' anno 1757. ed efeguita fopra un tendine umano con tale, e tanta accuratezza, e fornita di cautele in maniera, che a parer mio alcuna eccezion non admette. Leggano quefta li Signori Verna e Robbiati, e poi mi fapran dire, fe il tendine ha fenfazione o nò; giacchè il riferirla quindi *per extenfum*, farebbe cofa affai lunga.

Refterebbe da dire qualche altra parola, sì intorno ad altre tralafciate cofe, che intorno alla fenfibilità de' periofti, i quali dal Signor Robbiati fonofi trovati infenfibili, tanto nella gamba di quello, che tornando da Novara ricevette un colpo di piede ferrato da un Cavallo; quanto nella Donna, cui dovette incidere il pericranio fcoperto per cagion di una ferita di tefta rilevata per non fo quale accidentalità; ma inutil farebbe il perdersi dietro a quefto, portando cafi, che li mofttran fenfibili, ed ufando prove per far loro toccar con mano, che chiunque penfa, e crede che non v' abbia fenfo ne' periofti, crede troppo, penfa male, e precipita fuoi giudizi; quando il Signor Hallero medefimo capo ed autor primo di quefto ritrovato nella feconda differtazion fua più ferace e copiofa di fperimenti della prima, ftampata in Lofanna nel 1756, non ha, da Uomo ingenuo com'è, avuto ritegno di dire, che è meftieri fofpendere il fuo giudizio fulla infenfibilità de' periofti, e riportarlo ad altre più circoftanziate fperienze, perchè di leggieri puoffi andare ingannato. Nè per mio avviso s' ha a procedere diverfamente, fe il chiaro inglefè Chefelden anch' effo ha mofttrato nella fua notomia, che il dolore, che non di rado provano i poveri pazienti fotto il taglio di qualche membro, o in qualunque feparazione delle

membrane vestienti le ossa, viene da notabili nervi, *qui semper*, come scrive, e vien tradotto, *jacent prope ossa* e vanno in esse a diramarsi; ed ultimamente il Signor Zimmermann accuratissimo scolaro del Signor Haller avea francamente prima di lui co' sperimenti alla mano asserito, essere il pericranio, e così deesi intendere d'ogni altro periosio, sensibile, perchè avealo trovato assai munito di nervi. Questo basti per tutt' altro, che sopra una tal lettera dir si potrebbe, o si sarebbe potuto; ed il Signor Verna e suoi stimatissimi colleghi sel portino in pace; con ciò sia che

L' Oliva è secca, ed è rivolta altrove

L' acqua, che di Parnaso si deriva.



Sulla Sensibilità della Midolla.

AVvengachè da più d'un Autore sia stata mostrata questa sensibilità, e i loro passi sieno stati di recente per prova di ciò dal Sig. Laghi, Vandelli, Lotteri ed altri nelle loro lodevoli dissertazioni portati; nulla di meno per aderire alle insinuazioni di chi può comandarmi, non tralcuro di aggiugnere quello, che su tale argomento ha scritto il Du-Verney, tratto dal chiarissimo Sig. Rossi di Modena dagli atti dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi dell' anno 1700, il quale sebbene trovisi distesamente recato in prova per la cagion medesima nella accuratissima Dissertazione del Sig. Lotteri alla pag. 300. del tomo anti-halleriano; ciò non per tanto eccolo di nuovo, preceduto dall' ultime righe di una sua seconda Lettera al Sig. Marchesini scritta.

„Eccovi il sentimento riferito e scritto dal chiarissimo Du-Verney, il quale, secondo che ne dice il Sig. Haller, sebbene sembri uniformarsi al Deventer Ambrogio Pareo e a quasi tutti gli Autori, in dire, senza verun fondamento, che la midolla cagiona patimenti vivissimi, pure con buona pace del rispettabile oppositore parmi, che il medesimo Du-Verney non abbia altrimenti gettate sopra di ciò proposizioni aeree, e senza fondamento; ma bensì abbia appoggiato il grave suo sentimento a quell' istesso stabile fondamento, sovra cui il predetto Sig. Haller ha fermata la base delle sue scoperte, e alzata la vasta mole del suo nuovo sistema sopra la insensività ed irritabilità di alcune parti degli animali voglio dire il rigoroso scrutinio anatomico (1), e la speriienza (2) vera guida e maestra nelle cose fisiche e di fatto.

(1) *Pour satisfaire au desir de la Compagnie, qui a bien voulu, que je travaillasse à éclaircir quelques difficultez proposées dans une assemblée sur le sentiment de la Moelle, e des Os; Voici les Observations que j' ai faites. — La Moelle est un amas de plusieurs petites vesicules membranenses tres-deliées, qui s' ouvrent les unes dans les autres, & qui sont remplies d' une matiere builleuse, coulante, & liquide. Ces vesicules sont renfermées dans une membrane qui sert d' enveloppe generale à la moelle: et cette membrane qui est parsemée d' un tres-grand nombre de vaisseaux est d' une fissure encore plus fine que la membrane Aragnoidé de la moelle de l' epine. — Le plus grand nombre de ces vaisseaux passe dans la cavité des Os par des canaux particuliers, creusés dans leur partie solide. L' artere, la veine, et le nerf embrassez par une meme gaine, qui est une allongement du perioste, sont renfermez dans ces memes canaux. Ces Vaisseaux jettent à leur entrée une infinité de*

Suppl. Part. II. S 3 rame-

rameaux, qui arrosent tout ce tissu vasculaire. Le suddette Memoires &c. alla pag. 252. —

(2) Les Anciens, & les Modernes ont parlé avec tant d'incertitude du sentiment que peut avoir la moelle, que je me suis crû obligé d'examiner par moi-même cette matiere avec beaucoup de Soins ; ce que j'ai fait en deux differentes manieres —. La premiere dans les Hôpitaux, où voyant penser ceux, qui avoient eu un bras, ou une jambe coupée je pouvois voir la Moelle à decouvert ; car toutes les fois que je la faisois toucher un peu rudement, le malade donnoit aussi-tôt des marques d'une nouvelle douleur. (*) Mais comme cela ne me paroissoit pas encor assez convainquant, j'ai eu recours a une seconde experience, qui ne m'a laissé aucun sujet de doute : et vous vous souviendrez, Messieurs, que je fis scier devant vous par le milieu l'Os de la cuisse d'un Animal vivant, & ayant fait ôter les chairs, et les membranes, pour laisser le bout de l'Os entierement à nud, comme tous ces ébranlemens, et ces divisions causoient des douleurs tres-cruelles à l'animal, j'eus la precaution d'attendre que cette douleur fut passée, et quelque temps après plongeant un filet dans la moelle, vous vîtes que l'Animal donna aussi-tôt des marques d'une tres-vive douleur, ce qui fût reiteré plusieurs fois avec la même precaution, & avec le même succès ; j'ajouterai à ces experiences celle, que nous avons des alterations, et des maladies de la Moelle, qui prouvent encor qu'elle a un sentiment très-exquis. Le medesimo Memoires alle pagine 255., e 256.

(*) Il Signor Francesco Marescotti Dottore Collegiato, Medico Aulico, Lettor Pubblico in questa nostra Università, ed uno de' Chirurghi Primarij del nuovo Grande Spedale, ha osservata la medesima cosa nella Pratica Chirurgica da esso lui con tanto degno plauso esercitata: Ed il Signor Dottore Giacomo Jattica ancora altro valoroso Medico Chirurgo Aulico asserisce d'aver egli pure trovato più volte sensitivo il Midollo delle Ossa.

F I N E.

INDI-

L' AUTORE DELLA RACCOLTA
AL LEGGITORE.

VUolſi avvertito l' umano lettore eſſere per uſcire, ſe non è uſcita, dalle ſtampe di Loſanna una ſeconda diſſertazione del Signor Dottor Marco Caldani nella quale, tra gli altri contro cui ſcrive, trovomi annoverato ancor io: Qualunque ſia la critica ch' elli mi faccia, o il modo che tenga nel farla, proteſto che non la curo come Uomo nemiciffimo delle contefe; ed aggiungo, che non vorrò in mia diſſeſa uſar altro che ſilenzio. Non è però dover ch' io taccia per iſtruzione del pubblico, che la figura de' nervi, che vanno al tendine bovino, ch' egli prende di mira, e che per quanto ſento dice immaginata, non è mia, ma fu tratta da una preparazione fatta dagli occulatiffimi e ſperitiffimi Signori Vignaferro e Borghi, la quale ſe per me medefimo non fu moſtrata in ſoſtanza al Signor Abbate Fontana, e compagni, quando per vederla ſi recarono gentilmente a Caſa mia, non d' altronde provenne, che dal non averla io più; come non più ancora l' altra che confeſſo eſſer mia, nella quale manifeſtamente ſi ſcorgono diramazioni nervoſe recantiſi e diſtribuentiſi alla dura meninge, diramazioni, che ſe non ſon credute da chi penſa diverſamente, baſta che lo ſieno da quelli i quali ſenza parzialità e prevenzione alcuna, hannoſe ſenz' uopo di microſcopio chiaramente oſſervate, come legittime e veraci, e non finte et ideate come ſi crede. Queſto è ciò che occorreſi far paleſe al pubblico, il quale ſò, che non vorrà, diverſamente penſando, meno a me credere, che al celebre Signor Laghi, che le ha nel ſecondo ſuo ſermone per oſſervazioni fedeli, e di niuna eccezione portate. Quanto a tutt' altro, che il Sig. Critico s' abbia detto di me, ripeto, che inutil coſa farebbe il recarſelo, come più inutile il penſare a prenderſene alcun ſerio penſiere. Non per tanto, gli perderò di ſtima, e come Uomo ingenuo, sì a lui, che a tutt' altri ſeguaci del celeberrimo Hallero non mancherò di quel riſpetto, che loro profeſſo, e profeſſerò mai ſempre.

IN.

I N D I C E

Delle cose notabili.

A

A *gnata* dell'occhio è sensitiva. pag. 24, 93.

Anello tendinoso inguinale è sensitivo, ed irritabile. 84, 89.

Anguilla in pezzi perchè dura a muoversi. 40.

Anima sua sede. 19. Sensitiva. 40. Se concorra ne' moti. 56 seg. Ha impero ne' moti vitali. 57. Non la potiamo pensare cogitante. 60 seg. Numerante del Leibnitzio. 61.

Animali perchè alcuna volta feriti non diano segno di dolore. 77.

Aponevrosi sono sensitive. 22, 25 seg. 75, 84.

Arterie sono insensitive. 107. Non sono irritabili. 107.

B

B *Alena* come abbia il cervello. 35.

C

C *Anal* toracico è irritabile. 107.

Capsole delle articolazioni sono sensitive. 28 seg.

Cavalli perchè non abbiano vomito. 59. Alle volte hanno vomito, e perchè. 59.

Cautistici rendono equivoci gl' esperimenti. 48.

Cautele negl' esperimenti. 98.

Cellulare non è irritabile. 107. E' insensitiva secondo l' Haller. 106.

Cervello è insensitivo. 9, 34 seg. 122. Compresso non dà dolore. 8 seg. E' sensitivo secondo l' Haller. 106.

Congiuntiva dell'occhio è sensitiva. 24, 93. Sua origine. 24.

Contradizioni tra l' Haller, e l' Zimmerman. 93 seg.

Convulsioni non sono indizio di dolore. 36.

Cornea è sensitiva. 24, 78, 108. Sua origine. 24. E' insensitiva secondo l' Haller. 107.

Cuore è irritabile. 107. E' sensitivo. 106. Se si mova per l' irritabilità. 102. Dura a muoversi doppo morte. 94. Separato dura a muoversi perchè sente. 39.

D

D *Iaframma* è irritabile. 107. Dolor di capo sua sede. 14.

Maggiore oscura il minore. 33.

Dura madre è sensitiva. 8 seg. 11 seg. 14 seg. 49, 78 seg. 84, 100 seg. 110, 136 seg.

Nelle ferite insensitiva, e perchè. 12 seg. Alguna volta non sente, e perchè. 20 seg. 32 seg.

Si move. 78. Ha nervi. 93, 101, 134, 137. Non alterata dall' aria sente. 110. Tenta-

ta

ta tra 'l cranio sente: 110,
136 seg. E' insensitiva secon-
do l' Haller. 106.

E

E Micranie loro sede. 14.
Empiema 86 seg.
Epidermide è insensitiva. 106.
Non è irritabile. 107.
Esperimenti su la sensitività della
pia madre. 21, 123. Del pe-
ricranio. 23. Del periostio.
24. Della dura madre. 101,
110, 123.
Sù l' insensività del cervel-
lo. 35. Sù gl' animali sono
equivoci. 34, 67, 72, 76, 111
seg. Sono includenti. 67, 72,
108 seg.

F

F *Ascia lata* è sensitiva. 75.
Ferite della dura madre. 8.
seg. 11. seg. Della pia madre.
8. Del tendine pericolose.
25 seg. 63. Delle aponevrofi
pericolose. 25 seg. Del cer-
vello non danno dolore. 35.
Del cervello perchè alle volte
diano dolore. 36. Come in-
duchino la morte. 14.
Fibra sua struttura e proprietà.
116. Non ha bisogno per le
sue azioni dell' irritabilità. 116
seg. Sensitiva qual sia. 129.
Finali mori quali sieno. 57 seg.
63.
Fine cosa sia. 58.

G

G *Hiandole* hanno poca sensi-
tività. 106, 115.
Gintine se sij la sede dell' irrita-
bilità. 95.

145

Gottosi perchè hanno dolore. 30.
Grasso è insensitivo. 106.

H

H *Aller* si contradice. 79. Si
contradice col Zimmerman.
93 seg. Come si difende. 81.
Confina l' irritabilità ne' soli
muscoli. 89 seg. Non è l' au-
tore dell' irritabilità. 94. Of-
cura l' idea dell' irritabilità.
128. Non da chiara idea del-
la fibra sensitiva. 129 seg.

I

I *Nfiammazione* vera e spuria. 88.
Accresce la sensitività delle
parti. 48 seg. 78. Della pia
madre, è causa del tetanos.
83 seg. 18, 20.
Insensività accidentale. 31 seg.
48 seg. 109 seg. 111.
Intestini sono sensitivi. 106. So-
no irritabili. 107.
Integumenti sono sensitivi. 12, 26.
Iride è insensitiva. 107.
Irritabilità cosa sia. 66, 93, 115.
E' una qualità ignota. 94, 116.
Non è cosa nuova. 67, 72, 101.
Involve forze opposte. 115.
seg. Dipende dalla sensitivi-
tà. 37 seg. 82, 67, 89, 118.
Dura durante lo spirito vita-
le. 38. Senza senso è un pa-
radosso. 38. E sensitività si
confondono. 67, 118. E' con-
forme al sistema de la Mettrie.
69 seg. 72. E' sospetta di ma-
terialismo. 71 seg. Dipende
dai nervi. 68, 72, 118. Di-
pende dai spiriti animali. 118.
E' solo negl' animali vivi. 125.
Non si può misurare dall' ac-
corciamento della fibra. 128.

Co-

Come si debba misurare. 128 seg.

L

Legamenti sono sensitivi. 28 seg. 84, 112. Sono insensitivi secondo l' Haller. 106. *Leibnitzio* mette un' anima numerante. 61. *Lingua* è sensitiva. 106.

M

Membrane sono sensitive. 75, 87 seg. Perchè alcuna volta non sentono. 32. Sono irritabili. 94. De' visceri sono insensitive. 106. Delle articolazioni sono insensitive. 106. Non sono irritabili secondo l' Haller. 107.

Mercurio sublimato corrosivo utile nella lue celtica. 79. Che effetto facci introdotto nelle vene. 79. *Midolla* è sensitiva. 106, 141 seg. *Moti vitali* dipendono dall' anima. 57. Finali. 57 seg. 63. *Moto* se dipenda dall' anima. 56. Proporzionato e congruo seguita le sensazioni. 51 seg. 59 seg. *Muco* se sij la sede dell' irritabilità. 95.

Muscoli sono sensitivi. 106. Si contraggono per mezzo de' nervi. 93 seg. Sono irritabili. 107.

N

Nervi si comprimono senza dolore. 9. Ne' sensorij si spogliano della dura madre. 19. Compongono le parti tutte. 77. Sono irritabili. 94, 102. Vanno ai tendini. 99 seg. 138. So-

no sensitivi. 106. Non sono irritabili secondo l' Haller. 107.

O

Ochio stimolato perchè la-
crimi. 61.

Oppio come operi. 41.

Ossa sono sensitive. 113 seg. Divengono insensitive per la preparazione, e per male. 113 seg. Sono insensitive secondo l' Haller. 106.

Osservazioni pratiche su la sensitività della dura madre. 8 seg. 12 seg. 15 seg. 78 seg. 84, 121 seg. 137. Della pia madre. 9, 18 seg. 135. Del pericranio. 12, 22 seg. 84, 124. Del perioftio. 24, 73 seg. 84 seg. 110. Delle membrane dell' occhio. 24 seg. 78. Del tendine. 25 seg. fino al 31, 42 seg. fino al 49. Delle aponevrosi e legamenti. 27 seg. 30 seg. 84. Della cornea. 78. Del peritoneo. 84. De' polmoni. 85 seg. 87. De' reni. 87.

Su l' insensitività del cervello. 35.

Officazioni della dura madre. 9 seg. 12.

P

Parte irritabile quale sia. 115, 128. Nessuna per se è sensitiva. 107.

Parti sensitive ed insensitive quali sieno. 106. Irritabili, non irritabili. 106. Sensitive ed irritabili. 107. Tutte sono sensitive ed irritabili. 126. Sono solamente strumento della sensitività. 107 seg. Alcune perchè non mostrino irritabilità.

118 seg. Genitali sono ir-
 tabili. 107.
Passioni d' animo conciliano il son-
 no, e lo cacciano. 65.
Pelle è sensitiva. 106. Non è
 irritabile secondo l' Haller.
 107.
Vene è sensitivo. 106.
Pericranio è insensitivo. 106.
Perioftio è insensitivo. 106.
Pia madre è insensitiva. 106.
Preparazione negl' esperimenti to-
 glie la loro forza. 67, 72, 109
 seg.

Q

Quadrupedi alcuni hanno il
 vomito. 59. Perchè alcu-
 ni non abbiano vomito. 59.
Qualità della fibra. 64. Ignota
 è l' irritabilità. 94, 116.

R

Reni sono sensitivi. 87 seg.
Retina è sensitiva. 106.

S

Sanguisuga è sensitiva. 77.
Seno mucoso è irritabile. 107.
Sensazione cosa sia. 57. E' equi-
 voca. 34 seg. Maggiore oc-
 culta la minore. 108, 110.
 E' seguitata da un moto pro-
 porzionato. 55 seg. 59. Per-
 chè seguitata più tosto da un
 moto, che da un altro. 57 seg.
Sensitiva perchè si contrae. 38.
Sensività più, ò meno è in
 tutte le parti. 17 seg. 107. seg.
 Perchè alcuna volta non appa-
 risca. 27, 31 seg. 48 seg. 109
 seg. 111. Sta in ragione del-
 la densità. 82.

F I N E.

Senso da che dipenda. 114.
Solido non contiene sugo nervo-
 so. 32. Può contenere sugo
 nervoso, e non sentire. 33.
Stomaco è sensitivo. 106.
Sugo nervoso può essere in un so-
 lido senza azione. 33.

T

Teca de' tendini è sensitiva:
 139.

Tendini sono sensitivi. 25 seg.
 fino al 31, 42 seg. fino al 49.
 75, 93, 99 seg. 111 seg. 138.
 Punti danno sintomi letali. 25
 seg. Perchè alcuna volta non
 sentono, 32. Hanno nervi.
 99 seg. 138. Non sono insen-
 sitivi per la struttura. 99 seg.
 Sono insensitivi secondo l' Hal-
 ler. 106.
Tessitura cellulare è insensitiva.
 106. Non è irritabile. 107.
Tetanos sua causa. 17 seg. 135.
Trachea stimolata perchè s' ecci-
 ti la tosse. 67.

V

Vagina è sensitiva. 106.
Vasi lattei sono irritabili.
 107.
Vene sono insensitive. 107. Non
 sono irritabili. 107.
Ventricolo è irritabile. 107.
Vermi nel seno longitudinale. 10.
Vesica è sensitiva. 106. E' irri-
 tabile. 107.
Visceri sono sensitivi. 106, 114
 seg. Hanno poca sensitività.
 115. Non sono irritabili. 107.
Ureteri Sono sensitivi. 106.
Utero è sensitivo. 106. E' irri-
 tabile. 107.

Vidit D. Paullus Josephus Scati Clericus Regularis Sancti Paulli, & in Ecclesia Metropolitana Bononia Penitentarius pro Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Vincentio Cardinali Malvetio Archiepiscopo Bononie, & S. R. I. Principe.

Die 21. Septembris 1757.

Excellentissimus Dominus Medicinæ Doctor Collegiatus Thomas Lagbi videat pro S. Offitio, & referat.

Fr. Thomas Maria de Angelis Sancti Offitii Bononia Generalis Inquisitor.

Die 3. Januarii 1758.

Librum, cui titulus est = Sulla Insensitività, ed Irritabilità Halleriana Supplimento agli Opuscoli di varj Autori ec. divisi in due parti ec. = quem in duas partes divisum P. V. Reverendissima jussit mihi tradi, Mandatis obsequens, attente perlegi; atque in singulis partibus plurium opusculorum collectionem inveni. Pars prima complectitur res omnes, quæ favent Systemati Cl. Halleri; Pars altera refert quæcumque prædicto Systemati adversantur; Nihil autem in ambabus reperi, quod fidei, & moribus adversetur. Arbitror itaque, si P. V. Reverendissima placuerit, singulas hujus libri partes esse evulgandas.

Thomas Lagbi Philosoph. & Med. Doct. Pubbl. Profess. Colleg.

Die 2. Maji 1759.

Attentis superpositis attestacionibus.

Imprimatur.

Fr. Thomas Maria de Angelis Inquisitor Generalis S. Offitii Bononia.

